

Quality characteristics of semi-dried persimmons soaked in different concentration of sugar solution

Gi-Man Kwon¹, Jae-Won Kim², Kwang-Sup Youn^{1,3}*

¹Department of Food Science and Technology, Catholic University of Daegu, Gyeongsan 712-702, Korea

²Orye Life Science Co., Ltd., Busan 601-060, Korea

³Institute of Food Science and Technology, Catholic University of Daegu, Gyeongsan 712-702, Korea

당액침지에 따른 반건시 가공품의 품질특성

권기만¹ · 김재원² · 윤광섭^{1,3}*

¹대구가톨릭대학교 식품공학과, ²오레생명과학(주), ³대구가톨릭대학교 식품과학연구소

Abstract

This study was conducted to investigate the quality and characteristics of semi-dried persimmons soaked in different concentrations of sugar solution and stored at 7°C for 20 days. The L value and chroma value were significantly higher in S5 and S10 compared to the other concentrations of sugar solution. The ΔE and browning degree were increased according to the increase in concentration of sugar solution. Total sugar, reducing sugar, and sugar free contents were higher in the control (semi-dried persimmon) than those in S0, but they increased according to the increase in concentration of sugar solution. Polyphenol oxidase and peroxidase activities were decreased according to the increase in sugar solution concentration, which were highest in S0 among other semi-dried persimmons soaked in sugar solutions. Total ascorbic acid content was highest in S10 (12.29 mg/g), followed by S0 (2.54 mg/g), S5 (7.76 mg/g), S15 (6.05 mg/g), and S20 (5.05 mg/g). Total polyphenols, flavonoids and proanthocyanidins contents were the highest in S10 compared to other semi-dried persimmons soaked in sugar solutions. Furthermore, the same tendency was observed with DPPH radical scavenging ability. These results showed that 10% sugar solution could be applied to semi-dried persimmons in order to achieve high quality, nutritional value, and browning inhibition.

Key words : *Diospyros kaki*, semi-dried persimmon, sugar solution, soaking

서 론

감(*Diospyros kaki*)은 우리나라의 3대 과실 중의 하나로 남부지역을 중심으로 넓은 지역에서 생산되며(1) 포도당, 과당 등의 당질과 비타민 A와 C 같은 영양소뿐만 아니라 Ca, K, Mg 등의 무기염류가 풍부한 알칼리성 식품이다(2). 감은 기침 등에 효과가 있으며, 다른 과실과 달리 신맛이 없고 탄닌의 수렴작용으로 설사를 멎게 하거나 이뇨, 지혈,

숙취제거, 기침 등의 약리작용을 나타내어 예로부터 많이 사용되어온 기능성이 우수한 전통 과일 중의 하나이다(3).

최근에는 기술력 향상으로 다양한 형태의 감 말랭이, 감 튀레, 감 식초, 감 와인 등의 가공식품이 생산되고 있다. 이중 반건시는 홍시와 꽃감의 중간 정도의 식감을 가진 식품의 형태로, 풍부한 단맛과 특유의 물리적 특성이 더해져 촉촉한 식감을 가지고 있어 선호도가 매우 높은 편이며 앞으로 수요가 커질 것으로 기대되는 고부가가치 상품이다(4). 하지만 기존의 건조식품과는 달리 연한 조직과 수분이 많은 특징 때문에 미흡한 보관 상태에서 장기간 유통하게 되면 곰팡이, 유충 등의 발생으로 위생상태가 급속히 떨어지게 된다(5). 또한, 장기간 보관할 경우 저온장해가 발생하여 저장성이 낮아지며 운송과 유통에서 냉동 및 냉장 시스템(cold system)을 필요하므로 단가가 높게 형성되어

*Corresponding author. E-mail : ksyoun@cu.ac.kr

Phone : 82-53-850-3209, Fax : 82-53-850-3209

Received 13 February 2015; Revised 8 April 2015; Accepted 13 April 2015.

Copyright © The Korean Society of Food Preservation. All rights reserved.

있다. 저장성을 연장하는 가공방법의 부재로 유통기한 이후의 제품은 모두 폐기되고 있는 실정에 따라 이를 개선할 수 있는 가공 및 기술 개발이 시급한 실정이다.

당액침지는 삼투효과로 고상식품을 높은 삼투압의 당 용액에 침지하여 농축하는 유용한 방법으로서 식품과 용액 간의 용질 확산 및 용액 속으로의 수분 이동(6)과 식품으로부터 당, 유기산, 미네랄 등 성분들의 용출 현상(7)으로 식품의 기호성을 향상하고 저장성을 높이기 위하여 사용되는 방법이다. 당액침지에 사용되는 재료의 특성에 따라 다양한 침지액을 조성할 수 있고, 침지액 또한 침지물질에 들어 있는 영양소가 녹아 있어 그대로 마실 수 있다는 장점이 있다(8,9). 이러한 가공방법은 식품의 비타민, 향기, 색소 성분의 손실을 막아줄 뿐만 아니라 기존의 풍미를 더욱더 증가시키고 저장성까지 높여줄 수 있어 단순하지만 가장 상용화되기 쉽고 파급효과가 크다는 장점이 있어 반건시에도 적용할 가능성이 큰 것으로 생각된다.

따라서 본 연구에서는 반건시의 가공적 활용방안을 위한 목적으로 당액침지 타입의 반건시 제품을 제조하고자 하였으며, 당액침지에 따른 품질변화를 비교 분석하고 품질유지에 적합한 반건시의 제품화를 위한 기초자료를 제시하고자 하였다.

재료 및 방법

재료

본 실험에 사용된 반건시는 청도대감영농조합법인에서 공급받아 사용하였으며, 당액 제조에 사용된 감미료는 설탕(CJ-Beksul, Inchun, Korea), xylitol(Roquette Freres, France), polydextrose(Samyang, Inchun, Korea), crystalline

fructose(TATE&LYLE Ingredients Americas, Inc, USA), xanthan gum(Samwoo T/D, Seoul, Korea), guar gum(Shree Vijay Laxmi Enterrises, India), 비타민 C(Shinwon Cheivlcal All Fighs Seserved, Seoul, China), citric acid (JUNGBUNZLAUER Austria AG, Austria), chicory fiber (Cosucra, Belgium) 및 stevia(Daepyung, Sangju, Korea)를 실험에 사용하였다.

시료의 추출

당액침지 반건시의 항산화 성분 함량 및 활성을 분석하기 위하여 침지액은 여과하여 시료로 사용하였고, 반건시는 건조한 분말을 70% 에탄올 용매에 1:10의 비율로 넣고 24시간 추출한 후 Whatman No. 2 여과지로 여과하여 얻은 여액을 분석용 시료로 사용하였다.

당액침지 반건시 제조

당액침지 반건시의 제조공정은 Fig. 1과 같다. 반건시를 침지하지 않은 것은 대조구(control)로 나타냈으며, 당액의 조성은 Table 1과 같이 배합비율을 정하여 물 100 g을 기준으로 설탕을 0, 5, 10, 15, 20%로 각각 첨가하여 제조 후 7°C에서 20일간 저장하였다. 당액의 제조는 반건시와 조화도가 높은 레시피 확립과 맛, 영양 및 약리작용과 풍미를 가미하고자 계피 및 생강분말을 열수에 추출한 다음 여과한 여과액에 xylitol, crystalline fructose, polydextrose, xanthan gum, guar gum, chicory fiber, stevia, citric acid, 비타민 C를 첨가하여 혼합 및 교반하였다. 각각의 조건으로 제조된 당액 조성액 100 mL에 크기가 일정한 반건시(90±3 g)를 침지하여 기호특성 및 품질을 비교 분석하였다.




Fig. 1. Procedure for the preparation of semi-dried persimmons soaked in sugar solution.

Table 1. Ingredient composition of the soaking solution with different sugar concentration

Materials	Soaking solution ²⁾				
	S0	S5	S10	S15	S20
Water	100.0	90.0	85.0	80.0	75.0
Sugar ¹⁾	-	5.0	10.0	15.0	20.0
Xylitol	-	2.0	2.0	2.0	2.0
Cinnamon	-	0.6	0.6	0.6	0.6
Ginger powder	-	0.2	0.2	0.2	0.2
Crystalline fructose	-	0.2	0.2	0.2	0.2
Polydextrose	-	1.0	1.0	1.0	1.0
Xanthan gum	-	0.2	0.2	0.2	0.2
Guar gum	-	0.3	0.3	0.3	0.3
Chicory fiber	-	0.2	0.2	0.2	0.2
Stevia	-	0.1	0.1	0.1	0.1
Citric acid	-	0.1	0.1	0.1	0.1
Ascorbic acid	-	0.1	0.1	0.1	0.1
Total (%)	100	100	100	100	100

¹⁾Sugar, formulation with white sugar and black sugar 1:1 (w/w).

²⁾S0, sugar 0%; S5, sugar 5%; S10, sugar 10%; S15, sugar 15%; S20, sugar 20%.

색 도

색도는 표준 백색판으로 보정된 colorimeter(CR-200, Minolta Co., Osaka, Japan)를 이용하여 측정하였으며, 색차를 Hunter scale에 의한 L 값(lightness), a 값(redness-greenness), b 값(yellowness-blueness) 및 chroma value를 측정하였으며, 색차(ΔE)는 초기 색도를 대조구로 하여 다음 식의 계산식에 의하여 산출하였다.

$$\Delta E = \sqrt{(L_i - L_t)^2 + (a_i - a_t)^2 + (b_i - b_t)^2}$$

$i = \text{initial}, t = \text{test}$

$$\text{Chroma value} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

갈변도

갈변도는 색차계(CR-200, Minolta Co.)를 사용하여 L값을 측정한 후 다음과 같은 식으로 계산하여 나타내었다.

$$\text{갈변도}(\%) = \frac{(L_i - L_t)}{L_i} \times 100$$

$i = \text{initial}, t = \text{test}$

총당 함량

총당은 phenol-sulfuric acid 법(10)으로 측정하였다. 시료 1 g을 100 mL volumetric flask에 넣고 증류수로 정용하였으며, 용액 1 mL를 test tube에 넣고 DNS reagent 1 mL를 혼합한 후 95°C에서 15분 동안 증탕시켰다. 상온에서 충분히 냉각한 후 증류수 3 mL를 넣어 희석한 후 546 nm에서

흡광도를 측정하였으며 glucose를 표준물질로 사용하여 검량선에 의하여 함량을 산출하였다.

환원당 함량

환원당은 DNS법(11)에 따라 추출 여액 1 mL에 DNS reagent 3 mL를 첨가하고 5분간 끓인 다음, 냉각한 후 550 nm에서 흡광도를 측정하였으며, glucose의 검량선에 의하여 함량을 산출하였다.

유리당 함량

유리당 함량은 Wilson 등(12)의 방법에 따라 분석용 시료 조제는 각 시료 5 g에 증류수 25 mL를 가하여 과쇄 추출한 후 acetonitrile로 50 mL 정용한 다음 0.45 μm membrane filter로 여과한 것을 시험용액으로 하였고, 표준 시약은 fructose, glucose, maltose, sucrose, lactose(Sigma chemical Co., USA)를 일정량씩 혼합하여 증류수 50 mL로 녹인 후 acetonitrile로 100 mL까지 정용하여 사용하였다. 시료의 분석은 HPLC(Waters 600E, Millipore Corporation, Milford, MA, USA)를 이용하였고, 분석 조건은 carbohydrate analysis column(300 mm \times 4 mm)을 사용하였으며, mobile phase는 acetonitrile : 증류수 혼합액(80:20, v/v), flow rate는 1.0 mL/min, detector는 refractive index(Waters 410 Refractive Index)를 사용하였다.

폴리페놀 산화효소 및 과산화효소 활성

폴리페놀 산화효소(polyphenol oxidase, PPO) 및 과산화효소(peroxidase, POD) 활성은 Kim 등(13)의 방법으로 측정하였다. 0.5%의 polyvinylpyrrolidone(PVPP)를 함유하는 0.2 M sodium phosphate buffer(pH 7.0) 20 mL를 시료 10 g과 함께 homogenizer(Nissei AM-12, Nohon seiki Co., Tokyo, Japan)로 균질화 하여 4°C, 3,000 rpm의 조건으로 10분간 원심분리하여 그 상등액을 조효소액으로 하였다. PPO는 조효소액 0.8 mL에 균질화 시 사용한 것과 동일한 buffer로 만든 0.02 M의 catechol용액 2.4 mL를 넣어 420 nm의 흡광도로 측정하였으며, 흡광도가 1분당 0.001 변하는 것을 1 unit(U)으로 나타내었다. POD는 25 mM guaiacol 과 25 mM의 hydrogen peroxide를 함유한 0.05 M sodium phosphate buffer(pH 7.0) 2.8 mL에 조효소액 0.2 mL를 넣어 470 nm의 흡광도로 측정하였으며, 흡광도가 1분당 0.01 변하는 것을 1 unit(U)으로 나타내었다.

폴리페놀 함량

폴리페놀 함량은 Dewanto 등(14)의 방법에 따라 추출물 100 μL 에 2% sodium carbonate 2 mL과 50% Folin-Ciocalteu reagent 100 μL 를 가한 후 720 nm에서 흡광도를 측정하였으며 gallic acid(Sigma-Aldrich Co., USA)의 검량선에 의하여 함량을 산출하였다.

플라보노이드 함량

플라보노이드 함량은 Saleh와 Hameed(15)의 방법에 따라 추출물 100 mL에 5% sodium nitrite 0.15 mL을 가한 후 25°C에서 6분간 방치한 다음 10% aluminium chloride 0.3 mL를 가하여 25°C에서 5분간 방치하였다. 다음 1 N NaOH 1 mL를 가하고 vortex 상에서 가한 후 510 nm에서 흡광도를 측정하였으며 rutin hydrate(Sigma-Aldrich Co., USA)의 검량선에 의하여 함량을 산출하였다.

프로안토시아닌 함량

프로안토시아닌 함량은 Vanillin-sulfuric acid 법(16)에 따라 시료 200 µL에 1.2% vanillin 용액 500 µL와 20% sulfuric acid 500 µL를 혼합하여 20분간 방치한 후 500 nm에서 흡광도를 측정하였으며 (+)-catechin(Sigma-Aldrich Co., USA)의 검량선에 의하여 함량을 산출하였다.

총 비타민 C 함량

비타민 C(ascorbic acid)는 식품공전 방법에 의해 2,4-dinitrophenylhydrazine 법을 이용하여 측정하였으며, 일정 시료에 5%(w/v) metaphosphoric acid를 가하여 homogenizer (Nissei AM-12, Nihon seiki Co., Tokyo, Japan)로 10,000 rpm에서 1분간 마쇄 후, 원심분리(4°C, 5,000 rpm, 10 min)한 다음 상등액을 Whatman No. 1 여과지로 여과하여 비타민 C 추출물을 사용하였다. 비타민 C 함량 측정을 위하여 시료 2 mL에 0.2% 2,4-dichloropenolindophenol 용액을 가하고 1분간 방치 후, thiourea-metaphosphoric acid 용액 2 mL와 2,4-dinitrophenylhydrazine(DNP) 용액 1 mL를 가한 다음 50°C에서 1시간 반응시킨 후 얼음물로 냉각시켰다. 다음 85% sulfuric acid 5 mL를 천천히 첨가한 후 실온에서 30분간 방치하고 540 nm에서 흡광도를 측정하였으며, L(+)-ascorbic acid(Junsei Chemical Co., Japan)의 검량선에 의하여 ascorbic acid의 함량을 산출하였다.

DPPH 라디칼 소거활성

Blois 의 방법(17)에 따라 시액 0.2 mL에 0.4 mM 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl(DPPH) 용액 0.8 mL를 가하여 10분간 방치 한 다음 525 nm에서 흡광도를 측정하였으며 계산식, DPPH radical scavenging ability(%)=100-[(OD of sample/OD of control)×100]에 의하여 활성도를 산출하였다.

상관관계 분석 및 통계처리

모든 실험은 3회 반복으로 하여 평균치와 표준편차로 나타내었고, 유의성 검증은 SPSS(12, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) software를 이용하여 Duncan's multiple range test를 행하였다. 또한 폴리페놀 산화효소, 과산화효소, 색차 및 갈변도 간의 상관관계는 Pearson's correlation analysis를 통하여 분석하였다.

결과 및 고찰

색도 및 갈변도

반건시 당액침지 가공품을 20일간 7°C에 저장 후 색도 및 갈변도를 비교한 결과는 Table 2와 같다. 농도에 따라 당액침지한 반건시의 명도 및 채도의 경우 당액침지 처리 없이 저장한 대조구(control)와 비교하면 월등히 높게 나타났으며, 색차 및 갈변도는 낮게 나타났다. S0(sugar 0%)의 경우 대조구에 비해 명도와 채도는 높게 나타났으며 갈변되는 정도가 다소 낮은 것으로 관찰되었지만, 삼투작용으로 저장 10일 이후부터 외관이 허물어짐에 따라 품질열화가 발생하는 것을 알 수 있었다. 반면 S5~S20(sugar 5~20%)의 경우 색의 선도 유지 및 갈변도가 저해되었는데, 당액 농도가 증대될수록 색차 및 갈변도가 높아지는 것으로 관찰되었다. 이는 더덕에 설탕의 첨가량이 증대됨에 따라 명도가

Table 2. Changes in color parameters, ΔE , and browning degree of semi-dried persimmons soaked in sugar solutions with the addition of different proportions of sugar concentration depending on storage at 7°C for 20 days

Samples ¹⁾	L* values		Chroma values		ΔE	Browning degree (%)
	0 days	20 days	0 days	20 days		
Control	44.67±0.85	22.30±0.85	9.18±0.73	3.09±0.12	23.35±1.71	50.04±2.71
S0	48.20±0.95 ^{2)a3)}	27.51±0.65 ^c	0.69±0.08 ^b	13.00±0.04 ^a	26.37±0.54 ^d	42.93±0.53 ^a
S5	44.15±0.67 ^b	42.65±0.01 ^a	0.69±0.08 ^b	8.71±0.07 ^c	6.06±0.02 ^e	3.38±1.47 ^e
S10	43.94±0.36 ^b	39.55±0.05 ^b	0.70±0.03 ^b	12.05±0.04 ^b	7.77±0.04 ^d	9.99±0.79 ^d
S15	41.89±0.55 ^c	35.30±0.07 ^c	0.74±0.01 ^{ab}	10.70±0.10 ^c	11.99±0.08 ^c	15.71±1.27 ^c
S20	40.38±0.23 ^d	32.76±0.03 ^d	0.82±0.06 ^a	10.05±0.04 ^d	14.66±0.03 ^b	18.88±0.46 ^b

¹⁾S0, sugar 0%; S5, sugar 5%; S10, sugar 10%; S15, sugar 15%; S20, sugar 20%.

²⁾Values are mean±standard deviation of triplicate determinations.

³⁾Different superscripts within a column (a-e) indicate significant differences (p<0.05).

감소한다는 Jin 등(18)의 보고와 유사함을 알 수 있었으며, 당액 농도가 증대됨에 따라 과실의 갈변도가 높아지는 현상은 당액에 함유하는 흑설탕의 색도가 과실에 영향을 미침에 따른 결과로 생각된다. 한편 과실의 명도 및 채도의 경우 S10에서 높은 값을 나타내다가 그 이상의 농도에서 감소하는 것으로 보아 당액 적정 농도에서는 마일라드반응을 비롯한 효소적 갈변을 억제할 수 있는 것으로 관찰되었으며, S10의 경우 갈변도와 색상을 유지할 수 있는 적정 농도의 조건으로 생각된다.

총당, 환원당 및 유리당 함량

식품 중에 존재하는 당류는 화학적으로 환원성을 갖는

Table 3. Changes in total sugar content, reduced sugar content and sugar free contents of semi-dried persimmons soaked in sugar solutions with the addition of different proportions of sugar concentration depending on storage at 7°C for 20 days

Samples ¹⁾	TSC ²⁾	RSC ³⁾	Free sugar contents		Total
			Glucose	Fructose	
Control	80.05±2.42	74.87±2.61	32.49	35.12	67.61
S0	54.25±1.96 ⁴⁾⁵⁾	47.37±0.63 ^{d)}	18.33	21.85	40.18
S5	80.18±2.30 ^{c)}	66.52±2.40 ^{b)}	28.97	32.67	61.64
S10	83.35±0.45 ^{b)}	71.49±1.52 ^{c)}	30.85	34.84	65.69
S15	84.15±1.22 ^{b)}	74.77±1.81 ^{a)}	38.23	41.95	80.18
S20	88.64±1.73 ^{a)}	76.12±1.64 ^{a)}	42.03	42.25	84.28

¹⁾S0, sugar 0%; S5, sugar 5%; S10, sugar 10%; S15, sugar 15%; S20, sugar 20%.

²⁾TSC, total sugar content.

³⁾RSC, reducing sugar content.

⁴⁾Values are mean±standard deviation of triplicate determinations.

⁵⁾Different superscripts within a column (a-d) indicate significant differences (p<0.05).

환원당과 환원성을 갖지 않는 비환원당으로 나눌 수 있으며 이를 합하여 총당이라고 하고 과실에서 당분은 향기 생성과 단맛에도 영향을 주는 주요 성분이라 할 수 있다(19). 기호성에 영향을 주는 단맛과 연관이 있는 총당, 환원당 및 유리당 함량을 반건시 당액침지 가공품의 20일간 7°C에 저장 후 비교한 결과는 Table 3과 같다. 당액침지 처리 없이 저장한 대조구(control)의 총당, 환원당 및 유리당 함량은 각각 80.05%, 74.87% 및 67.61%이었으나, S0(sugar 0%)의 경우 각각 54.25%, 47.37% 및 40.18%로 상당량의 당이 삼투작용 때문에 용출된 것으로 나타났다. 반면 S5~S20(sugar 5~20%)의 경우 당의 농도가 증대될수록 총당, 환원당, 유리당 함량 또한 증가하는 것으로 나타났다. Youn 등(20)과 Kim 등(21)은 사과에서 삼투 처리한 시료는 처리하지 않은 시료보다 glucose와 fructose 함량은 더 낮았으며 삼투용액의 농도가 높아질수록 총당 및 유리당 함량이 증가하였고, 설탕용액에서 유입되는 것으로 추정한다고 보고하였으며 이는 본 연구의 결과와 일치하였다. 당액침지 가공품의 경우 과실의 형태를 유지하기 위해서는 과실과 침지액간의 농도 조절이 무엇보다 중요하며 상호 간의 조건이 적합하지 않을 시 수분의 용출과 함께 유기산과 유리당 또한 용출된다. S5의 경우 환원당과 유리당의 함량은 대조구에 비해 감소했지만, S10은 유사한 함량을 나타내었으며 S15 및 S20의 경우 과실에 함유하는 당의 농도가 증가하는 것으로 나타났다. 이는 S10은 과실과 당액간의 삼투작용을 조절할 수 있는 적정 농도 조건으로 생각되며, 반건시의 당액으로 적합할 것으로 생각된다.




Fig. 2. Polyphenol oxidase (PPO), peroxidase (POD) activity of semi-dried persimmons soaked in sugar solutions with the addition of different proportions of sugar concentration depending on storage at 7°C for 20 days.

S0, sugar 0%; S5, sugar 5%; S10, sugar 10%; S15, sugar 15%; S20, sugar 20%. Values are mean±standard deviation of triplicate determinations. Bars/mean values with different letters are significant differences (p<0.05).

폴리페놀 산화효소 및 과산화효소 활성

폴리페놀 산화효소(polyphenol oxidase, PPO) 및 과산화효소(peroxidase, POD)는 저장 중 과일 채소류의 품질변화를 나타내는 대표적인 갈변 관련 효소로 색도와 함께 갈변 측정의 중요한 지표로 이용된다(13). 반건시 당액침지 가공품을 20일간 7°C에 저장 후 폴리페놀 산화효소 및 과산화효소 활성을 비교한 결과는 Fig. 2와 같다. S0(sugar 0%)의 경우 폴리페놀 산화효소 및 과산화효소 활성이 각각 255.28 unit/min 및 240.82 unit/min로 높은 활성을 나타내었다. 반면 S5~S20(sugar 5~20%)의 폴리페놀 산화효소 활성은 각각 102.65 unit/min, 56.15 unit/min, 53.12 unit/min 및 55.67 unit/min로 월등히 저해되는 것으로 관찰되었으며, S10 이후부터는 유사한 활성을 나타내었다. 한편 과산화효소 활성은 S5~S20에서 각각 80.21 unit/min, 51.22 unit/min, 41.85 unit/min 및 38.58 unit/min로 당액 농도가 증대됨에 따라 유의적인 활성의 저하를 나타내었다. 과일 채소류에서 발생하는 갈변현상은 크게 폴리페놀 산화효소와 과산화효소가 관여하는 효소적 갈변과 성분 상호 간의 화학적 변화 때문에 발생하는 비효소적 갈변으로 구분되며, 신선 편이 식품 가공 시 발생하는 갈변은 주로 갈변효소에 의해 발생하는 경우가 대부분이다(22). 갈변효소 중 자연계에 널리 존재하는 폴리페놀 산화효소는 Cu^{2+} 를 함유한 효소로 산소 존재하에서 페놀화합물(phenolic compounds)을 산화시켜 o-quinon compounds를 만들고 이들 물질이 서로 중합되면서 갈색 또는 적색의 갈변물질을 생성하게 된다(23). 따라서 Cho 등(24)은 폴리페놀 산화효소 활성이 낮은 것은 효소적 갈변 현상이 억제되었음을 의미한다고 보고하였으며, 이는 당액 처리로 갈변 관련 효소의 활성이 억제되었음을 의미한다. Table 2에서 확인한 바와 같이 명도가 감소하고 채도값이 증가하는 경향은 색의 변화가 갈변정도를 나타내며 당의 농도가 증대됨에 따라 갈변 관련 효소의 활성은 저해되는

것으로 나타났으나 갈변도의 증가는 흑설탕의 색도가 과실에 침착함에 따른 현상으로 생각된다.

페놀화합물 함량, 비타민 C 함량 및 DPPH 라디칼 소거 활성

반건시 당액침지 가공품을 20일간 7°C에 저장 후 폴리페놀, 플라보노이드 및 프로안토시아니딘 함량, 비타민 C 함량 및 DPPH 라디칼 소거활성을 비교한 결과는 Table 4와 같다. 당액침지 처리 없이 저장한 대조구(control)의 폴리페놀, 플라보노이드, 프로안토시아니딘 및 비타민 C 함량의 경우 g당 각각 1.30 mg, 0.21 mg, 1.05 mg 및 6.38 mg의 함량이 검출되었으며, DPPH 라디칼 소거활성은 30.35%의 활성을 나타내었다. S0(sugar 0%)는 g당 각각 0.76 mg, 0.27 mg, 0.45 mg 및 2.54 mg로 상당량의 기능물질이 당과 함께 용출된 것으로 나타났으며, DPPH 라디칼 소거활성 또한 대조구에 비해 감소하였다. 식물에 존재하는 많은 phytochemical중 phenolic 화합물은 이차 대사산물로, 이들의 함량이 높을수록 항산화 활성은 증가하며, 항콜레스테롤 작용, 정장작용, 항암 및 항산화 작용 등의 생리적 효과도 높아지는 것으로 알려져 있다(25). 현재까지 약 4,000여 종이 알려진 플라보노이드류는 항산화 작용, 순환기계 질환의 예방, 항염증, 항알레르기, 항균, 항바이러스, 지질저하 작용, 면역증강 작용, 모세혈관 강화작용 등의 효능을 나타내는 것으로 알려졌으며 건조 및 전처리 방법에 따라 그 함량에 차이가 있다고 보고된 바 있다(26). 한편 당액 침지 가공품의 경우 S0와 비교하면 S5~S20(sugar 5~20%)에서 높은 기능물질을 함유하는 것으로 나타났으며, 특이한 현상은 S5와 비교하면 S10에서 그 함량과 활성이 증대되는 반면 S15와 S20에서는 다시 감소하는 결과를 나타내었다. Lazarides 등(6)은 과일과 채소 등 높은 삼투압의 당과 염 용액에 침지할 경우 식품과 용액 사이에 삼투압 효과로

Table 4. Total polyphenol, flavonoid, proanthocyanidin, ascorbic acid contents and DPPH radical scavenging ability of semi-dried persimmons soaked in sugar solutions with the addition of different proportions of sugar concentration depending on storage at 7°C for 20 days

Samples ¹⁾	Polyphenols (mg GAE ²⁾ /g)	Flavonoids (mg% RHE ³⁾ /g)	Proanthocyanidins (mg CE ⁴⁾ /g)	Total ascorbic acid (mg/g)	DPPH radical scavenging ability (%)
Control	1.30±0.02 ⁵⁾	0.21±0.00	1.05±0.01	6.38±0.16	30.35±0.10
S0	0.76±0.02 ⁶⁾	0.27±0.00 ^a	0.45±0.03 ^c	2.54±0.00 ^c	28.19±0.05 ^d
S5	1.47±0.00 ^b	0.20±0.00 ^{bc}	1.24±0.00 ^b	7.76±0.04 ^b	35.23±0.69 ^b
S10	1.66±0.01 ^a	0.21±0.01 ^b	1.26±0.00 ^a	12.29±0.00 ^a	65.34±0.44 ^a
S15	1.41±0.04 ^c	0.19±0.00 ^{cd}	1.23±0.00 ^b	6.05±0.02 ^c	33.37±0.04 ^c
S20	1.40±0.00 ^c	0.18±0.01 ^d	1.22±0.00 ^b	5.05±0.01 ^d	20.98±0.03 ^c

¹⁾S0, sugar 0%; S5, sugar 5%; S10, sugar 10%; S15, sugar 15%; S20, sugar 20%.

²⁾GAE, gallic acid equivalents.

³⁾RHE, rutin hydrate equivalents.

⁴⁾CE, catechin hydrate equivalents.

⁵⁾Values are mean±standard deviation of triplicate determinations.

⁶⁾Different superscripts within a column (a-e) indicate significant differences (p<0.05).

인하여 용질의 확산, 용액 속으로 수분 이동, 식품으로부터 용질 용출 등이 일어난다고 하였으며, 본 연구의 결과에서 삼투작용이 일어남과 동시에 유용성분 또한 용출될 수 있음을 나타내며 과실과 당의 농도 어느 한쪽이 낮거나 높을 시 침지되는 과실의 열매껍질이 삼투작용으로 인해 물러지면서 기능성분의 용출이 발생한 것으로 생각된다.

상관관계

반건시 당액침지 가공품을 20일간 7°C에 저장 후 반건시의 폴리페놀 산화효소, 과산화효소, 색차 및 갈변도와 의 상관관계를 분석한 결과는 Table 5와 같다. 폴리페놀 산화효소 활성과 과산화효소 활성, 색차 및 갈변도간의 상관관계가 높았으며, 상관계수는 각각 0.933, 0.957, 0.824로 양의 상관관계를 보였다($p < 0.01$). 과산화효소 활성이 높을수록 색차와 갈변도가 높았으며($p < 0.01$). 그리고 색차와 갈변도 간에도 0.943으로 양의 상관계수를 나타내었다($p < 0.01$). 따라서 폴리페놀 산화효소 및 과산화효소와 색차, 갈변도 상호간의 상호 상관관계가 있어 당액침지 반건시의 품질특성은 나타내는 색의 변화나 갈변도를 측정함으로써 효소활성 또한 변화정도를 추측할 수 있을 것으로 판단된다.

Table 5. Correlation coefficients among polyphenol oxidase, peroxidase, delta E and browning degree of semi-dried persimmons soaked in sugar solutions with the addition of different proportions of sugar concentration depending on storage at 7°C for 20 days

Factor ¹⁾	PPO	POD	Delta E	BD
PPO	1.000	0.933**	0.957**	0.824**
POD		1.000	0.967**	0.835**
Delta E			1.000	0.943**
BD				1.000

¹⁾PPO, polyphenol oxidase; POD, peroxidase; BD, browning degree.
* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$.

요 약

반건시의 활용성 증대를 위하여 당액침지형 반건시를 제조하였으며 당 조성에 따른 반건시의 이화학적 특성 및 갈변 저해 효과를 검토하였다. 명도와 채도는 S5(sugar 5%), S10(sugar 10%)에서 높았고 그 이상의 농도에서는 감소하는 경향을 나타내었다. 총당, 환원당 및 유리당 함량은 당의 농도가 증대될수록 증가하였으며, S5는 대조구에 비해 감소하는 경향을 나타내었으나 S10은 유사한 함량을 보였으며 S15 및 S20의 경우 과실에 함유하는 당의 농도가 증가하는 것으로 나타났다. 당액침지형 반건시와 갈변효소간의 관계를 알아보기 위해 폴리페놀 산화효소와 과산화효소를 측정하였으며, 당액 농도가 증대됨에 따라 활성이 저해하

는 경향을 나타냈고 S10 이후부터는 유사한 활성을 보였다. 폴리페놀, 플라보노이드, 프로안토시아니딘 및 비타민 C 함량은 다른 처리구와 비교하면 S10이 가장 높은 함량을 보여 식품과 당액 사이에 삼투압 때문에 당액으로 용출되는 함량이 감소하는 것으로 나타났다. DPPH 라디칼 소거활성은 S10에서 65.34%로 가장 높은 활성을 나타내었다. 이상의 결과 당액침지 시 삼투작용으로 적정 농도의 확립이 요구되며 갈변억제 및 영양적인 가치 등의 품질특성을 고려하였을 때 10% 설탕을 첨가한 당액 침지법이 반건시 가공품을 제조하는 데 있어 효과적인 방안이 될 것으로 생각된다.

References

1. Kang BH, Jo MY, Hur SS, Shin KS, Lee DS, Lee SH, Lee JM (2012) Isolation and identification of contaminated organisms on dried persimmon. Korean J Food Preserv, 19, 939-945
2. Kim YJ, Lee SJ, Kim MY, Kim GR, Chung HS, Park HJ, Kim MO, Kwon JH (2009) Physicochemical and organoleptic qualities of sliced-dried persimmons as affected by drying methods. Korean J Food Sci Technol, 41, 64-68
3. Seo JH, Jeong YJ, Kim KS (2000) Physiological characteristics of tannins isolated from astringent persimmon fruits. Korean J Food Sci Technol, 32, 212-217
4. Jung KM, Song IK, Cho DH, Chou YD (2004) Quality properties of semi-dried persimmons with various drying methods and ripeness degree. Korean J Food Preserv, 11, 189-194
5. Park HW, Kim SH, Lee SA, Park JD (2012) Quality change of chill-stored dried persimmons affected by cinnamon extract pre-treatment and packaging condition. Korean J Packaging Sci Technol, 18, 9-14
6. Lazarides HN, Katsanidis E, Nikolaidis A (1995) Mass transfer kinetics during osmotic preconcentration aiming at minimal solid uptake. J Food Eng, 25, 151-166
7. Sablani SS, Rahman MS, Al-Sadeiri DS (2002) Equilibrium distribution data for osmotic drying of apple cubes in sugar-water solution. J Food Eng, 52, 193-199
8. Song NE, Song YR, Kim JH, Kim YE, Han AR, Jeong DY, Baik SH (2011) Development of sugar-soaked black soybean snack and its quality change on functional components. J Korean Soc Food Sci Nutr, 40, 853-859
9. Paek JK, Kim JH, Yoon SJ (2006) Quality characteristics

- of Ginseng Jung Kwa after different soaking times in sugar syrup. *Korean J Food Cookery Sci*, 22, 792-798
10. Kim JY, Yi YH (2010) pH, acidity, color, amino acids, reducing sugars, total sugars, and alcohol in puffed millet powder containing millet *Takju* during fermentation. *Korean J Food Sci Technol*, 42, 727-732
 11. Miller GL (1959) Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. *Anal Chem*, 31, 426-428
 12. Wilson AM, Work TM, Bushway AA, Bushway RJ (1981) HPLC determination of fructose, glucose and sucrose in potatoes. *J Food Sci*, 46, 300-306
 13. Kim DH, Kim SM, Kim HB, Moon KD (2012) Effects of optimized co-treatment conditions with ultrasound and low-temperature blanching using the response surface methodology on the browning and quality of fresh-cut lettuce. *Korean J Food Preserv*, 19, 470-476
 14. Dewanto V, Wu X, Adom KK, Liu RH (2002) Thermal processing enhances the nutritional value of tomatoes by increasing total antioxidant activity. *J Agric Food Chem*, 50, 3010-3014
 15. Saleh ES, Hameed A (2008) Total phenolic contents and free radical scavenging activity of certain Egyptian *Ficus* species leaf samples. *Food Chem*, 114, 1271-1277
 16. Baoshan S, Jorge MR, Isabel S (1998) Critical factors of vanillin assay for catechins and proanthocyanidins. *J Agric Food Chem*, 46, 4267-4274
 17. Blois MS (1958) Antioxidant determination by the use of a stable free radical. *Nature*, 26, 1199-1200
 18. Jin TY, Wang MH (2013) Quality characteristics of *Codonopsis lanceolata* tea manufactured with sugar. *J Korean Soc Food Sci Nutr*, 42, 753-758
 19. Kim JW, Youn KS (2013) Effect of ripeness degree on the physicochemical properties and antioxidative activity of banana. *Korean J Food Preserv*, 20, 475-481
 20. Youn KS, Lee JH, Choi YH (1996) Changes of free sugar and organic acid in the osmotic dehydration process of apples. *Korean J Food Sci Technol*, 28, 1095-1103
 21. Kim GC, Lee SY, Kim KM, Kim Y, Kim JS, Kim HR (2011) Quality characteristics of hot-air and freeze dried apples slices after osmotic dehydration. *J Korean Soc Food Sci Nutr*, 40, 848-852
 22. Moon SM, Kim HJ, Ham KS (2003) Purification and characterization of polyphenol oxidase from lotus root (*Nelumbo nucifera* G.). *Korean J Food Sci Technol*, 35, 791-796
 23. Martinez MV, Whitaker JR (1995) The biochemistry and control of enzymatic browning. *Trend Food Sci Technol*, 6, 195-200
 24. Cho JS, Kim DH, Park JH, Moon KD (2013) Analysis of browning degree on fresh-cut lotus root (*Nelumbo nucifera* G.) using image analysis. *Korean J Food Preserv*, 20, 760-765
 25. Zhou ZH, Zhang YJ, Xiao R, Xu M, Yang CR (2005) Puerins A and B, two new 8-C substituted flavan-3-ols from Pu-er tea. *J Agric Food Chem*, 53, 8614
 26. Kim HS, Hong MJ, Kang IY, Jung JY, Kim HK, Shin YS, Jun HJ, Suh JK, Kang YH (2009) Radical scavenging activities and antioxidant constituents of Oriental melon extract. *J Bio-Environ Control*, 18, 442-447