

수질-P3

Investigation about enzymatic properties of the gene encoding catechol 1,2-dioxygenase from Phenol-degrading, *Rhodococcus* sp. EL-GT

이희정¹, 이오미, 김기한¹, 박근태¹, 박재림², 이상준¹

부산대학교 환경시스템학과, ¹미생물학과, 신라대학교 ²환경공학과

1. 서 론

화학공업의 발달과 방향족 화합물의 사용량의 증가로 인한 자연계에 과다 유출은 이를 방향족 화합물이 가지는 강한 독성 및 구조적으로 안정한 난분해성의 특성으로 심각한 환경오염 문제를 유발하고 있는 방향족 화합물의 처리는 최근들어 완전한 mineralization을 위한 생물학적 처리 즉 미생물을 이용한 방법이 각광을 받고 있다.

이들 거의 모든 화합물들은 자연계 미생물에 의해 생산되는 효소들에 의해 생분해되며, 미생물에 의한 각종 방향족 화합물의 분해에 관여하는 효소 유전자는 분해 플라스미드 또는 chromosomal DNA에 operon 형태로 존재한다.

따라서 이들 분해 미생물의 분해 효소의 특징 및 유전자의 특성 확인과 이들의 발현 증대를 위한 각종 연구는 난분해성 화합물의 효과적인 처리를 위하여 필수적이다.

본 연구에서는 폐놀분해능 및 다양한 화합물의 분해능을 가지는 미생물인 *Rhodococcus* sp. EL-GT를 이용하여, 폐놀분해에 관여하는 효소의 특성 및 유전자의 구조를 밝히고자 하였다. 미생물에 의한 방향족 화합물의 분해과정에서는 common intermediate인 catechol을 형성하며, catechol의 벤젠고리가 미생물이 분비하는 효소의 작용으로 개환되면서 지방족 화합물로 변형된 후 효소반응에 의해 완전 분해된다. 이러한 catechol 개환은 *ortho-pathway*와 *meta-pathway*의 두 경로로 보고되고 있다. 본 연구의 폐놀분해에 이용하는 *Rhodococcus* sp. EL-GT는 *ortho-pathway*의 분해 경로를 가지는 것으로 확인되었으며, 이때 대사과정에 관여하는 catechol 1,2-dioxygenase 유전자의 구조 및 효소학적 특성을 밝히고자 한다.

2. 재료 및 방법

폐놀분해 균주는 하수처리장의 활성슬러지에서 분리한 *Rhodococcus* sp. EL-GT를 사용하였다. 5.3 mM KH₂PO₄, 32 mM Na₂HPO₄, 18 mM NH₄NO₃,

1 mM MgSO₄ · 7H₂O, 50 μM CaCl₂ · 2H₂O, 0.5 μM FeCl₃의 최소배지에 단일 탄소원으로 0.1%의 폐놀을 가하여 배양하였다. 균주의 대량 배양은 5 l jar fermenter를 이용하였다. 효소의 정제는 DEAE-Sephadex column(10 cm × 2.6 cm)을 이용하여 추출하였고, catechol 1,2-dioxygenase 효소 활성 측정은 Hegeman의 방법을 이용하였다. 폐놀분해는 standard method의 colorimetric assay를 변형하여 측정하였으며, 단백질 농도의 측정

은 Bradford의 방법을 이용하였다. 분해효소의 유전자 위치와 구조를 밝히기 위해 이용된 형질전환 숙주로는 *E. coli* DH5 α 를 사용하였고, DNA의 추출 및 조작은 Silhavy 등의 방법을 일부 변용하여 추출하였다.

3. 결과 및 고찰

catechol 1,2-dioxygenase activity assay

1,2-dioxygenase activity는 폐놀농도 1000 mg/l를 유지하며 생육도(600 nm)에서 0.8 정도로 균체를 배양하여 측정한 결과는 Table 1과 같다. catechol 1,2-dioxygenase activity의 specific activity은 0.38 unit로 나타났고, 이는 균체의 증식과 유사한 대수기에 높게 나타났다.

Rhodococcus sp. EL-GT 의 폐놀분해

폐놀농도별, 온도별, pH별로 측정하여 본 결과 본 균주에 의한 폐놀분해능은 30°C, pH 7.0이상에서 폐놀농도 1000 mg/l 이하는 24시간만에 모두 분해되었고, 48시간 이후에는 2500 mg/l농도까지도 분해가능성을 확인할 수 있었다.

또한 *Rhodococcus* sp. EL-GT의 폐놀분해는 pH 7~10 의 범위에서 효율적으로 이루어졌으며, 최대 pH 5에서 pH 11정도로 광범위하게 분해가 안정적으로 이루어졌다. catechol 1,2-dioxygenase activity는 pH 7.5~8.0사이에서 가장 높은 활성을 나타내었다.

다른 유사한 세균에서 밝혀진 catecol 1,2-dioxygenase encoding gene을 primer로 primer(F) 5'-GGAATTCCATATGACCACCAACGAAAACCCCAC-3', primer(R) 5'-GAAGATCTCAGGCCTCGGGGTCGAGCGCGAA-3'이용하여 *Rhodococcus* sp. EL-GT의 Catechol 1,2-dioxygenase gene을 규명하고자 PCR을 수행한 결과 PCR product는 830bp를 나타내었다.

4. 요약

본 연구는 방향족 화합물질 중 폐놀폐수에 대한 생물학적 처리를 위해 본 실험실에서 분리한 폐놀분해능이 우수한 *Rhodococcus* sp. EL-GT를 이용하여 catechol 분해 catechol 1,2-dioxygenase 분해활성을 측정하였고, 이것이 *ortho-pathway*임을 확인할 수 있었다. 또한 다른 연구에서 보고된 *Rhodococcus rhodochrous* NCIMB 13259 균주의 catechol 1,2 dioxygenase를 기초로한 primer를 이용하여 PCR을 수행하였으며 이 분해 유전자의 cloning실험을 수행 중이다. 이를 실험을 통하여 *Rhodococcus* sp. EL-GT의 폐놀분해 균의 유전적 구조 및 특성을 검토하고 이를 이용하여 방향족 화합물의 분해능이 보다 우수한 균주의 개발을 시도하고자 한다.

참 고 문 헌

박근태, 2000, 單· 및 混合 微生物 個體群을 利用한 好氣性 生物膜의 폐놀 廢水 處理와 特性, 부산대학교 박사 학위 논문.

- Hegeman. G.D, 1966, Synthesis of the enzyme of the mandelate pathway by *Pseudomonas putida*. I. Synthesis of the enzymes by the wild type, J. Bacteriol. Vol 91, pp 1140-1154.
- Bradford. M. M, 1976, A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle protein-dye binding, Anal. Biochem., Vol. 72, pp 248-254.