

▶ 특별강연 - V

쌀의 영양학적·기능적 우수성

하태열

한국식품개발연구원 쌀연구팀

쌀은 우리 조상 대대로 이어온 주식으로서 우리나라 식생활의 근본을 이루며 우리의 식문화를 형성하여 왔다. 쌀의 자급자족이 어려웠던 과거에는 쌀의 증산이 농업의 중요한 과제이었으며 다수 확 품종을 개발, 재배기술의 발전등 쌀의 증산 정책에 부단한 노력을 기울여 왔다. 이와 동시에 부족한 쌀을 보충하기 위하여 한때에는 밀 분식, 혼식을 적극 권장하는 등 절미 운동과 더불어 쌀에 대한 영양학적 연구 부족이 가세하여 한때는 밀의 영양을 강조하기도 하여 쌀의 영양과 건강에 대한 올바른 정보가 제공되지 못하였고 쌀의 영양에 대한 그릇된 인식이 확산되어 왔다. 한편, 우리나라 국민의 쌀 소비량은 매년 감소하여 1980년대 1인당 연간 소비량이 132.4kg 이던 것이 2000년 현재 93.6kg으로 급격하게 감소하고 있다. 이러한 쌀 소비량의 감소는 우리의 식생활에서 주식보다 부식의 량이 증가한 것도 하나의 원인으로 들 수 있으나 무엇보다 특히 젊은이들의 식생활양식이 서구화되어 감에 따라 주식이 밥에서 햄버거, 피자, fried chicken등의 fast food로 그 선호도가 전환된 것이 매우 큰 원인으로 들 수 있다. 이와 더불어 성인병의 발병은 점차 증가되어 국민건강을 위협하고 있어 사회적 문제로 크게 대두되고 있으며 근년의 역학조사 결과 이러한 성인병의 증가 원인은 서구식 식생활과 관련이 깊다고 알려져 있다. 미국을 비롯한 서구에서는 성인병이 많아지자 이를 예방하기 위하여 밥 중심의 식생활에 관심을 기울이고 있으며 쌀에 대한 영양학적 연구도 상당히 활발하게 이루어지고 있다. 그러나 오랫동안 쌀을 먹고 왔고 지금도 먹고 있는 우리나라에서는 밥 중심 식생활의 영양학적 우수성을 인식하지 못하고 있는 실정이다.

따라서 본고에서는 그 동안 연구된 쌀의 영양에 관한 연구결과들을 중심으로 우리의 주식인 쌀의 영양학적, 기능적 우수성에 대하여 재검토해 보고자 한다.

1. 쌀의 영양학적 우수성

쌀의 일반 영양성분은 쌀의 품종, 재배지역등에 따라 다소 차이는 있으나 백미의 경우 가식부 100g당 76.8g이 당질이고 단백질이 6.8g, 지방이 1.0g, 조섬유가 0.4g등으로 구성되어 있고 회분 함량은 약 0.5 mg/100g이 함유되어 있으며 무기질로서는 인과 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 나트륨, 철분이 함유되어 있다. 이 중 마그네슘과 칼륨의 비는 밥맛과도 높은 상관관계를 갖는 것으로 보고되고 있고 특히, 현미와 미강은 무기질의 공급원으로서도 매우 중요하다. 또한 쌀에는 비타민 B₁(thiamin), B₂(riboflavin)등 비타민 B복합체가 풍부하게 들어 있으나 비타민 B복합체는 물에 녹으므로 쌀을 셋을 때 손실되지 않도록 유의하여야 한다. 이외에도 쌀에는 비타민 E, 엽산, 니아신 등 인체에 중요한 여러가지 비타민을 공급하며 식이섬유의 공급원으로서도 중요한 역할을 한다. 뿐만 아니라 백미중의 소화 흡수되지 않는 전분(enzyme resistant starch)도 식이섬유와 유사한 작용을 하는 것으로 최근 보고되고 있다.

가. 쌀 단백질

쌀은 단백질의 공급원으로서도 중요하다. 쌀에는 6-8%의 단백질이 함유되어 있으며 글루테린(glutelin)이 쌀단백질의 주성분으로서 60-67%를 차지하고 있고 글로불린과 알부민, 프롤라민도 소량 함유되어 있다. 쌀에는 다른 곡류에 비하여 단백질함량은 적지만 아미노산의 분포에 있어서 필수 아미노산인 리진(lysine) 함량은 옥수수, 조, 밀가루보다 약 2배 정도 더 높다. 그리고 백미와 다른 곡류의 아미노산가를 비교하여 보면 백미는 옥수수, 밀가루등에 비하여 현저히 높다. 즉 백미의 아미노산가는 65이고 밀가루(박력분)는 44, 옥수수는 32이다. 이와 같이 쌀은 다른 곡류에 비

하여 양질의 단백질을 갖고 있는 것이다. 쌀단백질은 혈중 콜레스테롤, 중성지방 농도를 감소시킨다. 흰쥐에게 각종 식이단백질을 급여하여 혈액중 콜레스테롤, 중성지방, 인지질의 농도를 측정한 Sugano등의 연구에 의하면 쌀단백질 투여군은 카제인, 생선단백질, 콩단백질 등에 비하여 혈중 콜레스테롤, 중성지방 농도가 현저히 감소하였다고 보고하고 있다.

나. 쌀 식이섬유

특히 현미에 함유되어 있는 식이섬유인 헤미셀룰로오즈는 체내 콜레스테롤수준을 감소시킬 뿐만 아니라 변비를 예방하는 효과가 있는 것으로 보고되어 있으며 헤미셀룰로오즈를 효소 처리하여 생성되는 아라비녹시란은 면역력을 증가시키고 암예방 효과도 기대된다고 보고되어 있다. 또한 쌀 식이섬유의 일종인 피틴산(phytic acid, IP₆)도 체내 면역력을 증가시키고 유방암과 대장암의 예방에 효과적인 것으로 보고가 되고 있다. 예를 들면 7,12-dimethylbenz(a)anthracene 유발 대장암 모델에서 0.4% IP₆ 첨가는 암의 발생율, 1마리당 암발생수 등이 대조군에 비하여 유의하게 감소하였고, F344 rat을 이용한 Azoxymethane(AOM) 유발 대장암모델에서도 0.1% IP₆ 첨가는 대장암 발생빈도를 유의하게 감소시켰고 1%IP₆ 첨가시는 그 효과가 더 높게 나타나 농도의존성을 나타내었다고 보고되어 IP₆는 대장암 예방에 효과적인 것으로 보고되고 있다. 그 외에도 전분식품중의 enzyme resistant starch는 대장에서 혈기적으로 발효되어 단쇄지방산(short-chain fatty acids)을 생성하며 이 발효 생성물들은 지질대사, 당대사, 대장암 등에 좋은 효과를 나타내는 것으로 보고되어 있다.

2. 쌀의 기능적 우수성

최근 들어 쌀의 기능적 우수성에 관한 연구결과들에 의하면 우리의 주식인 쌀에 있어서도 콜레스테롤 저하효과, 항산화, 혈압조절, 당뇨병 예방, 암예방 효과등을 기대할 수 있으며 이를 종합해 보면 다음과 같다.

가. 콜레스테롤 저하효과

혈중 콜레스테롤 농도는 동맥경화를 원인으로 하는 심질환 발생의 주요 위험인자로 인식되어 있으며 이는 식이성분에 의해서도 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 우리의 주식인 쌀은 당질급원으로만 인식되어 왔으나 근년에는 쌀의 생리적 기능에 대한 연구가 미강을 중심으로 활발해지고 있고, 그 중에서도 쌀의 콜레스테롤 저하작용에 관하여 현미 또는 미강을 중심으로 많은 보고가 있으며 또한 최근에는 백미 및 현미에 있어서도 콜레스테롤 저하효과가 있는 것으로 보고되고 있고 특히 쌀에서 분리된 쌀 단백질은 고지혈증 개선효과가 뚜렷한 것으로 보고되어 있다.

1) 쌀 및 쌀단백질의 콜레스테롤 저하효과

저자들은 최근 흰쥐를 이용해 쌀이 생체내 지질대사에 미치는 영향을 검토하였다. 당질급원으로서 한국인이 주로 섭취하고 있는 쌀(현미, 백미)과 밀, 설탕을 흰쥐에 급여한 후 옥수수전분과 비교 분석한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다.

우선 혈액중 중성지방과 콜레스테롤 함량을 보면 백미군이 다른 4군에 비하여 유의하게 낮았고 옥수수전분군, 현미군, 밀가루군은 거의 비슷한 값을 보였으며 설탕군이 유의하게 높았다. HDL콜레스테롤에는 당질급원에 따른 차이를 보이지 않았다. 또한, 간장중의 각종 지질 함량을 조사한 결과에 있어서도 총 지질함량은 당질 급원에 따라 통계적 유의차가 없었으나 현미군에서 낮은 경향을 보였다. 중성지방 함량은 현미군에서 다른 4군에 비하여 통계적으로 유의하게 낮은 값을 나타내었고 다른 4군은 거의 비슷한 값을 나타내었다. 총콜레스테롤은 현미, 백미, 밀가루군이 옥수수전분군에 비하여 낮은 값을 보였고 설탕군에 비하여 유의하게 낮았다. 인지질 함량은 밀가루군이 다른 4군에 비하여 유의하게 높았고 다른 4군은 거의 비슷한 경향을 보였다. 특히 간장중에서는 현미식이가 설탕군, 옥수수전분군에 비해서 유의하게 낮은 값을 나타내었고 백미보다도 낮은

경향을 보여 현미가 간장중의 지질 축적을 억제시키는 효과가 강한 것으로 보인다.

이상 혈중 및 간장중에서 나타난 결과를 종합 해보면 현미와 백미는 일반적으로 섭취하는 전분질 급원중에서 생체내 지질함량을 낮추는 효과가 있으며 특히 현미에서는 간장중 지질축적을 억제하는 효과가 뚜렷한 것으로 보인다.

한편, 우리나라 국민의 영양섭취실태를 보면 식이단백질의 약 25%를 곡류에서 섭취하고 있는데 그 대부분은 쌀에서 섭취하고 있다. 최근 쌀 단백질의 생리기능 특성에 대해 보고되고 있는데, 예를들면, 쌀단백질의 가수분해물이 혈압상승을 억제시키고, 자연발증 유방암 모델 흰쥐를 이용한 실험에서는 쌀단백질이 유방암의 발병을 자연시킨다는 보고들(森田과 桐山 1993)이 있어 동물성 단백질 섭취가 풍부한 지금에는 종래 식물성 단백질로서 부정적인 측면만을 생각해 오던 것과는 달리 건강에 미치는 쌀단백질의 영향에 대해 새롭게 인식되어 가고 있다. 식물성 단백질의 생리적 기능에 관해서는 대두단백질과 지질대사에 관한 연구가 폭넓게 수행되어 왔으나 우리의 주식인 쌀단백질에 대해서는 연구는 거의 전무하였다. 따라서 저자들은 우리나라 국민이 매일 섭취하고 있는 쌀단백질이 생체내 지질대사에 미치는 영향을 밝히기 위하여 쌀단백질을 분리하여 흰쥐에게 사육한 후 혈액 및 조직중의 콜레스테롤 함량과 분변중의 지질 및 담즙산의 배설량을 카제인 투여군과 비교 분석하였다. 그 결과, 우선 혈중 지방함량의 변화를 보면 고지방식이를 섭취한 흰쥐에 있어서 고지방식이군은 카제인군에 비하여 낮은 값을 나타낸 반면, HDL-콜레스테롤 함량은 쌀단백질군이 카제인군에 비하여 높은 경향을 나타내었다. 간장중 총지질함량은 쌀단백질군이 카제인군에 비하여 유의하게 낮은 값을 나타내었고 간장 중성지방 및 콜레스테롤 함량도 총지질함량과 같은 경향으로 쌀단백질군이 카제인군에 비하여 유의하게 낮은 값을 나타내었으며 쌀단백질의 첨가량이 높아질 수록 간장중의 콜레스테롤 축적량이 유의하게 감소하였다. 분변중의 지질 및 담즙산 배설량을 조사한 결과 총지질함량 및 중성지방의 배설량은 쌀단백질군이 카제인군에 비하여 약간 높은 경향을 나타내었고 특히, 콜레스테롤 배설량은 쌀단백질군이 카제인군 보다 유의하게 높은 값을 보였다. 담즙산의 배설량도 콜레스테롤과 같이 쌀단백질군이 카제인군보다 그 배설량이 유의하게 많았으며 쌀단백질의 첨가량이 많을 수록 담즙산 배설량도 증가하였다.

이상의 결과로서는 쌀단백질이 체내 지질 특히 콜레스테롤 상승을 억제시키는 효과는 쌀단백질이 콜레스테롤과 중성지방 및 담즙산의 분변중 배설을 증가시킴으로서 일부 영향을 받는다고 사료되나 그 작용기작에 대해서는 더 많은 연구가 필요하다.

2) 미강의 콜레스테롤 저하효과

미강중에는 혈중 콜레스테롤을 저하시키는 효과가 있는 것으로 알려져 있으며 이는 실험동물에서 뿐만 아니라 사람을 대상으로 한 임상실험(Sharma and Rumiki 1986)에서도 확인되어 있다. 예를 들면, Kahlon(1989)등은 고콜레스테롤 혈증 햄스터에게 미강을 주어 3주간 사육한 결과 혈중 및 간장에서 콜레스테롤 저하효과가 현저하였다고 보고하고 있다. 또한 Sharma와 Rumiki(1986)의 연구에 의하면 흰쥐에게 미강유를 식이의 10%로 첨가하였을 때 혈중 총콜레스테롤, LDL콜레스테롤, VLDL콜레스테롤은 유의하게 감소하였고 HDL콜레스테롤은 반대로 증가하였다고 한다. 이외에도 오리자늘, 와스와 같은 미강유 추출분획들도 흰쥐에서 체내 콜레스테롤 저하효과를 나타내고 있으며 이러한 미강 및 미강유의 콜레스테롤 저하효과는 흰쥐, 햄스터 뿐만 아니라 원숭이에서도 다양하게 검토되어 있다. 뿐만 아니라 동물실험에서의 이러한 효과들은 임상실험에 있어서도 분명하게 나타나 있다. 고지혈증 환자에게 6주간 미강을 주었더니 혈중 총콜레스테롤, LDL콜레스테롤, VLDL콜레스테롤이 감소하는 반면 HDL콜레스테롤은 증가하였다는 보고가 있으며, Raghuram등(1989)의 연구에서는 고콜레스테롤, 고중성지방 혈증을 나타내는 사람에게 미강유를 1개월간 섭취시켰을 때 혈중 콜레스테롤 및 중성지방농도가 현저히 감소하였다. 이외에도 사람에게 미강식이를 공급하였을 때 총콜레스테롤에 대한 HDL-콜레스테롤의 감소, LDL-콜레스테롤의 저하, total-콜레스테롤의 저하등이 보고되어 있다. 이상의 결과들을 종합해 볼 때 미강에는 생체내 콜레스테롤을

을 저하 효과가 있는 것은 확실하다. 그러나 미강의 이러한 콜레스테롤 저하작용의 메카니즘, 또는 활성을 나타내는 성분에 대해서는 몇몇 단편적인 보고(Gerhardt and Gallo, 1989, Hegsted, 1990)가 있을 뿐이다. 예를 들면 Ayano등(1980)은 미강중의 헤미셀룰로오즈를 분리하여 흰쥐에게 급여한 결과 혈청 콜레스테롤 상승억제효과를 나타내었으며 이는 담즙산의 배설을 촉진함으로서 혈청 콜레스테롤 상승을 억제한 것으로 추정하고 있다. 이밖에 미강에서 콜레스테롤 저하효과를 가지는 인자들로서는 γ -oryzanol, 불포화지방(unsaturated fat), tocotrienol, β -sitosterol 등이 제안되고 있다. 특히 tocotrienol의 cholesterol lowering effect가 잘 알려져 있고 동물실험 뿐만 아니라 임상실험에서도 그 효과가 입증되고 있으며 작용기작중의 하나로서는 콜레스테롤 생합성 효소인 HMG-CoA reductase 활성 억제가 알려져 있다.

나. 항산화 효과

쌀 특히 현미중에는 비타민 E나 γ -oryzanol, tocotrienol, ferulic acid과 같은 강한 항산화제가 다량 함유되어 있다. 쌀의 지방은 대부분이 산화되기 쉬운 불포화지방산으로 구성되어 있으나 쉽게 산화되지 않는 것은 이들이 존재하기 때문이다. 또한 이러한 항산화제는 인체내에서는 생체막의 손상이나 지질의 과산화를 억제하여 노화방지에도 중요한 역할을 한다.

비타민 E의 건강에 미치는 영향에 대해서는 많은 연구가 되어 있다. 즉 비타민 E는 혈소판 응집을 방지하고 혈액순환을 촉진시키며 인체내에서 생긴 free radical을 제거하여 노화를 억제시키며, 또한 혈중 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL cholesterol)을 감소시키고 고밀도지단백 콜레스테롤(HDL cholesterol)을 증가시켜서 동맥경화증 예방에도 유효하다. 특히, Suarna 등은 쌀의 tocotrienols가 흰쥐 및 사람의 liprotein의 지질과산화를 유의하게 억제한다고 보고하고 있으며 또한 α -tocotrienol은 흰쥐 간장 microsomal membranes 계에서 Fe^{2+} -ascorbate 유발 과산화 지질 생성 억제능이 α -tocopherol에 비하여 40배 이상 높게 나타난다고 보고하고 있다.

다. 혈압 조절 효과

최근에 백미 또는 미강중의 단백질 분해산물중에서 혈압상승에 관련되는 효소(Angiotensin converting enzyme)의 활성을 저해하는 펩타이드(angiotensin converting enzyme inhibitor)가 류 등에 의하여 분리되어 백미 및 미강이 혈압상승을 억제하는 효과가 기대되고 있다. 한편, 쌀을 홍국균으로 발효시킨 홍국미는 체내 콜레스테롤 생합성을 억제하는 것으로 밝혀져 홍국미로부터 콜레스테롤 강하제를 개발하여 이미 시판되고 있으며 홍국미추출물을 자연발증고혈압쥐(SHR)에게 투여하였을 때 혈압이 유의하게 감소하였다는 보고와 사람을 대상으로 한 임상실험에서도 홍국미 추출물은 고혈압 환자의 혈압조절에 효과적이라는 보고도 있다. 그러나 이러한 유효성분의 함량은 홍국균의 종류와 배양조건등에 따라 현저히 차이가 나며 유효성분의 함량을 높히기 위해서는 균주선택 및 배양조건이 매우 중요한 것으로 알려져 있다. 또한 현미를 발아시키면 γ -aminobutyric acid(GABA)가 급격히 증가하여 혈압조절에 효과적인 것으로 보고되고 있다. GABA가 강화된 쌀 배아를 자연발증 고혈압쥐(SHR)에게 10% 첨가하였더니 혈압상승이 유의하게 저하하였다는 보고가 있으며 고혈압 환자를 대상으로 한 임상실험에 있어서도 GABA가 강화된 배아는 고혈압을 개선 시키는 것으로 나타났다.

라. 쌀밥과 당뇨조절

당질을 섭취하면 일정시간 동안은 혈당량과 인슐린 분비량이 증가한후 다시 감소하여 공복상태의 일정농도를 유지한다. 이때 그 증가패턴이 너무 급격하면 당뇨병환자의 경우 증세를 악화시키며 건강인에게 있어서도 체내 나쁜 영향을 초래한다. Crapo등은 비인슐린의존형 당뇨병 환자에게 쌀밥과 감자, 식빵을 각각 섭취시킨 후 식후의 혈당 및 인슐린 반응에 미치는 영향을 연구한 결과, 쌀밥을 섭취한 경우는 식빵, 감자에 비하여 인슐린 분비가 훨씬 낮게 나타났으며 혈당도 낮게 나타

났다. 또한 그들은 건강한 성인에게도 감자, 식빵, 옥수수 등을 각각 섭취시킨 후 식후 혈당 및 인슐린 반응(postprandial glucose and insulin response)의 변화를 조사한 결과 감자, 식빵, 옥수수는 급격한 증가를 보이는 반면 쌀밥은 완만한 증가를 보였다. 또한 쌀의 섭취 형태에 따라서도 혈당량 및 인슐린 분비량이 달라진다. 그 예로서 백미, 현미, 백미가루, 현미가루를 섭취시킨 후 postprandial glucose와 insulin 반응을 조사하면 현미와 백미(whole type)를 섭취하였을 때는 현미가루 및 백미가루(ground type)에 비하여 훨씬 낮은 반응을 보였다. 또한 쌀을 죽의 형태와 밥의 형태로 섭취하고 식후 혈당량과 인슐린 분비량의 양상을 비교하면 죽의 경우는 포도당(glucose)을 섭취한 때와 같이 혈당량과 인슐린 분비량이 높으나 밥의 경우는 혈당량과 인슐린 분비량이 훨씬 낮게 나타났다. 죽이나 떡의 형태보다는 밥의 형태가 혈당량의 급격한 증가와 인슐린 분비를 억제한다. 또한 Miller 등은 쌀 및 쌀가공품을 건강한 성인에게 섭취시킨 결과 아밀로오스 함량에 따라서도 혈당지수가 다르게 나타나며 아밀로오스 함량이 높은 쌀이 혈당지수가 낮은 것으로 나타났다.

마. 돌연변이억제, 암예방 효과

전등은 쌀의 돌연변이 억제효과를 검토하기 위하여 백미 및 현미를 메탄올로 추출하여 각종 돌연변이 유발원에 대한 돌연변이 억제효과를 Ames test 등으로 조사하였다. 그 결과 백미 및 현미 메탄을 추출물은 Ames test에서 간접변이원인 Trp-P-1, Trp-P-2에 대하여 약 90% 이상의 억제효과를 나타내었고 메탄을 추출물의 농도가 증가함에 따라 돌연변이 억제효과도 증가하였다. 백미와 현미간의 돌연변이 억제효과를 비교해 본 결과 Trp-P-1, Trp-P-2에 의한 돌연변이억제에는 차이가 없었으나 직접변이원인 4-NQO에 의한 돌연변이에는 백미보다 현미에서 유의하게 높은 효과가 나타났다고 보고하고 있다. 이러한 쌀의 항돌연변이 효과는 쌀을 가공처리하였을 때에도 활성이 소실되지 않는 것으로 보고되어 있다. 즉, 백미를 밥, 백설기, 미싯가루 형태로 가공처리하여 항돌연변이원성을 조사한 결과 이러한 가공처리시에도 항돌연변이 효과가 확인되어 쌀의 항돌연변이효과는 가공안정성이 있는 것으로 확인되었다. 또한, 쌀에 함유되어 있는 IP6도 대장암을 예방하는 것으로 보고되어 있고 아라비녹시란등도 암세포의 증식을 억제하고 면역력을 증가시킴으로서 암예방효과가 있는 것으로 보고되어 있다.

3. 흑미의 기능적 우수성

흑미의 효능으로서는 강한 항산화 작용이 있는 것으로 알려져 있는 데, 실제 시중에서 유통되고 있는 흑미를 추출하여 산화적 스트레스에 의하여 유도되는 과산화 지질생성에 미치는 영향을 조사한 결과를 보면 수원 415, 길립흑미, 흑진주미 등에서는 산화적 스트레스에 의한 체내 과산화지질 생성을 억제하는 강한 효과가 있으며 특히 길립흑미가 가장 강한 활성을 나타내었다는 보고가 있다. 일본의 Osawa 연구그룹에서도 인디카 형태의 흑미 왕겨에서 강한 항산화 활성이 있음을 밝혔고 그 활성 성분이 cyanidin-3-O-glucoside라고 밝히고 있다. 또한 이러한 효과는 흑미의 품종에 따라서도 차이가 있으나 일반현미의 항산화 효과보다 현저하게 높아 흑미의 장기적인 섭취는 노화예방, 산화적 스트레스에 의한 각종 성인병의 예방에 도움이 될 것으로 기대되고 있다.

또한 인체유래 암세포주의 세포성장에 미치는 흑미 추출물의 영향을 검토한 결과에 의하면 흑미는 특히 위암과 대장암의 세포성장을 억제하는데 매우 효과적인 것으로 밝혀졌고 이러한 효과는 인체유래 정상세포에는 세포성장을 거의 억제하지 않고 암세포주에만 선택적으로 작용하는 것으로 나타나 그 효과가 주목되고 있다. 또한 동물실험결과에 의하면 흑미에는 강한 간암예방효과도 있는 것으로 보고되고 있으며 DNA 손상을 억제하는 효과도 보고 되고 있어 흑미에는 암예방효과도 기대되고 있다. 이외에도 아직 과학적인 근거가 명확하지는 않으나 흑미에는 혈액순환 개선효과, 고혈압, 면역기능증진등의 효과도 기대되고 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이 쌀에도 우리인체에 유효한 다양한 성분이 존재하여 생체내에서 다양한 우수한 기능을 나타낸다는 것이 최근의 연구결과 계속 밝혀지고 있다. 이러한 우수한 기능들

이 쌀에만 존재하는 것이 아니라 하더라도 우리가 주식으로서 매일 먹고 있는 쌀에 이러한 우수한 기능들이 있다는 것이 매우 중요하다. 또한 쌀에는 이러한 기능적 우수성 뿐만 아니라 밥을 중심으로 한 우리의 식생활에서 밥은 김치와 된장국은 물론 생선, 육제품과도 잘 어울리는 등 어떠한 형태의 반찬과도 잘 어울리므로 여러가지 식단을 다양하게 변화시킬 수 있으며 각 식품에서 부족되는 영양소를 상호 보완할 수 있어서 균형된 영양을 섭취할 수 있는 것이 무엇보다 큰 장점이라 하겠다.

참 고 문 헌

Crapo, P. A., Reaven, G. and Olefsky, J.: Postprandial plasma-glucose and-insulin responses to different complex carbohydrate. Diabetes 26, 1178 (1977).

Crapo,P.A ,Insel,J.,Sperling,M.and Kolterman,O.G.: Comparison of serum glucose, insulin and glucagon responses to different types of complex carbohydrate in noninsulin-dependent diabetic patients. Am. J. Clin. Nutr. 34,184(1981).

Jiaratsatit,J.I.T.,Keoplung,M.,Chumsilp,L.andMangklabruks,A.: Glycemic effects of rice and glutinous rice on type II diabetic subjects. J.Med.Assoc.Yail.70,401(1987).

Cummings,J.H. and Englyst,H.N.: Fermentation in the human large intestine and the available substrates. Am. J. Clin. Nutr. 45,1243(1987).

Bingham, S.A.: Mechanisms and experimental and epidemiological evidence relating fibre and starch to protection against large bowel cancer. Proc.Nutr.Soc.49,153(1990).

Muir,J.G. and O'Dea,K.: Validation of an in vitro assay for predicting the amount of starch that escapes digestion in the small intestine of humans. Am.J.Clin.Nutr.57,540(1993).

MacLean,C.W., Klein, G.R., Massa,E. and Graham,G.G.: Protein quality of conventional and high protein rice and digestibility of glutinous and non-glutinous rice by preschool children. J. Nutr., 108,1740(1978)

Hopkins,D.T.: Effects of variation in protein digestibility. in: protein quality in humans: Assessment and in vitro estimation. Bodwell,C.E., Adkins,J.S., and Hopkins,C.E. eds. pp 169-193, Avi Publishing Co., Inc., Westport, C.T.(1981).

Clark,H.E., Howe,J.E. and Lee,C.J.: Nitrogen retention of adult human subjects fed a high protein rice. Am.J.Clin.Nutr., 24,324(1971)

Kahlon,T.S., Saunders,R.M., Chow,F.I., Chiu,M.C.and Betschart, A. A. Effect of rice bran and oat bran on plasma cholesterol in hamsters. Cereal Foods World 34,768(1989).

Aoe,S.,Ohta,F. and Ayano,Y.: Effect of rice bran hemicellulose on the cholesterol metabolism in rats. Nippon Eiyo Shokuryo Gakkaishi 42,55(1988).

Sharma,R.D. and Rukmini,C.: Rice bran oil and hypocholesterolemia in rats. *Lipids* 21,715(1986).

Sharma,R.D. and Rukmini,C.: Hypocholesterolemic activity of unsaponifiable matter of rice bran oil. *Indian J. Med. Res.* 85,278(1987).

Ayano,Y., Ohta,F.,Watanabe,Y. and Mita,K.: Dietary fiber fractions in defatted rice bran and their hypocholesterolemic effect in cholesterol-fed rats. *J. Nutr. Food*, 33,283(1980).

Gerhardt,A.L.and Gallo,N.B.: Effect of a processed medium grain rice bran and germ product on hypercholesterolemia. *Amer. Assoc. of Cereal Chemists annual meeting*, Washington, DC, 1989.

Hegsted, M., Windhauser, M. M., Lester, F. B. and Morris, S. K.: Stabilized rice bran and oat bran lower cholesterol in humans. *FASEB J.* 4: A368, Abstract no. 590(1990).

Carroll,K.K. and Hamilton,R.G.M.: Effects of dietary protein and carbohydrate on plasma cholesterol levels in relation to atherosclerosis. *J. Food Sci.* 40, 18(1975)

Kritchevsky,D., Tepper,S.A. and Kitagawa, M.: Experimental atherosclerosis in rabbits fed cholesterol-free diets. *Nutr. Rep. Int.* 7, 193(1973)

Sugano, M., Ishiwaki, N. and Nakashima, K.: Dietary protein-dependent modification of serum cholesterol level in rats. *Ann. Nutr. Metab.* 28, 192(1984)

村元學, 河村辛雄:米タンパク質と米タンパク由來抗血壓上昇性ペプチド. *日本食品工業*, 18 (1991)

森田達也, 桐山修八: 高純度米タンパク質の製造とその発がん抑制作用. *日本營養食糧學會 學術大會抄錄集*, 12, 2A-p3(1993)

전향숙, 김인호, 김영진, 김길환: 쌀추출물의 돌연변이 억제효과. *한국식품과학회지*, 26, 188 (1994)

김인호, 전향숙, 하태열, 문태화: 쌀의 돌연변이 억제활성에 미치는 가공처리의 영향. *한국식품과학회지*, 27, 944 (1995)

Qureshi,A.A, Peterson,D.M. Hasler-Rapacz, H., Rapacz, J.: Novel tocotrienols of rice bran suppress cholesterologenesis in hereditary hypercholesterolemic swin, *J. Nutr.* 131, 223 (2001)

Suzuki, A., Kagawa, D., Hujii A., Ochiai,R., Tokimatsu, I. and Saito,I.: Short- and long-term effects of ferulic acid on blood pressure in spontaneously hypertensive rats, *AJH*, 15, 351 (2002)

Hirose M., Hukushima S., Imaida, k., Ito N., Shirai, T., Modifying effects of phytic acid and gamma-oryzanol on the promotion stage of rat carcinogenesis, *Anticancer Res.*, 19, 3665 (1999)

Nutritional and Functional Properties of Rice

Tae Youl Ha

Rice research group Korea Food Research Institute

Rice(*Oryza sativa L.*) is a major cereal food providing nourishment to over half of the world's populations and was considered only as a source of energy. However, The recent many researches have been made to suggest that rice may relate to prevention chronic disease and health-promoting properties such as postprandial glucose response, hypocholesterolemic effect and blood pressure-lowering effect

There has been numerous observation supporting that rice has hypocholesterolemic effect. Rice, rice bran, rice bran oil and unsaponifiable matter of rice bran oil reduced plasma cholesterol in rat, hamster as well as human. Components of rice showing hypocholesterolemic effect include dietary fiber(hemicellulose, phytic acid), protein, γ -oryzanol, β -sitosterol, and tocotrienols.

Crapo et al has been studied that the effect of various of starchy foods on the postprandial blood glucose and insulin responses in healthy and diabetic humans. The results showed that rice had lower blood glucose and insulin responses compared to potato, bread and dextrose. Especially, in noninsulin-diabetic subjects, the postprandial blood glucose and insulin response significantly lower compared to other carbohydrates such as potato, bread and dextrose. The different physical forms in the same starch also produce the different postprandial glucose and insulin responses.

In recent years, several studies have shown that some components of rice have potent antioxidant activity against Fe^{2+} -ascorbate induced lipid peroxidation in rat liver microsomal membranes. Cell culture and animal studies have shown that components of rice have inhibitory effect on the growth and proliferation of several types of human cancer cell. It was also reported that the methanol extract of brown rice has antimutagenic activity against various mutagens. In addition, the pepsine hydrolysate from rice protein is reported to inhibit angiotensin converting enzyme activity. GABA (γ -aminobutyric acid) and GABA enriched rice germ is also effective for lowering blood pressure and triglyceride levels.