

## 난청아동의 대치 음운변동에 관한 종단적인 연구

대구대학교 언어치료학과  
이 은 선 · 석 동 일

본 연구는 난청아동의 음운변동이 다소 불규칙적인 패턴을 나타낸다는 기존의 연구(이은선, 2001)를 토대로, 2000년 12월에서 2002년 6월까지 6개월 단위로 총 4회에 걸쳐서 난청아동의 음운변동에 관하여 알아보았다. 연구문제는 다음과 같다. 첫째, 난청아동의 연령 증가에 따른 음운변동율의 차이는 어떠한가? 둘째, 4, 5, 6세 난청아동의 각 집단 간의 음운변동율 차이는 어떠한가?

본 연구의 대상은 난청아동 4세 3명, 5세 3명, 6세 3명이었다. 평가도구는 연구의 목적에 맞게 연구자가 자작한 3 위치 조음검사를 이용하였고, 음운변동 분석은 김영태(1992)의 기준을 토대로 하였다. 통계처리는 윈도우용 SPSS 10.0을 이용하였으며, 연령증가에 따른 차이를 알아보기 위하여 반복측정을 실시하였다. 4, 5, 6세 집단 간의 차이를 알아보기 위하여 one-way ANOVA를 실시하였으며, 사후검정은 LSD를 실시하였다.

연구결과는 다음과 같다. 첫째, 난청아동의 연령 증가에 따른 대치 음운변동율은  $p < .001$ 의 수준에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 둘째, 4, 5, 6세 아동의 집단 간의 대치 음운변동율은  $p < .001$ 의 수준에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 사후검정 결과는, 1회째 실시한 연구개음동화, 기식음화, 연구개음화와, 2회째 실시한 성문음화, 치조음동화, 파열음동화에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다.