



구순열 변형 환자에서 이차 구순비성형술

유선열*

전남대학교 치과대학 구강악안면외과학교실

편측성 및 양측성 구순열 환자에서 잔존하는 구순성형술 후에 잔존하는 이차 변형은 일차 결손부위의 상태나 수술방법 및 성장양상에 따라서 매우 다양하게 나타난다. 이러한 이차 변형은 심리적, 심미적 및 기능적 후유증을 유발하며 담당의사도 교정방법의 선택과 수술에 있어 많은 어려움을 겪게 된다. 환자들은 각각 독특한 이차 변형을 가지고 있지만, 이를 해결하기 위한 외과적 교정 방법은 다양한 술식들의 변형 또는 복합적인 술식을 필요로 한다.

본 교실에서는 구순열 수술 환자에서 나타난 이차 구순변형, 비변형 및 구순비변형에 대하여 V-Y 성형술, Z 성형술, Millard씨 변법, 반흔성형술 등 다양한 술식으로 교정하여 양호한 결과를 얻었기에 문헌고찰과 함께 보고하는 바이다.

Secondary cheilorhinoplasty in patient with cleft lip deformity

Sun-Youl Ryu*

Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery, College of Dentistry, Chonnam National University

Secondary deformities of the lip in individuals with repaired unilateral and bilateral clefts may vary in severity, depending on the state of the original defect, the care taken in the initial surgical procedure, the pattern of the facial growth. Remained secondary deformities which can cause psychogenic, esthetic and functional complication, surgeons are to be in stress choice of operation methods and operative procedures for this problem. Each patient has a unique combination of deformities, their surgical correction method usually requires the modification and combination of several surgical techniques.

We report cases of secondary cheilorhinoplasty in patients with cleft lip nose deformities using various techniques, as V-Y plasty, Z plasty, modified millard's method and scar revision etc.