

全部床義齒裝着後 諸問題의 處置

李 德 一 齒科醫院 院長
서울特別市 齒科醫師會 學術理事

總義齒裝着後問題點은 不正確하게 製作된 義齒의 結果라고 生覺하기보다는 오히려 無齒顎患者에 對한 最終段階의 治療라고 할수 있다. 總義齒製作에는 여러가지 基本的手法이 있는데 各各다른 術者로하여금 基本的機術을 正確하게 適用함으로써 滿足할만한 結果를 가져올 수 있다. 그리고 어떤 하나의 手法이 모든患者를 成功的으로 處置할수있는 方法이란없다. 그러기때문에 如何한 方法을使用하든간에 義齒製作過程에 있어서 한스텝 한스텝의 術式은 完全正確精密하게 施行하여야한다. 그리고 義齒製作後의 여러가지 問題點을 適切히 處置하기 爲하여 다음과같은 다섯가지點을 隨行하여야 한다. ① 正確한 手法에 依한 問題點의 豫防 ② 正確한 義齒裝着 ③ 患者에 對한 敎育 ④ 義齒裝着後의 豫定約束 ⑤ 豫定約束없이 訪問하는 患者의 問題點에 對한 正確한 診斷과 治療.

I. 豫 防

患者個人에서 惹起되는 여러가지 問題點을 豫知한다는것은 不可能하다. 그러나 우리는 正確한 診斷과 治療으로써 많은 問題點을 豫防하기를 바란다. 萬若에 總義齒에 關係되는 患者의 모든 心身의 問題點이 發見되었을 때 熟練된 齒科醫는 쉽게 解決할수 있다. 診斷에 있어서의 잘못된 義齒製作過程中 어떤 스텝에서든 나타내게 마련인데 이時期에서는 더욱 困難한 問題에 봉着 하게 된다. 第一번째 印象 체득으로부터 마지막의 咬合平衡過程까지 繼續적으로 한스텝 한스텝 正確하게 評價하여 最上의 精密性을 갖이고 術式을 隨行해나가야 한다. 여기에서는 特別한術式에 關하여 論議하고자 하는것이 아니기때문에 完成된 義齒에 明確하게 影響을주는 5個스텝을 다시한번 全體의으로 觀察할目的으로 記述하고자 한다. ① 精密한 印象 ② 正確한 中心位顎關係 ③ 正確한 高經決定 ④ 正確한 人工齒選擇및 配列 ⑤ 調和된審

美性 等이다.

義齒의 安定과 機能은 義齒裝着時 혹은 裝着後의 諸問題를 正確하게 處置함으로써 얻어지는 附加要素이다 萬若에 이 5個스텝을 致密한 注意와 熟練된 機術로 施行한다면 義齒裝着後에 혼이 이어나는 苦痛의 호소는 많이 豫防할수있다. 그리고 우리는 不完全한 義齒를 處理하는것이 아니라 裝着後의 問題로서 義齒에 對한 患者의 調節이라는것을 알아야한다.

II. 義齒裝着

大端한숨으로써 全部床義齒을 正確하게 裝着하는것은 義齒調節期間동안에 患者에게 大端히 貴重한 療法이된다. 患者에게 義齒의 關한 敎育과 아울러 正確한 中心位顎關係와 高經을 갖인 훌륭히 製作된 審美性있는 義齒는 裝着時極히 最少限의 問題를 惹起시킨다. 義齒裝着時 너무 過度한 維持力을 試위하려고하지 말아야한다 그 理由는 義齒患者들에게 너무 많은 維持力의 期待感을 有導하게되어 거짓 維持力을 患者에게 實感시키게되기때문이다.

조종하기쉬운 維持力을 갖이고 平安感을 느낄수있는 義齒가 우리가바라는 것이다. 義齒裝着直時의 過度한維持는 많은 調節을 必要로 하기때문에 빠른 時日內에 義齒는 헐기워지게된다. 義齒調節을 試圖하기前最少限 5分間은 義齒를 口腔內에 程度에맞는 裝着壓을 加하여 裝着하도록 한다. 그後에 中心咬合을 더욱 좋게 改善되게 調節한다. 그러나 이때에 어떤 複雜한 咬合平衡은 避하도록한다. 그理由는 義齒患者에게 數週間은 부드러운 食物物만을 攝取하도록 制限하기때문이다. 均一하게 同時에 接觸하는 良好한 中心咬合은 반드시 이루어져야하며 그렇지못할경우 正確하게 適合된 義齒는 嚙下時 上下人工齒의 不均等한接觸으로 維持를 破壞하게된다. 故로 義齒의 裝着時에는 다만 側方運動時 甚한 障害는

除去하여 준다. 그리고 義齒患者는 一般的으로, 上下脣의 收縮때문에 이것을 本來의 形態로 再形成시켜주고 上下脣의 거리를 限界線까지 느려나게하기 爲한 時間이 必要하기때문에 患者의다음 來院까지는 前齒部緣端均衡을 試圖하여서는안된다. 그러나 審美的要求때문에 修正이 不可避할경우는 前齒機能面에 最少限의 犧牲範圍內에서 施行한다. 다음은 患者의 對話하는 內容에 注意를 기울여야하는데 같은 單語를 反復하여 發言시키지 않도록 한다 그 理由는 患者自身이 正確하게 말을하지 못한다는 느낌 때문인데 이것은 義齒調節期間中 患者에게 精神的 부담이 되기때문이다. 齒科醫로하여금 義齒의 全體의 檢査가 끝나면 다음은 患者에게 義齒를 거울앞에서 觀察하도록 하는데 거리는 팔의거리 程度 혹은 普通 對話할때의 거리程度로 間隙을 두고 觀察하도록 한다. 이것은 齒牙뿐만아니라 周圍의 여러 部分의 모양을 같이 觀察하기 爲한것이다. 義齒患者에 있어서 審美性에 對한 滿足은 調節期間中 가장 強한 精神的 支援이 된다.

Ⅲ. 義齒患者에 對한 教育

1) 補綴: 義齒란 自然齒의 實際上的 補充이 아니라 代用物에 지나지 않는다는 것을 患者에게 說明하라 그리고 患者는 첫째 實際에 있어서 補綴物에 견딜수있는 耐久力을 배워야하며 둘째로 義齒를 咀嚼器系統의 一部分으로 잘다룰수있게 患者를 教育시켜야한다 잘 製作된 總義齒는 人間에만드러진 補綴物中 第一效果의 結果를 갖는다. 例를들면 人工義眼는 視力을 가지지 못하고 人工義手足은 機能面에 制限되어있으며 특히 人工義手는 다만 外觀上效果뿐이다 그러나 많은 義齒裝着患者들은 效果의인 身體의 精神的 健康維持와 더부러 100% 平安하게 效率的으로 使用하고있다는 것을 患者에게 說明하라.

2) 咀嚼: 咀嚼能率를 거둘래면 義齒裝着後 約 2~3 週는 기다려야한다. 따라서 처음 義齒를 使用하는 患者는 너무빨리 底抗力이 強한 飲食物을 咀嚼하려고하여서는 안되며 飲食物을 可及의 저계 切斷하여 손가락이나 젓가락을 使用하여 臼齒部에 옮겨 咀嚼하도록 하여야한다. 그리고 義齒를 使用하여 飲食物을 咀嚼하는데 상당이 익순하여질때까지는 規則의 上下運動만으로 처음에는 咀嚼하여야한다. 바삭바삭한 飲食物의 咀嚼은 수월하나 빵類類는 反對로 大端히 힘이든다. 咀嚼에 關한 追加教育은 義齒裝着後의 첫번 來院約束까지 기다리게하는것이 보다 效果的이다.

3) Tongue or cheek biting: 義齒의 齒牙와 義齒床材料는 非生命體라는 것을 患者에게 說明하여주고 咬

合時 혀와 脣의 機能이 正確한 咀嚼을 이루도록 調和되게 익숙하여져야한다. 萬若에 正確한 人工齒配列과 혀가 過히 커지지않았을 경우는 그렇게 問題點이 惹起되지는 않는다. 勿論 혀와 脣의 機能없이는 咀嚼할수 없다는 것은 明白한 事實이기때문에 恒常 咀嚼時 혀와 脣이 물릴수있다는 可能性을 患者에게 注意시켜야한다. 脣이 물리게되는 原因은 一般的으로 不正確한 人工齒配列의 結果로 이러난다. Wax Rim으로 中心位咬合을 採得時 患者의 上脣을 위 方向으로 올리게하고 큰웃음을 지을때와같이 口角部를 後方으로 後退시켜 Wax Rim과 脣사이에서 咬合平面을따라 Mouth Mirror의 손자리를 미끄러트려 드러가게 充分한 頰空間을 갖어 이에따라 人工齒配列을 正確하게하면 Cheek biting은 事實上除去되어진다.

4) 發言: 어떤 義齒患者는 一時的으로 말하는데 變化를 가지고온다. 잘製作된 義齒를 裝着한 患者에 있어서 말하는데 不平한 點을 惹起시키는데는 3가지點 即 ① 過度한 唾液流出 ② 大端히 큰舌 ③ 口齶를 덮고있는 基底床材料 등을 考慮 할수있다. 萬若에 無齒顎患者의 口腔內에 적은 물을 넣는다면 곧 이것은 唾液分泌를 刺戟시키는다. 勿論 義齒의 경우도 마찬가지다. 그러나 過度한 唾液流出은 約 2時間內에 停止되고 發言에 있어서도 과히 不鮮明하지마는 아니하다. 커진 舌이 元來의 크기로 回復될래면 普通 4~5週는 걸리고 大端히 舌이 커진 狀態의 경우일찌라도 1~2日以內엔 平安하게 말을할수게된다. 無齒顎患者의 硬口齶吸收組織의 두께보다 훨씬 두꺼운 義齒基底床으로 Cover 되어있어 患者의 聽言心理過程에 音波傳導가 變更된다 따라서 거히모든 患者에 있어서 自身の 音色이 異常하게 들리나 듣는사람에게는 그렇지않다. 이것은 一時的의 現像인데 빠르면 몇 時間後 길경우는 몇日以內에 사라지게 된다.

5) 口腔衛生: 義齒를 취침時間에는 빼놓도록하고 可能한 限 낮에도 적어도 3時間程度는 빼놓도록함이 좋다. 어떤 患者들은 밤에 잘時間에 義齒를 빼놓고자면 그 結果로 일괄 周圍組織 休息이 된다는데 反하여 피곤하여 진다는 이야기도 듣는다. 口腔內組織에 繼續的인 異物質의 接觸은 口腔組織에 變化를 받게하는 要素가되는 患者의 경우도 있다. 義齒裝着患者中 많은 肥大組織反應은 밤과 낮 繼續的으로 裝着하고있는 患者에게서 흔히 이어나는 것을 볼수있다. 잘 Processing된 義齒는 義齒床下組織變化에 과히 影響을 주지는 못하는데 잘 Processing되지 못한 義齒는 反對로 組織變化增加에 影響을 미치게 한다. 그 理由로는 唾液과 같이 걸러지는 過度한 遊離 Monomer를 含有하고있어 이것이 組織에 化學的으로 刺戟되기때문이다. 義齒를 口腔外로 빼서 물에 담겨

두워야 할 때 義齒清潔目的으로 8온수의 물에 4순가락의 식초를 타서 이液體에 담겨두면 보다 效果的이다. 食後에는 非研磨劑비누 혹은 齒藥으로 반드시 깨끗히 닦아야 한다. 닦을 때는 머러트릴우러가 있어 물을 담은 좁은그릇 속에서 行하도록 하여야 한다 그리고 口腔內組織, 頰部 舌部 그리고 口齶部를 아주 부드러운 칫솔을 使用하여 닦도록 指示한다.

6) 下顎總義齒: 下顎義齒은 다루기가 大端히 困難하다는 것은 잘 알고 있는 事實이나 좀더 正確하게 患者에게 下顎提에 關한 構造를 簡單히 說明하여줌으로써 下顎義齒을 다루는데 도움이 된다. 여러 方向으로 움직일 수 있는 下顎基底部에 下顎義齒이 安置되어 있다. 即 口腔底部는 下顎提境界部에서 上下方向으로 움직이며 舌, 頰部 그리고 脣部는 下顎義齒과 接觸하고 있어 義齒을 正位置에서 미러낼수 있는 힘을 作用할수 있다. 따라서 이러한 問題를 處理하기 爲한 患者에 對한 教育이 必要하다. 例를 들어 下顎義齒維持에 있어서 舌의位置가 大端한 影響을 준다는 것을 試範하는데 患者에게 크게 開口시켜 舌를 後退시키면 舌側 border seal이 破壞되어 義齒은 헐거워진다 다음 下顎義齒兩中切齒의 Cingulum (齒帶) 部位에 脫방울 程度의 작은 콘파운트를 附着시킨後 患者에게 開口運動을 몇번시키는데 舌끝을 附着된 콘파운드와 繼續接觸시켜 舌이 이완된 狀態로 前方으로 미는 힘없이 이位置에 두게 되면 開口運動時 確實히 義齒維持力이 增加된다는 것을 認識시켜주도록 하여야 한다. 下顎義齒의 舌側面은 舌의 側方境界部와 一致되게 하고 요면(凹面)이 되게 形成하여 舌로 하여금 義齒가 제자리에 安置되게 도움을 주는데 舌側面을 너무 甚한 凹面으로 만드는 것을 삼가하여야 한다.

IV. 装着後豫定約束

義齒装着1週日後에 豫定約束을 하는데 患者는 반드시 約束時間보다 最少한一時間前에 義齒을 装着하고 있어야 한다. 義齒患者는 装着後에 追加治療를 願하는 心理的 性向이 있다는 것을 齒科醫는 알아야 하며 患者는 잘製作된 義齒適應에 여러 問題點을 解決하기에 生理的인 것뿐 以外에도 精神的 도움도 願한다. 그리고 装着後 諸問題 處置에 對하여 患者들에게 혐오感을 느끼지 않도록 하여야 하며 齒科醫自身도 경솔이 患者의 繼續的義齒에 對한 不滿의 호소를 나무라지 말도록 하여야 한다. 그리고 Pain threshold level과 Muscular Control에 있어서도 患者 各者에 따라 다르다. 特히 臼齒部拔齒後 長期間 그대로 지낸 患者의 경우는 더욱 變化가 크나 萬若에 完成된 總義齒이 不成功의이라 認定하여 새로 다시 만들어야 되겠

다고 決定하였을 때는 새로 製作하기 前에 반드시 失敗의 原因을 確認하고 始作하여야 한다. 義齒装着後 첫번째 來院約束時에는 다음과 같은 點을 處置하는데 充分한 時間을 갖어야 한다. ① Sore spots에 對한 處置 ② 咀嚼에 關한 具體的 教育 ③ 完全한 咬合을 얻기 爲한 處置 等이다.

萬若 患者自身들이 義齒裝置時에 齒科醫의 指示에 잘 따랐다면 아마 frenum刺戟以外에는 sore spots는 생기지 않는 것이 普通이다. 義齒을 口腔內에서 빼내기 前에 中心咬合에 어떤 變化가 생겼나 咬合紙를 使用하여 檢査하고 萬若에 變化가 있으면 修正하는데 解剖學의 人工齒를 使用하였을 때는 義齒을 中心咬合狀態로 固定시켜 修正하는 方法을 使用하여서는 않된다. 그 理由는 流動的 基底에 總義齒이 安置되어 있어 아주 精密한 Point 中心咬合이 아니라 Area 中心咬合을 提供하게 fossa를 充分히 넓여야 한다. Sore spots가 診斷되었으면 그 原因을 除去하고 Working side와 Balancing side의 모든 障害를 除去한다 萬若 殘存顎堤의 狀態가 大端히 나쁘거나 不足한 筋肉 Control로 患者口腔內에서 調節할수 없을 때는 咬合器에 附着시켜 調節한다. 그런데 咬合器에 附着시키기 前에 審美的 目的 때문에 前齒部의 調節이 必要할 때는 어떤 前齒部 齒牙인지를 미리 알아두어야 한다. 中心咬合時 上下顎 臼齒의 均一한 同時接觸은 全部床義齒을 成功的으로 이끄는 데 必須條件이며 또한 完全한 咬合平衡은 있어서는 안될 要素이다. 어떤 義齒患者에 있어서는 咀嚼時, 上下齒牙를 여러번 接觸시키는 경우가 있으나 自然齒牙에서는 齒根周圍組織의 自己感受能力(Proprioceptive Ability) 때문에 그렇지 않다. 無齒顎患者에서는 Neuro-Muscular equilibrium이 齒牙의 相互接觸에 依한 停止狀態의 機轉과 같이 役割한다. 어떤 患者는 筋肉의 不調和와 神經疾患 때문에 一定한 咀嚼週期를 갖지 못한다. 그런故로 可及的 어떠한 位置에서도 均衡接觸이 이루어지도록 하여야 한다. 殘存顎堤가 大端히 나쁜 狀態인 경우는 下顎의 遊離運動에서 咬頭 障害로 因한 側方壓을 除去하기 爲하여 平衡이 된 義齒을 必要로 한다. 飲食物의 덩어리를 上下義齒 사이에 넣었을 때 義齒均衡은 破壞되나 義齒維持는 飲食物이 嚥下할수 있는 크기에 到達할 때까지는 保存되야 嚥下時에 上下義齒이 相互接觸하여 義齒을 제자리에 安置시킬수 있게되며 다음 飲食物에 對한 咀嚼에 充分한 義齒維持를 다시 保存할수 있게 된다 그러나 不平衡義齒에서는 以上과 같은 咀嚼嚥下作用은 可能치 못하다. Sore spots와 義齒平衡이 解決되면 처음 經驗한 義齒患者의 어떤 困難點點 等を 相互論議하여 解決하여 주도록 한다 그리고 다음 患者와의 約束은 六個月後인데 이 前에 어떤 問

題가 있을 때는 언제든지 來院하여야 한다는 條件下의 約束이다.

V. 患者不平의 診斷과 治療

萬若에 牙齒科醫가 製作한 總義齒을 装着한 後 여러 問題點을 갖인 患者를 對할때 正確한 診斷을 한다는 것은 大端히 어렵다. 그러나 大部分의 刺戟原因은 다음과 같다.

- ① 印象時 壓迫된 部位. ② 義齒邊緣部의 過度延長 ③ 咬合時 過度壓迫 ④ 硬部位의 緩衝失敗 ⑤ 높은 高經 等이다.

Sore spots 및 症狀의 始作時間은 原因發見에 重要한 點이 된다. 萬若 原因이 義齒에서 起因되었을 경우는 機械的으로 義齒調節을 하고 全身의 疾患 即 herpes, avitaminosis 혹은 口內炎 等으로 起因되었을 때는 藥物療法을 使用한다.

A) 下顎弓의 諸問題

ㄱ) 症狀—義齒緣端部의 Soreness

原因—① 過度한 延長 ② 잘 研磨되지 않았거나 또는 銳利한 緣端 ③ Canker Sore

處置—① 義齒調節 ② 義齒緣端의 研磨 ③ 藥物療法 그리고 可能한限 義齒을 빼놓을 것

ㄴ) 症狀—齒槽頂의 Soreness

原因—① 바늘뼈 ② 棘齒槽頂 ③ 印象時 壓迫部位 ④ 不正咬合

處置—① disclosing wax를 使用하여 義齒에 Sore 部位를 表示하여 除去한다. ② 義齒에 닿지 않게 하고 棘齒槽頂의 範圍가 넓을 때는 義齒內面에 Soft liner를 使用함. ③ 눌러서 아픈 部位에 色마크를 하여 義齒內面을 調節한다. ④ 不正咬合을 修正하고 高經을 再檢査한다.

ㄷ) 症狀—Soreness가 있거나 없거나 全體의 不快感을 그리고 齒牙配列의 不調和

原因—① 높은 高經 그리고 不充分한 生理的 安靜位 間陳

處置—① 下顎義齒에서 人工齒단 除去하여 正確한 高經測定을 하여 再配列한다.

ㄹ) 症狀—全體의 Soreness와 redness

原因—① 강한 筋肉으로 因한 강한 咬合壓 ② 너무 높은 高經

③ 自由로운 Bonnett's 運動의 失敗(Soreness는 普通 作業側에 生긴다)

④ 잘 Processing 않된 義齒基底床材料

處置—① 人工齒의 頰舌間幅을 좁혀준다. 혹은 soft lining을 하다.

② 高經을 낮춰준다.

③ 咬頭를 除去하여 平面齒牙로 만들거나 人工齒단 再配列한다.

④ 改床法을 施行한다

ㅁ) 症狀—前齒部顎提側面部의 soreness

原因—① 咬合失敗 ② 어떤 部位의 過度延長

處置—① 初期中心咬合은 正確하였으나 漸次 義齒床下의 粘膜에 壓力을 加하게 되면 下顎 義齒은 前方으로 移動한다. 따라서 中心咬合 area를 擴大시킬것. 上顎近心傾斜面과 下顎遠心傾斜面을 削除할것

② 過度延長部를 削除할것

ㅂ) 症狀—小臼齒部顎提側面部의 soreness

原因—① 舌側隆起(下顎) ② 印象時 壓迫部 ③ processing時 收縮 ④ 咬合失敗

處置—① 適當한 relief를 할것 ② 義齒調節 ③ 義齒 rebasing ④ Sore 部位의 反對側咬合을 檢査하여 適當한 relief나 soft lining을 하다

ㅅ) 症狀—臼齒部顎提側面部의 soreness

原因—① 側方咽喉部의 過度延長 ② 咬合의 착오 ③ mylohyoid ridge 遠心側方骨 突起 ④ 前齒部 過度延長

處置—① 下顎臼齒部舌側 flange를 짧게 除去한다. ② 前齒部 過重咬合은 義齒의 臼齒部가 동요되어 Soreness가 생기기 때문에 均等이 壓力을 받게 咬合調節을 할것 ③ 外科的 處置나 義齒을 짧게 延長할것 ④ 前齒部를 繼續的으로 밀어올리는 作用으로 臼齒部 flange를 回轉시키게 된다. 前齒部 邊緣을 削除하여 處置함.

ㅇ) 症狀—下顎義齒의 헛거움

原因—① 咬合착오 ② 너무 높은 咬合平面 ③ 義齒邊緣部의 Underextension

處置—① 咬合調節 ② 人工齒를 除去再配列할것 ③ Rebasing하여 適切이 延長할것

ㅈ) 症狀—Cheek biting

原因—① 邊緣部의 두께가 얇거나 underextension ② 上下義齒床 遠心部間에 不充分한 內側齒槽弓의 間隔 ③ 臼齒部의 不適切한 水平의 overbite

處置—① 얇은 部位에 適切한 두께를 주고 邊緣部를 더 延長시키다. ② 萬若上顎 結節部 義齒

두께가 얇아서 削除할수 없을 경우는 下顎
臼後齒 三角部를 削除한다 ③ 下顎臼齒頰
側面을 recontour 할것

B) 上顎弓의 諸問題

ㄱ) 症狀—上顎義齒가 헐거워질 경우

原因—① 어떤部位의 underextension ② 咬合
失敗

處置—① 適切히 延長할것 ② 咬合調節

ㄴ) 症狀—咀嚼時헐거워질 경우

原因—① 硬口蓋의 nonyielding 部에 relief를 하
지 않은경우 ② 不正確한人工齒配列 ③ 抵
抗力이 강한 飲食物을 取한理由.

處置—① non-yielding部에 relief chamber를 할
것 ② 人工齒를너무 齒槽頂頰側으로 配列
하여 지레대作用이 생김으로 再配列할것
③ 義齒에익숙하여 질때까지는 流動食을
섭취하도록한다.

ㄷ) 症狀—몇時間後면 義齒가 헐거워질 경우

原因—① 粘着性이 강한 唾液

處置—① 收斂劑를 使用하여 口腔內를 닦는다.
그리고 義齒를 定期的으로 닦어야한다.

ㄹ) 症狀—하품 또는 開口를 크게하였을 時 헐거워
질경우

原因—① 臼齒部頰側面의 義齒床두께가 두꺼운경
우 ② Hamular notch에 過度延長

處置—① 두께를 削除하다 ② 크게 開口時 ptery-
gomandibular ligament가 後方邊緣部에
tension을 이르지않을 때까지 削除하다

ㅁ) 症狀—對話時 헐거워지는경우

原因—① 不正確한 Post palatal seal ② 後方邊
緣部の 過度延長

處置—① 再調節할것 ② 軟口蓋의 二次振動線까
지 削除한다.

ㅂ) 症狀—다만헐거운 느낌뿐이고 義齒가떨어지지
않는 경우

原因—① 口蓋部에 大端히 넓은 non-yielding 組
織部位가 存在할時

處置—① 適切한 relief chamber를 形成할것


ㅅ) 症狀—Burning Sensation를 갖는 邊緣部 Sore-
ness

原因—① 過度延長 ② 神經이 通過하는 神經孔口
上에 壓迫을 받았을때 ③ 不正確하게 proc-
essing된 義齒床

處置—① 義齒邊緣調節 ② Soreness 部位에 對
한 relief ③ Rebasing 할것

要 約

總義齒裝着後諸問題의 處置에 있어서 筆者는 여러해동
안의 臨床經驗을 통하여 證明考察된 點을 記述한것이다
總義齒裝着後 여러가지 問題點의 豫防및 適切한 義齒裝
着을 爲한 系統的裝着方法을 論議한것이고 義齒에 關한
管理와 注意點을 提示한것이다. 義齒裝着後의 注意事項
과 裝着後의 問題點解決을 爲한指示書보다는 直接患者
를 對하여 對話를 通한 處置方法이 보다 効果的이다.



교정학회 시리즈는 차호에 계속합니다.

