

診斷 노이트 ①

① Herpes virus의 感染病巢

Herpes virus 감염에는 3型으로 나타난다.

1型：口唇에 적은 水疱形成 많이 보는 型(Herpes labialis) Fig 1, 2.

2型：구강점막에 넓게 감염되는 型(Herpes stomatitis) Fig 3, 4.

3型：口蓋점막에 빨간 적은 溃瘍形成 Fig. 5.

젊은層 成人에서 보다 2型은 어린이에게도 본다. 再發性이다. 熱과 이열감이 있고 미약한 sore상태로서 식사 장애를 주며 頸部임파선염도 가져온다.

灰白色의 케양은 aphthous 케양과 매우 유사하다.

<原因> Herpesvirus hominis

<治療> idoxuridin연고의 도포에 좋은 效果를 볼. 光力學의 치료의 주의를 요함. 強한 抗生剤 투여도 必要하나 8歲以上에 Tetracyclines투여로 齒牙의 變色을 고려하여야 함.

<鑑別診斷> Papanicolaous Smear에서 용이하게 특징적인 巨大細胞를 發見할 수 있다.

- Erythema multiforme • Smallpox
- Epidermolysis bullosa • Pemphigus
- Herpes zoster food & drug allergy
 drug, chemical burn




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

서울시 인정 제60호

佑霖齒科技工所

代表 金 銓 中

서울特別市 永登浦區 新道林洞 934-59

晝間 (69) 3197

夜間 (86) 6803