

Labio-lingual technic의 臨床(XIII)

高麗大學校 醫科大學 齒科學敎室

劉 英 世

구강내에 시직하여 본다. (그림 162)



그림 162

보조탄선을 떼어낸다. (그림 159)




그림 159

포한 부분에 0.9mm선을 납착 (그림 160)




그림 160

0.9mm선을 전치 설측 치경부에 적합되게 bending하여 (그림 161)




그림 161

다음 반매축의 납착 (그림 163)




그림 163

필요에 따라 새로운 보조탄선을 납착하여 사용한다. (그림 164)




그림 164

이때 전치부 설측에 적합되었던 선은 납착된 곳의 0.5mm전방에서 cut하여 내고 혀에 닿지않게 polishing하여 준다.

* Labio-lingual arch사용시 술자 및 환자의 유의 사항

- i) 술자가 유의하여야 될 사항
 - a. 환자에게 사용시의 주의사항 및 rubber elastics

Labio-lingual technic의 임상

의 사용법 등을 지도 (그림 165)



그림 165

b. 환자 보호자에게도 주의사항을 잘 설명하여 주고 환자가 정확하게 사용하도록 지도, 감독 할것을 당부 하여 둔다(그림 166).



그림 166

ii) 환자의 주의사항

a. 식사시의 주의사항

- ① 단단한 음식이나 고기등은 잘게 썰어 먹기 편하게 할 것.
- ② 카라멜, 껌 등 끈적 거리는 음식은 절대로 먹지 말 것.

b. Tooth brushing시의 주의사항

- ① 구치부 설측은 음식이 붙어 잘 안닦임으로 세심히 주의할 기운여 닦을것.
- ② 치아사이에 음식이 끼어서 잘 나오지 않을 경우는 이쭉시게 등을 사용, 잇몸을 상하지 않게 주의하며 빼내도 좋으나 바늘이나 옷핀등을 사용하지는 말 것.

c. 철사가 휘거나 band 또는 장치가 떨어 져 나갔을 때.

- ① 주치의에게 곧 연락하여 고치도록 할 것.
- ② 장치가 잇몸이나 볼 안쪽등에 닿아서 아플때는 우선 숨을 둥글게 말아서 닿는곳에 테후 주치의에게 치료를 받도록 할것.

서울시 인정 제38호

친 일 치 과 기 공 소

대 표 김 대 훈

서울市 中區 義州路 1街 17

전 화 (70) 7 3 0 7