

前庭成形術

(Vestibuloplasty, Sulcus extension)

術式(3) Obwegeser's sulcus extension

- ① 下脣을 前方으로 당긴 다음 正中部에 vertical incision(alveolar crest에서 下脣의 vermillion border 까지)을 加한다.

- ② Scalpel이나 scissor 等으로 粘膜을 薄離한다.
(近心 또는 遠心側으로)


- ③ free하게 된 粘膜을 下方으로 당겨보아 충분한 sulcus depth가 形成되나를 檢查한 후 切開部를 3-0 dexon이나 chromic 等으로 緒合한다. (그림 A)

- ④ vaseline gauze로 감싼 rubber catheter를 sulurs bottom部에 넣고 button을 利用하여 固定시킨다. (이때 button과 skin 사이에도 vaseline gauze를 넣는다. 그림 B)

⑤ 만약 사용하던 義齒가 있으면 modeling compound나 guttapercha stopping으로 flange를 새로形成된 sulcus의 基底部까지 연장시켜 口腔内에 裝着시키면 固定이 더욱 확실하여, 그외에 acrylic splint를 利用할 수도 있다.

術式(4) Skin graft technique

- ① sulcus bottom을 따라 切開를 加한다.
 - ② scissor나 mosquito로 切開된 部位를 약간 더 薄離한다. (excess tissue가 있으면 切除한다.)
 - ③ thigh에서 split thickness skin을 採取하여, rubber catheter의 外面에 皮膚片을 감싼 후, 切開된 sulcus bottom에 位置시킨 다음 rubber catheter에 circumferential suture를 한 후 button을 利用하여 固定시킨다. (그림 C)



서울市認定第89号

代表 池 榮 輝

서울특별시 동대문구 용두동 223~23

92-8926, 93-0051