

IX. 拔齒 小考 (I)

우리는 혼히 開業街에서 “拔齒는 하면 할수록 어렵다.” “拔齒한번 잘못하면 평생 拔齒한 것 虛事된다”는 말을 듣는다. 또 拔齒患者가 후유증이 생겨서 死亡했다는 消息도 듣는 때가 있다. 그래서 拔齒를 可及의 기피하는 開業醫도 있다 한다. 그러면 왜 拔齒가 어려운가? 왜 拔齒 後 事故가 생기며 혹은 죽기까지 하는가?

우리가 拔齒(간단한 경우에서 복잡한 수술에 이르기 까지)에 面하여 생각하게 되는 것은 ① 安全한 拔齒, ② 쉽게 끝나는 拔齒, ③ 後遺症이 없는 拔齒, ④ 만약의 경우에 對備한 醫師의 對策(후유증, 소송문제) 등이다. 그러면 이러한 칭하고, 안전하고, 뒤워없는 拔齒를 하기 위한 原則은 무엇인가?

① 正確한 診斷

i) 먼저 해당 치아를 정확히 把握해야 한다. 기왕증을 充分히 귀담아 들고, 視診·觸診·打診을 해보고, 반드시 X-線 檢查를 實施하여 (너무 바빠서, 귀찮아서, 收入에 도움이 안되서 X-線 檢查를 省略하고 拔齒했다가 事故가 생기는 경우는 상당히 많다. 더구나 이번患者가 問題를 삼으면 醫師는 더욱 궁지에 몰리게 된다.) 正確한 診斷과 치료계획을 머릿속에 둔다.

ii) 患者的 全身狀態를 觀察한다.

血液疾患, 糖尿病, 高血壓, steroid長期投與 等 몇개의 牙를 拔齒하기 보다 生命維持에 더욱 중요한 장기에 疾患이 있는 경우 무엇하려고 서둘러 拔齒를 하겠는가? 拔齒後 生命을 위협하는 중대한 후유증이 생기는 것은 대부분 환자가 기왕에 가지고 있던 전신질환이 악화되어 생기는 경우가 많다.

iii) 術者の 能力

術者の 能力에 넘치는 모험적 치료를 施行하여 다행히 結果가 좋은 경우에는 術者에게는 보람이 있겠으나, 患者에게는 저극히 당연한 일이고, 結果가 나쁜 경우에는 術者, 患者 모두에게 저극히 害로운 일이 된다. 術者の 慎重한 判斷이 중요하다. 이번의 제일 큰 基準은 術者の 고통을 덜어주는 데에 어떻게 하는 것이 가장 좋겠는가에 있어야 治療費의 收入에 두어서는 안된다.

iv) 患者的 性格

모든 治療를 術者에게 맡기고 의지하는 患者인 경우, 만약의 事故나 후유증(醫師도 人間인데 失手가 없을 수 있겠는가?)이 생겼을 때 術者の 收拾策이나 解明을 잘 納得한다. 그러나 끝이 나빴을 때 모든 것을 惡意의으로 해석하여 術者를 풀탕 먹이는 경우 어떤 醫師가 선뜻 치료에 臨할 수 있겠는가?

② 禁忌症은 꼭 지켜야 한다.

例를 들면 局所에 금성 염증이 있는 치아를 가진 中年의患者가 痛을 때 별 생각없이 牙牙가 훈들리니까 잡아 뽑았다고 假定하자 多幸히 잘 治癒될 수도 있다. 그러나 일이 꼬여

서 잘못되는 경우는 또 없겠는가?. 이때 患者는 痛症으로 數日間 食事도 床에 못했고, 持病이 있어서 外觀上으로 일정해도 全身의 症狀으로는 治癒력이 아주 저하된 狀態였고(個人齒科에서 일일이 患者的 immunoglobulin을 check 할 수는 없잖은가?), 아프니까 藥局에서 藥(대개 진통제만)만 계속 사먹어온 患者였고, 어쩌다 형편이 어려워서 齒科에서 拔齒料 내고 돈이 모자라서 處方해준 항생·소염제(3日分이면 대개 7,000원 정도)먹는 것을 省略했다. (“다른 때도 이 때고 약 안먹어도 잘만 났던데”하면서) 數日後 高熱·오한나고 어지럼고 하여 近處 内科에 갔더니 狀態가 나쁘다고 종합병원에 가라고 한다.

종합병원 가서 몇시간 기다려 진찰받고 여러가지 檢查 받아보니 癥血症 증세가 있으니 入院하란다. 입원 보증금 장만하라, 접안일 정리하라며 치료비가 더욱 悪化되고, 침장에 이상오고, 갑자기 혼수상태에 빠지고…….

물론 이런 경우는 거의 없고 있어도 最惡의 경우일 것이다. 그러나 이런 엄청난 結果의始作은 반드시 별것 아닌 이빨 한두개 빼는데서 始作였음을 銘心해야 한다. 局所·全身의 拔齒禁忌症은 반드시 지켜야 失手가 없다.

③ 拔齒는 서두르지 말라


患者가 아프다고 急히 배달하고 호소할 때, 절아는 親戚이나 親의家族, 지위가 높은 사람일 때 특히 서두르지 말라 오히려 이런 경우 더욱 천천히 하라. 痛症이 심한 경우 그 原因이 牙髓에 있으므로 牙髓腔開放, 금성 염증에 있으면 항생·소염제 투여로 1~2日 진정시킨 후 拔齒하고, 地位가 고관대작이거나 親分관계가 있어서 특히 잘 봐주어야 할 경우에는 더욱 세심한 診斷·檢查를 거쳐서 人情의 感性이 醫學的理性을 앞질러 서둘러 拔齒하여 후유증이 생기면 그結果는 더 나쁜 것이 아니겠는가?

④ 拔齒는 부드럽게

無理없이 順調롭게 gentle하게 拔齒하라. 과도한 힘을 주거나 sharp한器具로 쿡쿡 끊거나 거칠게 꽂아 채거나 해서는 치아가 파절되거나 심상이고, 對合齒, 입술, 혀等에 不必要한 損傷을 주어 오히려 시간이 더 걸리게 된다. 이 하나에 려고 와서 인접치까지 2~3개를 빼거나 對合齒를 鉗子로 쳐서 파절시키면 얼마나 難堪하겠는가? 치아를 살살 달래듯이, 조심스럽게, 침게 나을 수 있도록 주위에 齒을 만들어 주고 살며시 부드럽게 들어내는 technic을 익혀 褒美화 하십시오.

⑤ 拔齒 後 患者教育

可能한 限止血이 確認된 후 귀가시키고, 집에서의 주의사항을 철저히 알려준다. (口頭, 인쇄물), 患者가 homecare를 잘못하여 多量出血, 突症発生, 연조직 손상(biting)等 후유증이 생기는 것을 豫防하고 만약의 경우에 術者の 責任을 따질 때 有利하게 된다.



SUCTION

- ① 가볍고 移動하기 쉬우며 기름칠을 할 必要가 없다.
- ② 真空計를 읽기 쉬우며 調節손잡이로 真空度를 0에서 22Hg까지 쉽게 調節할 수 있으며 排泄物이 흘러 넘지 않게 安全트랩이 달려 있다.
- ③ 녹과 腐蝕을 防止하기 위하여 Alcorite 皮膜을 입혀 놓았다.
- ④ Thomas社가 만든 本 Suction은 醫療機器標準(規格)에 合格한 精巧한 製品이다.

眞元洋行

서울·中區 仁峴洞 2街 73-1
(農田商街라동 363-2号) ☎ 274-4465