

매복 상악제 3 대구치의 발거

상악제 3 대구치는 하악에 비하여 증상이 심하지 않으나, 치아우식증이나 치관 주의염이 있을때 발거하게 된다. 주로 원심협축(distobuccal)으로 경사되는 경우가 많다.

상악제 3 대구치 발치시 합병증으로는 치아, 치조의 파절 및 상악결절의 골절, 구강-상악두공의 형성 및 상악동내 치근 또는 치아의 비입을 생각할

수 있다.

발거시 관골이나 하악골 관상돌기에 의하여 접근이 어려우므로 환자의 입을 가능한 다물게 하고 시행한다. 저자의 경우 왼손의 지지술 상악 교합면에 대고 환자에게 살짝 물도록 지시하여 기구의 접근을 용이하게 하기도 한다.




그림 1. 상악제 3 대구치 발거시 절개.

- A. 제 2 대구치 근심면에서 치은연을 따라 hamular process까지 원심으로 연장.
- B. 많이 사용되는 절개로 제 3 대구치의 근심면에 절개하여 기구의 접근을 돕는다.
- C. A의 경우 보다 수직절개를 보다 연장한 경우.

# 신일치과기공소

代表 孫 永 受

서울·중구 남대문로 5가 6-25(신한빌딩 402호)

☎ 756-2875 · 2876