


## (squamous cell carcinoma)

편평상피세포 암종은 상피에서 유래하는 악성종양으로 정확한 원인은 밝혀져 있지 않다. 편평상피세포 암종은 50세 이상의 남자에서 많이 발생하며 특히 객연자, 알콜중독자 및 구강위생상태가 나쁜 사람에서 호발한다. 편평상피세포 암종은 central type과 peripheral type으로 분류되며 central type은 하악 제3대구치 부위에서 많이 발생하며, peripheral type은 하순과 혀에서 호발하나 구강저나 치은에서도 발생한다.

임상적으로 보면 편평상피세포 암종의 크기가 1cm이하로 작은 경우에는, 증상이 나타나지 않으며, 크기가 큰 경우에는 통증이나 치각마비 및 종창이

나타나며 관련치아의 동요와 탈락이 야기되기도 한다.

초기에는 편평상피세포 암종이 방사선 검사에 나타나지 않으며, 암종이 골까지 침범하는 경우 골표면에 흡수나 골의 광범위한 파괴를 야기한다. 보다 진행되면 정상 골과의 경계가 불규칙하거나 불분명한 방사선투과상을 나타내고, 관련치아의 치근이 부분 또는 전체적으로 방사선투과상으로 둘러싸인다. 때로 치근흡수를 보이기도 하며, 양성종양에서 볼 수 있는 피질골의 팽윤이 나타나거나 골수염에서 보이는 부골과 같은 방사선상이 나타날 수 있으므로 골수염과의 감별진단이 필요하다.



정우치과기공소

Jung Woo Dental Lab.

전화 765-0606, 743-6633

서울특별시 종로구 효제동 145번지  
(혜암빌딩 5층)