

# 열대풍토병에 관하여

제 2 회

(열대지방 여행시 조심해야할 질병)




## 콜레라

- 열대지역은 어디서나 설사를 주증상으로 하는 이질아메바증을 일으키는 일이 적지 않다. 이렇게 되면 고치기 힘들뿐 아니라 생명의 위험성이 따르게 된다.
- 설사가 2일 이상 계속될때는 의사의 진찰을 받는 편이 좋다. 이들 질병을 예방하기 위해서는 생수를 마시는 일을 피할 것과 육류나 야채를 생식할때는 특히 주

의해야 한다.

## 간흡충 (간디스토마)

- 아시아의 여러지역에 있는 기생충병으로 유충을 육질속에 갖고 있는 담수어(특히 붕어나 잉어)의 생식에 의하여 감염된다.
- 이 기생충은 담즙이 흘러나오는 담관에 기생한다.
- 급격히 무서운 증상을 일으키지는 않지만



간장의 장해나 소화기장해, 황달 더나가는 간경화증을 일으킬 수도 있다.

- 보건소 및 한국기생충박멸협회 각 시도지부에서 주민 기생충검사를 실시하고 있으며 간흡충, 폐흡충, 조충류 등에 감염되어 있으면 관할보건소에서 무료 투약치료하고 있으니 출국전에 반드시 구충을 하고 즐거운 해외 취업이나, 여행을 즐기시기 바랍니다.



### 폐흡충

- 아시아, 중남미, 아프리카등 각지에 많이

분포하는 질병이다.

- 이 기생충의 유충은 민물게의 살갓이나 내장 및 민물가재의 살속에서 발육한다. 따라서 유충을 가지고 있는 게나 가재를 날로 먹거나 덜 익혀서 먹었을때에 감염된다.
- 이 기생충은 폐(허파)에 침입하여 혈담이나 무력증등 폐결핵과 비슷한 증상을 일으킨다. 또 성충이 뇌조직이나 각종 신경에 침투하여 증상을 일으키기 때문에 치명적일수도 있다.

### 조충에 의한 질병

- 중요한 질병의 원인이 되는 조충은 몇종류가 있으며, 모두 장내에 기생하며 띠모양의 기생충으로서 긴것은 10미터나 되는 것도 있다.



- 증세는 보통 소화기장해(설사, 복부둔통, 식욕부진, 구토), 빈혈, 쇠약 등이다.

(계속)