


盆栽 [8]

피라칸사



한국분재연구원
(0343-43-6367)
원장 안형재



—장미科—

學名 : Pyracantha-angustifolia

中國西南部가 原產地인 피라칸사는 常綠灌木으로써 높이 3m 까지 자라는 나무로써 잎은 互生하고 길이 5~6cm이고 楕圓形이다. 꽃은 4~5mm로써 白色 또는 연한 황백색이며 가지 윗부분의 葉腋에서 5~6월에 핀다. 가을에 익는 빨갛게 또는 등황색(橙黃色) 열매는 평평한 球形으로 직경 8mm정도 크기로써 광택이 있고 이듬해 봄까지 매달려 있으며 10~11월에 結實한다.

1. 번식법(繁殖法)

實生, 播木, 取木에 의해 繁殖한다.

播木은 3月中과 9月下旬頃에 영양이 充實하고 健康한 當年枝 또는 前年枝를 10cm 길이로 자른 다음 4cm 정도가 땅속에 묻히도록 삽목한다. 가을에 삽목할 경우에는 삽상이 얼지 않도록 해야 한다.

取木은 공중 취목법에 의하여 5~7월 사이에 환상박피법으로

실시하면 발근이 잘 된다.

2. 배양토(培養土)

3~4mm정도 크기의 마사에 부엽토 30% 가량을 혼합해서 사용한다.

3. 물주기

과습(過濕)하거나, 물기가 모자랐을 때에도 정상적인 생육이 이루어 지지 않는다. 따라서 보통 분재와 같이 봄, 가을 1회 여름 철에는 1일 1~2회 겨울철에는 3~4일에 1회 정도 흡뻑 주는 것이 좋다.

4. 비료주기

비교적 비료성분을 좋아하는 樹種이며 특히 많은 열매를 맺는 나무이므로 3~9月에 각각 1回式 置肥를施肥하고 장마철을除外하고 3~9월까지 10日 間隔으로 液肥를 주되 인산질(骨分)成分을 充實히 준다.

5. 알맞는 수형 및 전정

모양목 혼애 그리고 取木에 依한 石付기르기를 하면 훌륭한 樹形으로 기를 수 있다. 햇가지가 10cm 정도 자랐을 때 基部에서 2~3잎만 남기고 5~7월에 전정한다.

6. 병해충 방제

병으로는 탄저병이 발생하므로 病徵이 나타나면 다이젠엠45 800~1,000배액을 살포한다.

충해로는 진딧물이 수시로 발생하나 메타시스토스 1,000배액을 살포하면 즉시 구제 된다.

7. 겨울관리

상록성 식물이므로 겨울철에는 다른 분재와는 달리 약간 따뜻하게(영상 15°C) 관리하고 열매는 1월 말쯤에는 따주는 것이 좋다.