

알고 계십니까?

보건의학용어해설

◦ 뇌파

뇌신경세포에서 나오는 약한 주기성(周期性)의 전류로 이것을 기록하면 파동형의 곡선을 이룬다.

◦ 대증요법(對症療法)

병원(病原)을 다스리기 곤란한 경우에 질병의 겉으로 나타난 증상만을 고치는 치료법.

예) 고열에 해열제, 열음주머니를 사용하는 것.

◦ 동화작용(同化作用)

음식물이나 기타 체외 물질을 섭취하여 체내에서 분해되어 합성되는 과정.

◦ 부패(腐敗)

단백질 또는 기타 질소 화합물이 미생물에 의해 분해되어 악취, 유독물질 등을 내는 현상.

◦ 빈혈(貧血)

혈액중의 적혈구나 혈색소가 감소하는 현상. 체질 및 출혈, 독소의 작용, 급·만성전염병, 영양불량, 운동부족, 과로 등에 기인한다.

◦ 사시(斜視)

눈알 자체는 온전하나 동안근(動眼筋)에 이상이 생겨서 양쪽 눈의 시선이 일치하여 주시물(注視物)에 향하지 못하는 상태.

◦ 사혈(瀉血)

치료의 목적으로 환자의 혈액을 얼마간 몸 밖으로 뽑아내는 것. 혈압이 몹시 높을 때, 심장의 기능이 불완전할 때, 혈액의 양이 너무 많을 때 또는 해독의 목적으로 행함.

◦ 산성식품

소화흡수되어 혈액이 산성으로 되는 식품으로

서 쌀, 보리, 고기, 설탕, 술이다. 혈액이 산성으로 되면 몸이 무거워지며 피부의 긴장력도 쇠퇴해진다. 야채, 과일 등은 알칼리성 식품이다.

◦ 색맹(色盲)

색 감각이 전부 또는 일부가 결손되어 있는 것으로 전색맹과 부분색맹이 있다. 부분색맹에는 적록(赤綠)색맹이 많다.

◦ 색약(色弱)

색약은 색 감각이 전부 또는 일부가 약한 것으로 전색약과 적록색약(赤綠色弱)이 있다.

◦ 쇼크(Shock)

예기치 않은 돌연한 자극으로 정신적, 육체적으로 충격을 받는 것.

◦ 실신(失神)

급격한 정신의 감동, 공포, 경악 등으로 또는 의상, 타격 등에 의하여 반사적으로 뇌빈혈을 일으켜 일시적으로 의식을 잃는 일.