

麥粒腫에 대한 治驗 1例

黃敬植*

I. 緒 論

麥粒腫(Hordeolum)으로 本院에 來院한 患者에 게 太陰人의 處方인 調理肺元湯加味方으로 治療 하여 양호한 효과를 얻었으므로 보고한다.

II. 症 例

患 者: 18세 女性

初診日: 1991年 2月 13日

症 狀: 左側 眼瞼上部에 紅腫 疼痛

病 名: 麥粒腫

現病歷: 2年前 부터 麥粒腫이 右眼胞 或은 左眼胞의 上下에 나타면서 紅腫, 疼痛하면서 隨時로 發生하였다가 消失되곤 한다. 症狀이 惡化되면 麥粒腫이 여러개 생기기도 하며, 麥粒腫이 처음으로 發生하기 시작하였던 初期에는 眼科 治療도 받아 보았고, 藥局에서 買藥하여 服用도 하였지만 根本的인 治療가 없었기 때문에 治療를 포기하고 있던중 親知의 소개로 本院에 來院하였다.

初診時 診察 所見

顔色은 全體的으로 蒼白하였고 平素는 불론이지만 현재도 疲勞를 많이 느낀다. 胃腸障得는 없으나 食慾不振하며, 感氣는 없으나 목에는 가래가 끼고 或은 기침을 한다고 한다. 大便은 1일 1

회로 正常이며 或 滑便이 있으며 便秘는 없다. 小便은 1日에 4-5회이고 白色이며 疲勞時에는 黃色을 띤다. 夏節에는 汗出이 많고 물도 많이 마시고, 月經은 대체로 正常이지만 間或 生理痛이 있다.

以上の 諸症狀과 脈狀 등으로 綜合한 결과 肝大肺小한 太陰人으로 判斷되었으며 寒性 麥粒腫으로 診斷하였다.

治療 및 經過

調理肺元湯加味方 10日分(1劑)를 服用토록 하였으며 服用 3日만에 이미 發生한 左側眼瞼의 麥粒腫이 內部로 吸收되면서 消失되었으며 10日分을 모두 服用한 후에는 食慾도 好轉되고 疲勞도 다소 減小되었다.

이 患者의 麥粒腫은 虛弱함에 起因한 것으로 보고 20日分(2劑)을 追加로 服用토록 하였다. 服用중 麥粒腫의 再發도 없었고 咽炎도 그리고 間或 있었던 咳嗽도 治癒되었다. 患者는 食慾도 好轉되었고 顔色도 좋아졌다고 한다. 수개월이 지난 후에도 再發되지 않았음이 確認되었다.

III. 考 察

調理肺元湯加味方은 太陰人의 處方인 調理肺元湯(麥門冬 桔梗 薏苡仁 各 8, 黃芩 麻黃 蘿卜子 各 4)에 杏仁 桑白皮 五味子 山藥 各 4 을 加味한 處方이다. 調理肺元湯은 重病後 調理를 目的

* 黃敬植 韓醫院長

으러 할 때 應用되는 處方으로 平素 虛弱한 者의 疲勞回復을 위하여 이용되고 있다.

太陰人은 원래 肝大肺小한 體質로서 重病後 또는 平素 虛弱한 경우에는 더욱더 肝火가 旺盛하려 하고 肺燥하기 쉬워진다. 그러므로 重病 後나 虛弱時에는 반드시 肝肺의 過不級을 調節함으로써 原狀回復이 될 수 있는 것이다.

上記의 調理肺元湯加味方을 使用하여 補肺 瀉肝作用을 통해 健康이 回復되고 氣血循環이 활발해짐으로서 麥粒腫이 자연적으로 吸收 消失되었으며 再發이 防止되었다고 본다.

參考文獻

1. 東醫壽世保元註釋 : 韓東錫, 서울, 國際出版印刷株式會社, 1967.
2. 四象體質醫學論 : 尹吉榮, 서울, 現代印刷文化社, 1973.
3. 東洋醫學大辭典 : 謝觀, 서울, 高文社, 1962.