

# 丹毒에 對한 文獻的 考察

鄭蓮姬\* · 蔡炳允\*\*

## I. 緒 論

丹毒은 皮膚가 갑자기 發赤하여 붉은 칠을 해 놓은 것 같으며, 遊走不定하는 一種의 急性 皮膚病이다<sup>36) 53) 58)</sup>.

이 疾患은 β 溶血性 A군 連鎖菌에 의해 發生되는 경우가 많은데<sup>60)</sup>, 菌이 皮膚 또는 粘膜의 微細한 破損處를 侵犯하여<sup>47)</sup>, 甚한 淋巴管炎과 全身症狀를 同伴하게 된다<sup>9)</sup>.

初起에는 突然惡寒<sup>13) 22) 36) 53) 58)</sup>, 發熱<sup>13) 22) 24) 34) 36)</sup>, 頭痛<sup>13) 34) 36)</sup>, 骨楚<sup>13) 36)</sup>, 胃納不香<sup>13) 36)</sup>, 便秘<sup>13) 14) 24) 36)</sup>, 尿赤<sup>13)</sup>, 或 嘔吐<sup>24)</sup>, 腹瀉<sup>24)</sup> 등의 症狀이 나타난다.

局部症狀를 보면 먼저 小片의 紅斑이 나타나고<sup>13) 14) 24)</sup> 급히 蔓延하여<sup>13) 14) 22) 34) 36) 58) 59)</sup> 鮮紅色의 大片을 形成하고<sup>14) 24)</sup> 境界가 清楚하여, 누르면 皮膚의 紅色이 減退되고<sup>13) 24) 36)</sup>, 손을 떼면 다시 紅色이 나타난다<sup>13) 36)</sup>. 腫脹하여 觸痛<sup>14) 46)</sup>하며, 어떤 경우에는 水疱가 出現하기도 하며<sup>14) 24) 34)</sup>, 化膿壞死하는 경우도 있다<sup>14)</sup>.

好發部位는 面<sup>22) 59) 60)</sup>, 下腿, 足<sup>22) 60)</sup>이며 紅·腫·熱·痛·遊走不定·境界鮮明<sup>11) 29)</sup>의 特徵을 나타낸다.

本病은 成人이나 小兒에 모두 發生하지만, 특히 嬰幼兒에 多發하며<sup>45) 53)</sup> 病의 進行이 迅速하여 예후가 不良하다<sup>24) 53)</sup>.

巢<sup>25)</sup>는 “人之身體 忽然焮赤 如丹塗之狀 故謂之丹”이라 하였으며, 原因은 “風熱惡毒所爲”라고 하였으며, 腫脹面의 色과 發生하는 部位의 差異에 따라, 白丹, 黑丹, 赤丹, 室火丹, 天龍火丹, 等等 33種類로 區分하였다.

또한 顧類經<sup>33)</sup>에서도 龍額丹, 龍尾丹, 龍火丹 等等, 發生部位와 色에 따라 22種으로 區分하였다.

이에 著者는 文獻을 調査하여, 丹毒의 種類와 異名, 證狀, 原因, 內服藥, 外用藥을 整理하였으므로, 그 結果를 報告하는 바입니다.

## II. 資料 및 方法

### 1. 資 料

文獻 60種을 資料로 選定하여, 丹이라고 名稱된 內容을 拔萃하여 研究 檢討하였다.

다음에 丹에 대해 頻用되어진 文獻中에서 他文獻에 引用된 文獻만을 選擇하여 記錄하였다.

#### 1) 隨·巢元方, 巢氏諸病源候論<sup>25)</sup>

丹者 人身體忽然焮赤如丹塗之狀 故謂之丹<sup>7) 8) 13) 15) 25) 28) 33) 34) 54)</sup>

或發手足 或發腹上 如手掌大<sup>13) 15) 25) 28) 33) 54)</sup>

皆風熱惡毒所爲<sup>13) 15) 25) 33) 54)</sup>

重者亦有疽之類<sup>13) 15) 25) 33) 54)</sup>

不急治則痛不可堪 久乃壞爛去膿血數升<sup>15) 25) 28) 33) 40)</sup>

若發於節間 便流之四肢 毒入腸則殺人<sup>15) 25) 28) 33) 54)</sup>

小兒得之最忌<sup>13) 15) 25) 28) 54)</sup>

風熱毒氣客於腠理 熱毒搏於血氣 蒸發於外 其皮上熱而赤如丹之塗 故謂之丹也<sup>25) 35) 54)</sup>

若久不瘡即肌肉爛傷<sup>25) 35) 54)</sup>

#### 2) 唐·孫思邈, 備急千金要方<sup>27)</sup>

丹毒一名天火 肉中忽有赤如丹塗之色 大者如手掌 甚者遍身有癢有腫(痛<sup>11) 31)</sup>) 無其定色(處<sup>11) 31)</sup>)<sup>27) 28) 31) 33)</sup>

\* 경희대학교 대학원

\*\* 경희대학교 한의과대학 교수

有血(白<sup>28</sup> 33) 丹者 肉中腫起 養而復痛 微虛腫如吹狀 隱軫起也。有鷄冠丹者 赤色而起 大者如連錢 小者如麻豆粒狀 肉上粟粟如鷄冠肌理也(如鷄冠色 皮澁<sup>28</sup> 33) 一名茱萸丹。有水丹者 由偏身熱起 遇水濕搏之結丹 晃晃黃赤色 如有水在皮中 喜著股(眼<sup>28</sup> 33) 及陰處此雖小疾 不治令人致死<sup>27</sup> 28 33)。

3) 清·顧世澄, 瘍醫大全<sup>15</sup>  
(內徑) 丹·燦皆屬火<sup>15</sup> 17) 28)

少陽司天 客勝則丹疹外發 及爲丹燦<sup>15</sup> 33) 39) 45)  
(戴復庵)

發丹色狀不一 癢痛亦異

大概因血熱肌虛 風邪所持而發

然色赤者多 以赤故謂之丹 有發而色白 謂之冷瘡 此病多緣肌肉疏爲風邪所襲而成

風熱則赤 風冷則白 今人但呼赤爲丹 白爲瘡

古方亦名爲癩疹 非特分寒熱 亦兼備四氣

近世方論呼 白爲婆瘡 赤爲血風<sup>15</sup> 28) 33)。

(陳實功)

赤游丹又名火丹 乃心火妄動 三焦風熱乘之 故發於肌膚之表。

有乾濕之不同 紅白之各異。乾者色紅形如雲片上起風粟, 作癢發熱 此屬心肝二經之火 治以涼心瀉肝 濕者色多黃白 大小不等 流水作爛多痛 此屬脾肺二經濕熱 宜清肺瀉脾<sup>15</sup> 28)。

腰脇生之 肝火妄動 又名纏腰丹 甚者急以細磁鋒 砭血 精豬肉片貼之<sup>15</sup>。

火灼瘡者 先天之熱毒也 火走空竅 故必於口鼻眼目 陰囊糞門之處紅點如癬 漸成紅泡 踰日而穿 赤色無皮 如湯火燻炙之狀 痛苦殊甚 睡臥不安 一二日間週身能腐 若至額門腫氣 陰毒腫亮者不治。

及一切丹毒入臟腑 突出漿 面頰紫浮 噎氣不乳 手足卷禁 大小便絕 胸背血点 舌生黑瘡 心胸紫腫者 皆爲不治<sup>15</sup>。

小兒赤游丹乃受毒於未生前 發病於有生後<sup>15</sup> 29)

皆賴父精母血籍以生養 父母不能節其慾 多致淫

火猖熾 胎必侵受, 既生之後 熱湯洗浴 烘熏衣物 觸動內毒 欲發之時 先必發熱啼叫 驚搐, 次生紅腫光亮發熱, 瞬息遊走無定 發無定處<sup>11</sup> 15) 24)。

起於腹背 腹背流入 四肢者輕, 起於四肢 流入胸背者重<sup>11</sup> 15) 24) 29)。

(馮魯瞻)

赤紫丹瘤 皆心火內鬱而發 赤如丹砂 故名曰丹 因熱毒客於皮膚 搏於氣血而風乘之 陰滯於陽則發丹毒 熱極生風 片刻之間 遊走遍體 虛熱則癢 實熱則痛 自四肢而歸於腹者難療<sup>15</sup>。

書雖有五色之分 十丹之異 總不出血熱而屬於心 心火內熾 客風外乘 風勝則樹木皆搖 故令遊走殊速 名爲丹者<sup>33</sup> 以心應火而色赤也<sup>33</sup> 34)。

色紅者生 白者氣虛挾痰 紫者毒盛 色青如苔者死 赤者名赤遊丹 熱毒感之深也。其狀赤腫 片片如胭脂塗染 或發於手足 或發於頭面胸背 令兒躁悶腹脹 其熱如火 痛不可忍 遊走遍體 流行其速 須急治之 若一入腹入腎 卽不可救 白者名曰 白遊風 感風濕之輕證也 其候流塊作癢 壯熱增寒 鼻塞腦悶 咳嗽吐逆 其治之法 赤者清涼解毒 甚則砭去惡血 以葯塗之 白者疏散滲濕而已。

(李東垣)

丹毒者 謂人身忽然赤如塗丹之狀 故謂之丹毒 世俗有云赤瘤 或因有瘡誤而相觸 四畔焮赤 謂之瘡瘤。

凡丹毒之疾 皆遊走不定 狀如雲氣者是也。

小兒得之 最忌百日之內 謂之胎瘤

以其氣血嫩弱 臟腑柔脆 難任鏃鍼 所以忌也<sup>15</sup>。

4) 清·孫震元, 瘍科會粹<sup>28</sup>

(直指)

丹之爲候 由熱毒之氣 搏於榮血而風乘之 所以赤浮肌肉而 爲之走注也。

然丹有五色 不特色赤 或青 或黃 或白 或黑 是血熱風毒 有盛有衰 元冷挾熱 故其色變易又不同焉。

要之, 諸瘡皆屬於心 心爲血之主 血爲熱之媒 古人以丹命名<sup>28</sup> 蓋謂心應火 色尙赤<sup>28</sup> 41) 端冷癸元

夫既心家血熱所致 風以動之 於是遊走而遍體也<sup>28)</sup>.

蔓衍而不歇 則肌爛 自四肢而入腹 入腎則殺人 惟初生於胸腹 然後流散於四肢者 易愈<sup>28) 41)</sup>

5) 清·陳士鐸, 辨證錄<sup>51)</sup>

人身有熱之後 其身不涼 遍身俱紅紫之色 名曰火丹 人以爲熱在胸膈 誰知熱在皮膚乎.

夫火丹似與發斑相同 何分二名 不知二病熱 雖相同而症實名異. 蓋發斑者 紅白相間也, 火丹者 一身盡紅也.

發斑 熱鬱於內而發於外,

火丹 熱鬱於外而趨於內

發於外者 有日散之機, 趨於內者 有日深之勢 故發斑之症輕, 火丹之病重.

然不知消火之法 輕者未必不變爲重 苟知散鬱之方 重者亦變爲輕也.

故治火丹之病 補其水之不足 散其火之有餘 使火外出 不在內攻可也.

蓋火丹原有二症 一赤火丹 一白火丹也

赤丹皮乾 白丹皮濕<sup>51)</sup>

赤丹屬心肝之火<sup>15) 51)</sup> 白丹屬脾肺之濕<sup>15) 51)</sup>

## 2. 方法

1) 丹毒의 異名을 調査하여 整理하였다.

2) 丹毒의 證狀을 調査하여 整理하였다.

3) 丹毒의 原因을 調査하여 整理하였다.

4) 丹毒의 種類를 調査하여 整理하였다.

5) 內服藥은 3回 以上の 頻度를 나타낸 것을 表化하였다.

6) 外用藥은 5種 以上の 藥物로 構成된 處方은 3回 以上の 頻度를 나타낸 것을, 3-4種의 藥物로 구성된 處方은 4回 以上の 頻度를 나타낸 것을, 2種의 藥物로 構成된 것은 5回 以上の 頻度를 나타낸 것을, 單方은 10回 以上の 頻度를 나타낸 것을 表化하였다.

7) 같은 藥物이 여러가지 藥名으로 記錄된 것

은 中藥大辭典을 基礎로 하여 統一시켜 調査하였다.

8) 한 藥物이 한 文獻에서 여러번 나타난 경우는 重複하여 參考文獻을 표시하였다.

## III. 資料 整理

### 1. 異 名

No.	異 名	內 容
1	赤 瘤	丹世俗云 赤瘤 <sup>7)15)39)41)52)</sup>
2	溜	諸丹不同 其發無定處 俗又謂之溜 <sup>11)29)40)41)</sup>
3	丹 瘤 <sup>15)16)17)32)</sup>	
4	赤 流 <sup>35)41)</sup>	
5	赤紫丹瘤 <sup>15)</sup>	
6	流 火 <sup>37)</sup>	
7	天 火	丹毒一名 天火 <sup>11)14)27)28)31)33)37)</sup>
8	赤遊風	丹毒又稱赤遊風 <sup>2)4)17)32)53)</sup> 小兒丹毒 又名 赤遊風 <sup>24)</sup>
9	赤遊丹	赤者名 赤遊丹 <sup>15)</sup> 丹毒又稱 赤遊丹 <sup>2)4)15)29)53)</sup>
10	赤遊丹火 <sup>11)</sup>	
11	火 丹	丹毒又名火丹 <sup>34)</sup> 赤遊丹 又名火丹 <sup>15)28)</sup>
12	丹 腫 <sup>7)23)</sup>	
13	丹 燂	丹燂之名 卽指丹毒 <sup>14)</sup>
14	遊風丹毒	遊風丹毒 名天火 又名流火 俗謂風疔, 風疔瘡是也 <sup>37)</sup>
15	風 疔	
16	風疔瘡	

以上에서 본 바와 같이 丹毒의 異名은 赤 遊風, 赤遊丹, 赤遊丹火, 火丹, 丹腫, 丹標, 遊風  
 瘤, 溜, 丹瘤, 赤流, 赤紫丹瘤, 流火, 天火, 赤 丹毒, 風疙, 風疙痞이다.

2. 證狀에 對한 整理

No.	關 係	證 狀  및  內 容
1.	色	忽然焮赤如丹塗之狀 <sup>4)7)11)13)15)25)27)28)29)31)33)40)41)48)</sup> 丹有五色 <sup>15)17)28)33)41)</sup> 不特色赤 或青或黃或白或黑 <sup>28)41)</sup> 無定色 <sup>27)28)33)</sup> 片片赤色如胭脂染 <sup>41)</sup> 丹色不一 <sup>15)28)33)41)48)</sup> 色如火灼 <sup>11)</sup>
2.	乾 濕	有乾濕之不同 <sup>15)28)31)</sup> 紅白之名異 <sup>15)28)</sup> 乾者色紅如雲片 上起風粟 作癢發熱 <sup>15)28)</sup> 濕者色多黃白 大小不等 流水作煉多痛 <sup>15)28)</sup>
3.	赤 腫	赤腫片片如胭脂塗染 <sup>6)11)15)16)17)28)32)38)41)</sup> 紅腫光亮 <sup>11)15)</sup> 赤浮肌肉而爲之走注也 <sup>15)</sup> 腫 <sup>27)28)31)32)33)41)</sup>
4.	熱	其熱如火 <sup>6)15)28)38)41)</sup> 發熱 <sup>11)15)</sup> 熱漸引 <sup>41)</sup> 壯熱 <sup>41)</sup>
5.	癢 痛	癢痛變異 <sup>15)28)33)41)48)</sup> 痛不可忍 <sup>15)28)38)41)</sup> 無痛 <sup>15)</sup> 癢 <sup>11)27)28)31)33)</sup>
6.	遊 走	流行甚速 <sup>15)</sup> 瞬息遊走無定 <sup>11)15)</sup> 遊走不定 <sup>7)15)28)37)38)41)</sup> 狀如雲氣者 <sup>7)15)</sup> 發無定處 <sup>11)14)15)22)29)40)41)58)</sup> 流走經絡 散發肌表 <sup>11)29)40)41)</sup> 遊走遍體 <sup>6)15)16)17)28)37)38)41)</sup>

No.	關係	證狀要內容
7.	部 位	或發手足 <sup>6)11)13)15)25)28)33)38)41)54)</sup> 或發腹上 <sup>13)15)25)28)33)54)</sup> 發於骨間之間則支斷如截 <sup>40)</sup> 發於肌膚之表 <sup>15)28)</sup> 發於頭面 <sup>6)15)28)38)41)</sup> 發於胸背 <sup>6)15)28)38)</sup> 發於皮膚 <sup>28)</sup> 從臍上腫起 <sup>38)</sup> 從兩脚赤腫 <sup>38)</sup> 從兩脚赤白點走 <sup>38)</sup> 從陰上起 <sup>38)</sup> 從頭頂上紅腫痛 <sup>38)</sup> 從面上赤腫 <sup>38)</sup> 從背起 <sup>38)</sup> 從兩背赤腫 <sup>38)</sup> 從兩脇虛腫 <sup>38)</sup> 從胸脇虛腫 <sup>41)</sup> 或注頭上 <sup>11)</sup> 發於臀部 <sup>32)</sup> 發於四肢 <sup>32)</sup>
8.	크 기	如手掌大 <sup>11)13)15)25)27)28)31)33)40)41)54)</sup>
9.	重 證	重者亦有疽之類 <sup>13)15)25)33)54)</sup> 甚則 周流四體 <sup>40)41)</sup> 甚者遍身 <sup>11)27)28)31)33)41)48)</sup> 色愈紫赤 脹亦愈堅 <sup>32)</sup> 尤重者 熱毒凝壅 堅硬成塊 <sup>32)</sup> 發於頭而胸背者重 <sup>32)</sup> 發時身如火灼 煩躁脹悶者 亦重 <sup>32)</sup>

No.	關係	證狀 및 內容
10.	預 後	不急治 或至壞爛出膿血 <sup>15)25)28)33)40)</sup> 久不差則 肌肉壞爛 <sup>25)35)54)</sup>
		小兒如三日不治 攻入腸胃必死 <sup>15)</sup> 入腹入腎 卽不可救 <sup>7)11)15)17)</sup> 若入小腹陰囊 如青傷者死 <sup>28)</sup> 毒氣入裏 腹脹則死 <sup>7)</sup> 攻入臟腑卽死 <sup>28)</sup> 丹毒入腹近心卽死 <sup>29)40)41)</sup> 毒氣遂壅咽喉 必難生點 <sup>15)28)</sup> 一切丹毒入臟 臍突出漿 面頰紫浮 噎氣不乳 手足舉 禁 大小便絕 胸背血點, 舌生黑瘡 心胸紫腫者 皆爲 不治 <sup>15)</sup>
		發於節間 便流四肢 毒入腸(腹)則殺人 <sup>15)23)25)28)33)40)41)54)</sup> 自腹內生 出四肢者則易愈 自四肢生入腹者 難治 <sup>7)15)17)41)48)</sup> 從腹往四肢者生 從四肢入腹者無救 <sup>7)8)15)</sup> 起於腰背流入四肢者輕 起於四肢流入胸背者重 <sup>11)15)29)45)</sup> 丹腫起於兩脇心背 不速治卽殺人 <sup>23)</sup> 發於四肢生 發於腰腹者死

丹毒의 證狀은 대부분 赤色을 띠고 或白·黃·靑·黑色을 띠며, 乾濕의 差異가 있으며, 赤腫, 發熱, 癢痛 或痛은 없이 養하기만 하며, 遊走不定·流行甚速하며, 全身에 發하고, 크기는 手掌大인 것으로 나타났다. 重證은 痘의 형태를 띠고 遍身하며 色이 더욱 紫赤하고 腫은 더욱 堅硬하다.

不急治하거나 久하면 肌肉壞爛·膿血을 出한다.

毒氣가 入腹入臟하면 死하고 四肢에서 發하여 胸腹背陰으로 入하면 死한다.

### 3. 原因에 對한 分類

原因은 風熱, 火(熱), 心火, 濕熱, 胎毒(胎熱), 風火濕寒으로 나타났다.

No.	原因 및 內容
1.	<p>風熱惡毒所爲<sup>13)15)25)29)33)36)54)</sup>  風熱<sup>3)4)11)40)41)</sup>  由熱毒之氣 搏於榮血而風乘之<sup>28)41)</sup>  血熱風毒<sup>28)</sup>, 血熱肌虛 風邪所搏而發<sup>15)28)</sup>  熱毒客於皮膚 搏於氣血而風乘之 陰滯於陽則發丹毒<sup>15)</sup>  由內有積熱熏蒸 外被風熱所感 搏於氣血<sup>11)</sup>  血分有火而受風也<sup>11)</sup></p>
2.	<p>少陽司天 客勝則丹疹外發<sup>15)17)28)39)41)</sup>  火<sup>13)15)17)28)31)</sup>  熱毒之氣<sup>13)17)39)40)</sup>  熱在皮膚 熱鬱於外而趨於內<sup>51)</sup>  相火之病<sup>39)</sup>  血毒<sup>48)</sup>  血分有熱 火毒犯肌膚<sup>22)</sup>  惡毒熱血 蘊蓄於命門<sup>7)</sup></p>
3.	<p>心火妄動 三焦風熱乘之<sup>2)15)28)31)37)</sup>  心實熱<sup>41)48)</sup>  不出血熱而屬於心 心火內熾<sup>15)</sup>  心火內鬱而發<sup>15)</sup></p>
4.	<p>濕熱<sup>4)18)38)</sup>  肝膽濕熱<sup>38)</sup></p>
5.	<p>小兒受胎內之毒<sup>2)15)29)31)41)52)</sup>  胎熱<sup>4)11)26)28)36)49)</sup></p>
6.	<p>風火濕寒<sup>31)</sup></p>

#### 4. 丹毒의 種類

##### 1) 色에 의한 丹毒의 分類

色에 의해 分類한 丹毒은 10種으로, 白色을 띠는 것은 白丹, 赤色은 赤丹, 黑色은 黑丹, 風火

丹, 藍色은 藍注, 赤黑色을 띠는 것은 赤黑丹, 暴火丹이며 暴火丹은 白黑色을 나타내기도 한다. 靑黑色은 石火丹, 五色을 나타내는 것은 五色丹, 留火丹이며, 留火丹은 赤色을 나타내기도 한다.

No.	丹名	異名	色	癢	痛	腫	熱	原因	其他
1.	白丹 <sup>25)</sup>	冷癩 <sup>15)31)37)</sup> 婆癩 <sup>15)</sup> 白遊風 <sup>15)</sup> 冷丹 <sup>15)37)</sup> 白火丹 <sup>51)</sup>	白色 <sup>23)35)41)54)</sup> 白色塊 <sup>15)</sup>	初發癢 <sup>15)23)33)35)41)54)</sup>	痛 <sup>23)33)35)41)51)54)</sup> 腹痛 <sup>41)48)</sup> 無痛 <sup>31)33)37)</sup>	微虛腫如吹軫走 <sup>23)35)41)48)54)</sup> 肉中腫起 <sup>41)48)</sup> 滿身發斑 <sup>51)</sup>	無熱 <sup>31)37)</sup> 壯熱 <sup>15)</sup>	熱挾風冷 <sup>33)41)54)</sup> 熱輕挾風多 <sup>23)25)</sup> 風濕之輕證 <sup>15)</sup> 火毒未發 肌膚 外受寒鬱 <sup>31)37)</sup> 脾肺之濕熱 <sup>15)</sup> 氣虛狹痰 <sup>15)</sup> 脾肺之濕 <sup>51)</sup>	遊走不定 <sup>31)37)</sup> 起白癩 <sup>31)</sup> 赤小白泡 <sup>37)</sup> 斑上有水流出 <sup>51)</sup> 皮濕 <sup>51)</sup> 流塊, 增塞, 鼻塞, 腦悶, 咳嗽, 吐逆 <sup>15)</sup>
2.	赤丹 <sup>25)</sup>	茱萸丹 <sup>25)33)35)40)41)54)</sup> 丹 <sup>28)</sup> 血風 <sup>28)</sup> 熱丹 <sup>28)</sup> 赤遊 <sup>17)</sup>	純赤色 <sup>25)27)28)33)</sup> 紅色塊 <sup>15)</sup>	遍身癢 <sup>17)</sup>		軫起大者如運錢, 小者如麻豆 <sup>25)31)41)54)</sup> 肉上粟如鷄冠肌理 <sup>25)27)28)31)33)41)54)</sup> 遍身如細繭一宿成瘡 <sup>40)</sup>		熱毒搏血氣 <sup>25)</sup> 風毒乘之 <sup>17)</sup> 熱毒所作 <sup>23)</sup> 心肝之火 <sup>51)</sup> 風毒之重 <sup>25)33)41)54)</sup> 風熱 <sup>15)</sup>	皮滋 <sup>37)</sup> 皮乾 <sup>54)</sup> 背起 <sup>40)</sup>



No.	丹名	異名	色	癢	痛	腫	熱	原因	其他
3.	黑丹 <sup>25)</sup>		燥微黑 <sup>25)</sup> 35)41)54) 燥腫起 微黑 <sup>33)</sup> 黑色 <sup>33)</sup>	癢 <sup>25)33)35)41)</sup> 54)	痛 <sup>23)25)33)35)</sup> 41)54)	腫起 <sup>23)25)41)</sup> 54)		風冷 <sup>25)</sup> 風毒傷於 肌肉 <sup>33)41)54)</sup> 熱毒復有冷 以乘之 <sup>23)</sup> 熱經而挾 於風多 <sup>23)</sup>	
4.	五色丹 <sup>25)</sup>	油腫 <sup>41)</sup> 五色油丹 <sup>41)</sup> 硫丹腫 <sup>48)</sup> 五色遊毒 <sup>41)</sup> 赤流丹 <sup>41)</sup>	發而改變 無常 或青 黃白黑赤 25)33)35)41)54)				遍身壯熱 如熱燒 <sup>23)</sup>	風毒之熱， 有盛有衰 或冷或熱 故發爲五色 丹 <sup>23)25)33)41)</sup> 54)	
5.	赤黑丹 <sup>25)</sup>		赤黑 <sup>25)35)</sup>					冷熱互交 <sup>25)</sup> 35)	
6.	藍注 <sup>25)</sup>		皮肉色如 藍 <sup>25)35)</sup>					小兒爲風冷 乘其血脈 血得冷則結 聚成核 <sup>25)35)</sup>	經久不歇 <sup>25)</sup> 35)

No.	丹名	異名	色	癢	痛	腫	熱	原因	其他
7.	石火丹 <sup>25)</sup>		青黑 <sup>25)35)</sup>						發通身似繖 目突如粟是 也 <sup>25)35)</sup>
8.	風火丹 <sup>25)</sup>		肉黑 <sup>25)</sup>			忽腫起 <sup>25)</sup>			
9.	暴火丹 <sup>25)</sup>		帶黑皴 色 <sup>25)35)</sup> 紫紅 <sup>35)</sup>						
10.	留火丹 <sup>25)</sup>		正赤色 <sup>25)</sup> 變改無時 五色 <sup>35)</sup>						發一日一夜 便成瘡如棗 大 <sup>25)</sup> 發時一日甚 <sup>35)</sup>

2) 部位에 의한 丹毒의 分類

A.

No.	丹名	異名	色	部位	原因	其他
11.	室火丹 <sup>25)</sup>		皮色赤而熱 <sup>25)</sup>	初發時必在腓腸 <sup>25)</sup>		如指大 長三·二寸 <sup>25)</sup>
12.	天竈火丹 <sup>25)</sup>	天竈丹 <sup>15)</sup>	赤色 <sup>25)</sup> 赤腫小黃色 <sup>15)</sup>	發於兩腎 <sup>17)41)</sup> 發於兩股 <sup>25)33)35)41)54)</sup> 發於尻間 <sup>33)54)</sup> 發於頭額 <sup>15)</sup> 發於兩臂 <sup>15)</sup> 發於一臂 <sup>15)</sup> 至陰頭 <sup>25)33)35)41)54)</sup>	手陽明風熱 <sup>15)</sup>	赤腫 <sup>25)33)35)41)54)</sup> 出血 <sup>23)25)33)35)41)54)</sup>
13.	廢竈火丹 <sup>25)</sup> (=灶)	廢灶丹 <sup>35)</sup>	皮色赤	發於足趺上 <sup>23)25)33)54)</sup> 從兩脚 <sup>35)</sup> 從脾間起 <sup>27)</sup> 從臂曲上起 <sup>35)</sup>		若熱流下冷陰頭赤腫出血 <sup>27)</sup>
14.	尿竈火丹 <sup>25)</sup>	尿竈丹 <sup>41)</sup>	赤 <sup>25)58)</sup>	發於胸腹及臍 <sup>25)</sup> 從兩脇及臍間起 <sup>25)48)</sup> 發膝上 <sup>25)40)41)</sup> 從兩股起及臍間 <sup>23)27)33)35)40)41)54)</sup> 從踝 <sup>40)35)</sup> 及髀 <sup>40)</sup> 連陰頭 <sup>25)27)33)41)54)58)</sup>		

No.	丹名	異名	色	部位	原因	其他
15.	標火丹 <sup>25)</sup>		皮色赤 <sup>25)</sup>	發於背 <sup>25)33)35)</sup> 發於穀道 <sup>25)33)35)</sup> 在於臂 <sup>25)33)</sup>		
16.	癘火丹 <sup>25)</sup>		皮赤 <sup>25)</sup>	發於脾 <sup>25)</sup>		散走無常處 <sup>25)</sup>
17.	蝨火丹 <sup>25)</sup>		皮赤 <sup>25)33)40)54)</sup>	發於髀 <sup>25)</sup> 從額起 <sup>33)40)54)</sup> 從耳起 <sup>33)35)</sup> 從頭起 <sup>35)</sup> 至脇 <sup>25)40)54)</sup>		多痛 <sup>33)</sup> 丹發如灼 <sup>33)</sup>
18.	天火丹 <sup>25)</sup>	天灶火丹 <sup>35)</sup> 天火瘡 <sup>41)</sup>	身體斑赤如火 之燒 <sup>25)</sup> 肉中赤如丹 <sup>27)</sup> <sup>33)41)54)</sup> 渾身赤轉腕 <sup>35)</sup> 正赤 <sup>35)</sup>	從背 <sup>15)17)33)35)41)</sup> 從腹 <sup>35)</sup> ，臍 <sup>17)</sup> 腰起 <sup>17)</sup> 發尻間 <sup>35)</sup> 流陰頭 <sup>35)</sup>	腎經中熱毒 膀胱風熱 <sup>15)</sup>	劇者遍身赤癢 <sup>25)33)54)</sup> 或痛或腫 <sup>27)</sup> 遍身起 <sup>27)35)</sup> 出血 <sup>35)</sup> 赤色 大如手 <sup>27)33)41)</sup> <sup>54)</sup> 赤腫 <sup>15)35)</sup> 點 <sup>17)28)33)41)</sup> 赤點疤 <sup>15)</sup>

No.	丹名	異名	色	部位	原因	其他
19.	伊火丹 <sup>25)</sup>		青黑色 <sup>35)40)</sup>	兩脇下起 <sup>35)40)</sup> 發於膀 <sup>25)35)</sup>		
20.	骨火丹 <sup>25)</sup>		赤若黑 <sup>25)35)</sup> 赤黑 <sup>40)</sup>	在 臂		瘡見骨著足踝 <sup>33)</sup>
21.	厲火丹 <sup>25)</sup>		赤 <sup>25)35)</sup>	從脇下起 <sup>25)35)</sup> 背 <sup>35)</sup> 從額上起 <sup>35)</sup>		能移走 <sup>25)35)</sup>
22.	飛火丹 <sup>25)</sup>	飛龍丹 <sup>15)17)</sup>	赤 <sup>35)</sup>	背 <sup>25)35)</sup> 膝 <sup>25)35)</sup> 從項起 <sup>40)</sup> 從頭頂 <sup>15)17)41)</sup> 頸項俱浮 <sup>15)</sup> 兩臂 <sup>35)</sup>		紅腫 <sup>15)17)41)</sup> 眼睛紅色 <sup>15)</sup>
23.	遊火丹 <sup>25)</sup>			發兩臂及背 <sup>25)35)</sup>		如火灸 <sup>25)35)</sup>
24.	殃火丹 <sup>25)</sup>			發兩脇·腋下 <sup>23)25)27)33)35)</sup> 發膀上 <sup>23)25)27)</sup> 發膀上 <sup>35)</sup>		
25.	朱田火丹 <sup>25)</sup>		正赤色 <sup>41)</sup>	先發背 遍身 <sup>25)33)35)40)54)</sup>		一日一夜成瘡 <sup>25)33)35)</sup> 40)54) 棗大 <sup>41)</sup>
26.	鬱火丹 <sup>25)</sup>			從背起 <sup>25)35)</sup>		

No.	丹名	異名	色	部位	原因	其他
27.	神火丹 <sup>25)</sup>	神灶丹 <sup>40)</sup> 神竈丹 <sup>33)35)</sup>	赤黑 <sup>25)40)58)</sup>	發兩膀 <sup>25)33)</sup> 膀 <sup>35)</sup> 從項起兩額 <sup>40)</sup> 從肚起 <sup>33)35)</sup>		不過一日便赤黑 <sup>25)33)35)40)</sup>
28.	鬼火丹 <sup>25)</sup>		赤起如李子 <sup>25)</sup> <sup>33)40)54)</sup>	從面上起 <sup>15)17)28)35)40)</sup> 發兩臂 <sup>25)33)54)</sup>	手陽明經風熱 <sup>15)</sup>	紅腫 <sup>15)17)28)41)</sup>
29.	野火丹 <sup>25)</sup>	野灶丹 <sup>40)</sup> 野龜丹 <sup>35)</sup> 野竈丹 <sup>41)</sup>	赤 <sup>15)17)25)27)28)</sup> <sup>33)35)41)54)</sup>	發遍身 <sup>27)33)40)</sup> 遍背腹 <sup>25)33)35)41)54)</sup> 從背脊起 <sup>33)35)</sup> 從膝起 <sup>40)</sup> 從兩腿上起 <sup>15)</sup> 從兩脚上起 <sup>15)17)</sup>	足陽明經風熱 <sup>15)</sup>	赤斑 斑如梅子 <sup>25)33)</sup> <sup>35)40)41)54)</sup> 赤腫如火燒 <sup>15)17)28)</sup>
30.	茱萸火丹 <sup>25)</sup>			從背起 <sup>25)35)</sup>		一宿成瘡 <sup>27)</sup> 偏身如細蠶 <sup>25)27)35)</sup>
31.	家火丹			發於兩腋 <sup>25)35)41)54)</sup> 發於兩膀上 <sup>25)33)35)41)54)</sup> 發於兩頰 <sup>33)35)54)</sup>		
32.	胡吹灶丹 <sup>40)</sup>	胡吹丹 <sup>15)</sup> 胡漏丹 <sup>15)17)28)</sup> 胡火丹 <sup>17)28)</sup> 胡漏竈丹 <sup>35)</sup>		從臍中起 <sup>28)33)35)40)41)</sup> 從陰上起 <sup>15)28)33)40)41)</sup> 從陰囊上起 <sup>35)</sup>	任脈中熱與濕 <sup>15)</sup> 足厥陰肝經虛火 發於外 <sup>15)</sup>	黃腫 <sup>15)17)28)</sup> 赤腫 <sup>15)</sup>

No.	丹名	異名	色	部位	原因	其他
33.	烟火丹 <sup>40)</sup>		赤如火 <sup>28)33)</sup>	從身起 <sup>40)</sup> 從背起 <sup>15)40)</sup> 從兩脇 <sup>28)33)</sup> 兩足背上起 <sup>15)</sup> 足底心起 <sup>15)</sup> 兩足起 <sup>28)33)</sup> 兩脚上起 <sup>17)28)</sup> 走兩臂 <sup>40)</sup>	足三陽經風熱 <sup>15)</sup> 足少陰腎經大熱 <sup>15)</sup>	痛 <sup>15)</sup> 尿赤如火 <sup>40)</sup> 赤腫 <sup>15)</sup> 赤白點 <sup>17)28)</sup>
34.	地灶丹 <sup>40)</sup>	地竈丹 <sup>41)</sup>		從陰下起 入踝骨上 <sup>40)</sup>		
35.	私灶丹 <sup>40)</sup>			從背上起 <sup>40)</sup>		
36.	土虺丹 <sup>35)</sup>			逐漸下行至關節 <sup>35)</sup>		作紅絲 <sup>35)</sup>
37.	土竈丹 <sup>35)</sup>			從踝起 <sup>33)35)</sup> 從陰起 <sup>35)</sup>		
38.	天雷丹 <sup>35)</sup>			頭項起 <sup>35)</sup>		
39.	朱黃丹 <sup>35)</sup>		赤豆色 <sup>35)</sup>	遍身上起 <sup>33)35)</sup> 從右脚起 <sup>33)</sup>		
40.	古竈丹			從頭上向腦後紅腫 <sup>15)</sup> 從頭上紅腫痛 <sup>17)41)</sup> 從頭額腫痛 <sup>28)</sup>	膀胱經風熱 <sup>15)</sup>	

No.	丹名	異名	色	部位	原因	其他
41.	抱頭火丹 <sup>27)34)</sup> 57)			頭面 <sup>13)34)</sup> 頭部 <sup>2)13)29)</sup>	天行熱毒 <sup>34)</sup>	
42.	流火 <sup>34)</sup>			脛踝 <sup>2)34)</sup> 發於腿 <sup>20)</sup> 下肢 <sup>13)29)</sup>	濕熱下注 <sup>34)</sup>	
43.	灶丹 <sup>28)41)</sup>		赤如火燒 <sup>28)</sup>		從兩脚起 <sup>28)33)</sup>	
44.	竈額丹 <sup>33)</sup>		赤色 <sup>33)</sup>	滿身胤 <sup>33)</sup> 先從頭上起 <sup>33)</sup>		
45.	竈尾丹 <sup>33)</sup>		黑色 <sup>33)</sup>	從腰起 <sup>33)</sup>		遍身疼痛 <sup>33)</sup>
46.	龍火丹 <sup>33)</sup>		黃赤色 <sup>33)</sup>	從腹起至心胤 <sup>33)</sup>		
47.	君竈丹 <sup>33)</sup>		赤色 <sup>33)</sup>	從右手上起 <sup>33)</sup>		引似蛇行 <sup>33)</sup>
48.	母竈丹 <sup>33)</sup>			從左脚上起 <sup>33)</sup>		
49.	安竈丹 <sup>33)</sup>		紫赤色 <sup>33)</sup>	從陰上起 <sup>33)</sup>		
50.	星子丹 <sup>33)</sup>		赤色 <sup>33)</sup>	從頭起 <sup>33)</sup>		胤遍身如錢子大 <sup>33)</sup>
51.	蜂子丹 <sup>33)</sup>			從頭面四向胤 <sup>33)</sup>		



No.	丹名	異名	色	部位	原因	其他
52.	亂神丹 <sup>33)</sup>		紫黑色 <sup>33)</sup>	從肚內起出口內 <sup>33)</sup>		天下惡證 <sup>33)</sup>
53.	住火丹 <sup>33)</sup>		黃赤色 <sup>33)</sup>	從背上起 <sup>33)</sup>		
54.	母子丹 <sup>33)</sup>			從眼眶上起 <sup>33)</sup>		
55.	蜘蛛丹 <sup>33)</sup>			滿身 <sup>33)</sup>		
56.	佛家丹 <sup>33)</sup>			從耳起 <sup>33)</sup>		
57.	塊丹 <sup>33)</sup>			或至數處 <sup>33)</sup>		初發如湯泡頃刻則 大連發不已 <sup>33)</sup>
58.	蛇纏丹 <sup>33)</sup>			匝腰則死 <sup>33)</sup>		
59.	神氣丹 <sup>35)</sup>			從頭背上起 <sup>35)</sup>		
60.	鬼臉火丹 <sup>57)</sup>			滿面頻出 <sup>57)</sup>		發癢難禁 <sup>57)</sup>

## B.

No.	丹名	異名	癢	痛	熱	腫	瘡	水疱	色	部位	原因	其他
61.	內發丹毒 <sup>15)</sup>	內丹 <sup>15)</sup>		痛 <sup>15)33)</sup> 痛如火燎 <sup>15)31)</sup>		腫 <sup>15)33)</sup> 似板而微腫 <sup>15)</sup>			赤色如霞 <sup>15)31)33)</sup> 赤色如塗硃 <sup>15)</sup>	脇下 <sup>15)30)33)</sup> 生於肋骨 <sup>2)13)15)29)31)</sup> 發於淵腋金門等穴或左或右皆少陽膽經 <sup>15)</sup> 胸腹 <sup>13)</sup> 腰胯 <sup>13)14)15)31)33)34)</sup>	肝脾二經熱極生風 <sup>15)</sup> 肝脾濕熱熱極生風 <sup>34)</sup>	遊走如雲 <sup>15)31)</sup>
62.	腿遊風 <sup>15)28)33)</sup>			焮痛 <sup>15)</sup> 焮熱痛 <sup>31)</sup>		忽然赤腫 <sup>15)28)31)33)</sup> 赤腫如雲 <sup>31)</sup>			紅色形如推雲 <sup>15)31)</sup>	腿股 <sup>15)28)31)33)</sup> 兩腿 <sup>15)34)</sup> 大腿 <sup>2)13)29)</sup>	風熱相搏足太陽經 <sup>15)28)31)</sup> 營衛風熱相搏結滯而成 <sup>15)31)</sup> 此癰受小腸·腎經 <sup>28)</sup> 傷於寒熱邪氣毒遊於腿此遊毒 <sup>28)</sup> 風濕熱相搏 <sup>34)</sup>	忽裏忽外忽上忽下不定 <sup>15)</sup>
63.	腎氣遊風 <sup>15)</sup>	腎臟風瘡 <sup>15)28)</sup>	瘙癢 <sup>15)28)</sup> 癢極破 <sup>28)</sup>	痛如火烘 <sup>15)31)</sup>		紅腫 <sup>15)28)31)</sup> 形如雲片 <sup>15)31)</sup>	成瘡 膿水淋漓 <sup>15)28)</sup>			皮膚如癬久則延及遍身 <sup>15)28)</sup> 肚 <sup>15)31)</sup> 腿 <sup>2)15)28)31)</sup> 兩足 <sup>28)</sup> 脚跟 <sup>28)</sup> 膝(脛) <sup>2)28)30)</sup>	腎虛風邪乘於膝脛 <sup>15)28)</sup> 腎熱內蘊外受風邪膀胱氣滯而成 <sup>15)31)</sup> 腎虛有火血燥或思色精出而內敗 <sup>28)</sup>	遊走不定 <sup>15)31)</sup>

C.

丹名	頭部			上肢	胸腹部				腰背部				下肢部				全身
	頭	面	頸	臂	腋下	脇	胸	腹	背	腰	腎	陰	腿	膝	脛	足	
室火丹																●	
天竈火丹	●			●						●	●	●	●				
廢竈火丹				●									●		●	●	
尿竈火丹						●		●				●	●	●		●	
標火丹				●					●		●						
疇火丹													●				
螢火丹	●	●		●		●											
天火丹								●	●		●	●					
伊火丹						●							●				
骨火丹				●													
厲火丹	●								●								
飛火丹			●	●					●					●			
遊火丹				●					●								
殃火丹					●	●							●				
朱田火丹									●								●
鬱火丹									●								
神火丹	●		●					●					●				
鬼火丹		●		●													

丹名	頭部			上肢	胸腹部			腰背部				下肢部				全身	
	頭	面	頸	臂	腋下	脇	胸	腹	背	腰	腎	陰	腿	膝	脛		足
野火丹								●	●				●	●	●		●
茱萸火丹									●								
家火丹		●			●								●				
胡吹火丹								●				●					
烟火丹				●		●			●						●	●	
地灶丹												●					●
私灶丹									●								
土魁丹														●			●
土竈丹						●						●					●
天雷丹	●		●														
朱黃丹															●		●
古竈丹	●																
抱頭火丹	●																
流火													●		●	●	
灶丹															●		
竈額丹	●																●
竈尾丹										●							
龍火丹								●									

丹名	頭部			上肢	胸腹部				腰背部				下肢部			全身	
	頭	面	頸	臂	腋	脇	胸	腹	背	腰	腎	陰	腿	膝	脛		足
君竈丹				●													
母竈丹															●		
安竈丹												●					
星子丹	●																
蜂子丹	●	●															
亂神丹		●						●									
住火丹									●								
母子丹		●															
蜘蛛丹																	●
佛家丹		●															●
土鬼丹																	●
纏丹										●							
神氣丹	●								●								
鬼臉火丹		●															
內發丹毒						●	●	●		●		●					
腿遊風													●				
腎氣遊風								●					●		●	●	

3) 그 外의 丹毒의 種類

No.	丹名	異名	癢	痛	熱	腫	瘡	水泡	色	部位	原因	其他
64.	丹軫 <sup>25)</sup>	丹疹 <sup>41)54)</sup> 丹疹 <sup>15)</sup>	微癢 <sup>25)41)</sup> 癢 <sup>54)</sup>	痛 <sup>54)</sup>	不熱 <sup>25)</sup>	隱軫相連 <sup>25)41)</sup> 偏身腫 <sup>25)41)</sup> 微腫如吹軫起 <sup>54)</sup>			肉色不變 <sup>25)41)</sup> 白丹肉中起 <sup>54)</sup> 赤色 <sup>54)</sup>	遍身紅點如灑硃 <sup>15)</sup>	赤疹~熱 <sup>41)54)</sup> 白疹~風熱相搏 <sup>41)54)</sup> 惡毒熱血蘊於命門 <sup>7)</sup> <sup>16)</sup> 遇君相火二火合起即發 <sup>16)</sup>	
65.	丹火 <sup>25)</sup>							須臾 標漿起 <sup>25)35)</sup>	發赤如火之燒 <sup>25)35)</sup>	丹走行皮中浸廣者名丹火也 <sup>40)</sup>		
66.	火丹 <sup>25)</sup>	火焰丹 <sup>23)33)41)</sup>				遍身紅腫 <sup>15)</sup>		須臾 漿起 <sup>40)</sup>	發赤如火之燒 <sup>40)</sup> 赤着身而日漸大 <sup>25)35)</sup> 盡紅 <sup>51)</sup> 紫紅 <sup>20)51)</sup>	丹走皮中浸淫名火丹 <sup>17)</sup> 一身盡紅 <sup>51)</sup> 遍身俱紅紫 <sup>20)51)</sup> 背 <sup>23)57)</sup> 前心 <sup>15)</sup> 足踝 <sup>15)</sup> 膝 <sup>23)</sup> 頭 <sup>33)57)</sup> 兩臂 <sup>23)</sup>	人有身熱之後 其身不涼 <sup>51)</sup> 熱鬱於外而趨於內 <sup>51)</sup> 熱在皮膚 <sup>51)</sup>	往往如傷寒 <sup>35)</sup> 熱如火燒 腰 須急救之 <sup>40)</sup> 頭痛如火燒 <sup>15)</sup>

No.	丹名	異名	癢	痛	熱	腫	瘡	水疱	色	部位	原因	其他
67.	丹瘤 <sup>15)</sup>	丹毒瘤 <sup>28)33)</sup> 丹煉赤瘤 <sup>41)</sup> 赤瘤 <sup>41)</sup>							赤色 <sup>15)</sup> 41) 火之色 <sup>41)</sup> 浮赤走引 <sup>39)</sup>	走引遍身 <sup>39)</sup> 41) 生頰下如櫻桃突出色赤而光 <sup>15)</sup>	邪熱之毒在表 <sup>39)41)</sup> 相火主之 <sup>41)</sup> 熱毒客于腠理 搏於氣血 發於皮膚 <sup>29)</sup>	
68.	水丹 <sup>37)</sup>	水激丹 <sup>15)</sup> 風丹 <sup>37)</sup>		濕爛多痛 <sup>31)37)</sup>		兩脇虛腫 <sup>15)17)28)</sup>		遍身起疱 <sup>31)</sup> 初起白癩 漸透黃色 光亮脹堅 <sup>31)</sup> 破流黃水 <sup>31)37)</sup>	結丹如黃色 <sup>27)</sup> 28)31)33) 41)48)54) 色白 <sup>31)</sup>	兩脇 <sup>15)17)28)</sup> 多生腰膝 <sup>31)</sup> 37) 喜着腹 <sup>54)</sup> 眼 <sup>28)33)</sup> 股 <sup>27)</sup> 陰處 <sup>27)28)33)</sup> 54)	徧身熱起 遇水搏之 <sup>27)28)33)41)54)</sup> 足少陽膽經風熱 <sup>15)</sup> 脾肺有熱而挾濕 <sup>37)</sup>	
69.	痞子火丹 <sup>57)</sup>									腹內有塊 <sup>57)</sup>		身發惡寒 <sup>57)</sup>
70.	夾痘丹 <sup>15)</sup>								赤如塗赤朱於皮膚之上 <sup>15)</sup>		熱毒惡血蘊蓄 命門相火合而發起 <sup>15)</sup>	與痘相兼而生 <sup>15)</sup>

No.	丹名	異名	癢	痛	熱	腫	瘡	水疱	色	部位	原因	其他
71.	赤遊丹 <sup>31)</sup>	赤溜 <sup>17)33)</sup> 赤遊 <sup>52)</sup> 赤遊風 <sup>15)</sup> 17)45) 纏瘡 <sup>41)</sup> 赤遊腫 <sup>11)</sup> 25)41)54) 赤流腫 <sup>27)</sup> 赤遊風腫 <sup>17)</sup> 赤流 <sup>33)35)</sup> 41) 赤流丹 <sup>35)</sup> 遊風流火 <sup>57)</sup> 赤遊丹毒 <sup>57)</sup>	作癢 <sup>15)31)</sup>	疼痛 <sup>26)36)40)</sup>  痛不可言 <sup>11)</sup>	發熱 <sup>31)</sup> 36)52) 灼熱 <sup>36)</sup> 壯熱 <sup>20)</sup> 33)35)41) 熱如火 <sup>11)</sup> 熱 <sup>35)41)</sup>	紅腫 <sup>17)</sup> 20)35)36)40) 54)57) 成片 <sup>52)</sup> 形如雲片 <sup>24)31)36)37)</sup> 45) 忽然腫 <sup>15)</sup> 腫 <sup>11)25)33)</sup> 35)36)41)54)	生瘡如粟成塊成路極痛者 <sup>57)</sup> 一日一夜即成瘡 <sup>33)</sup>		赤 <sup>15)24)</sup> 31)33)45) 如丹 <sup>24)</sup> 36)45) 紅 <sup>36)</sup> 赤如丹砂 <sup>11)</sup> 一片片 赤色如胭脂染 <sup>33)35)41)</sup>	遊走全身 <sup>2)</sup> 遊走遍體 <sup>11)</sup> 17)20)41)49) 遊移上下 <sup>11)</sup> 漸至遍身如棗大 <sup>33)</sup> 皮乾 <sup>31)</sup> 起於背 <sup>11)31)</sup> 33) 胸 <sup>11)</sup> 腹 <sup>31)</sup> 腿上患 <sup>52)</sup> 四肢之間 <sup>49)</sup> 起手足 <sup>11)57)</sup>	胎毒 <sup>2)15)29)31)41)52)</sup> 胎中熱毒 <sup>4)11)26)28)36)</sup> 49) 濁惡熱毒之氣 <sup>7)39)</sup> 熱毒感之深 <sup>15)23)</sup> 血熱 <sup>17)32)33)</sup> 外風邪毒 <sup>36)</sup> 風熱 <sup>24)25)26)28)40)45)</sup> 54) 心火內熾 <sup>11)26)28)</sup> 血分有火而受風 <sup>31)</sup> 37)	遊走不定 <sup>24)35)36)</sup> 45)49) 流行不止一處 <sup>15)</sup> 無發定處 <sup>36)</sup> 遊走甚速 <sup>32)</sup> 嬰兒·小兒에 多發 <sup>2)13)15)</sup> 17)24)29)31) 45)53)
72.	胎瘤 <sup>28)</sup>	胎瘡 <sup>38)</sup> 胎毒發丹 <sup>33)</sup>		不甚疼痛 <sup>31)</sup>		腫起大者如饅小者似梅李 <sup>28)</sup> 31) 微硬 <sup>31)</sup>	一二歲生瘡遍身 <sup>38)</sup>		紫 <sup>31)</sup> 赤 <sup>33)</sup>	胸乳間 <sup>28)31)</sup> 延及胸腹 <sup>33)</sup> 四肢 <sup>33)</sup> 頭上 <sup>28)31)33)</sup>	胎中瘀血凝滯 <sup>28)31)</sup> 胎熱 <sup>31)</sup> 胎毒內伏 <sup>33)</sup>	遊走不定 <sup>33)</sup> 小兒最忌百日內謂之胎瘤難治 <sup>8)</sup>
73.	風瘙隱疹 <sup>25)</sup>	風丹 <sup>28)33)41)</sup>	遍身癢甚 <sup>17)</sup> 28)33)	不痛 <sup>25)</sup>		不腫 <sup>25)</sup> 相連成隱疹 <sup>25)</sup>					小兒因汗 解脫衣裳風入腠理 與血氣相搏 結聚起相連成隱疹 <sup>25)</sup>	



No.	丹名	異名	癢	痛	熱	腫	瘡	水泡	色	部位	原因	其他
74.	身有赤處 <sup>5)41)</sup>								肉色赤面壯熱 <sup>25)33)</sup> 41)54) 赤如燕脂 <sup>33)</sup>	頰上或口旁 眼下 <sup>33)</sup>	小兒因汗 爲風邪毒氣所傷 與血氣相搏 熱氣蒸發於外 <sup>25)33)</sup> 41)54) 心熱血凝 <sup>33)</sup>	
75.	火灼瘡 <sup>15)</sup>	火赤瘡 <sup>28)</sup>		痛苦殊甚 <sup>15)</sup> 火燒疼痛 <sup>28)</sup>				燎漿走徹成膿生疱 黃水時出 沾破皮膚 <sup>28)</sup> 口鼻眼目陰囊糞門之處紅點如繻漸成紅疱 踰日而穿 <sup>15)</sup>	初生赤色 <sup>28)</sup> 赤色無皮如湯火燂炙之狀 <sup>15)</sup>	一二日間 週身能腐 <sup>15)</sup>	氣血虛殘 邪毒攻發 <sup>28)</sup> 先天之熱毒 火走空竅 <sup>15)</sup>	睡臥不安 <sup>15)</sup>
76.	紅絲瘡 <sup>17)28)</sup>	金絲瘡 <sup>17)</sup> 28) 紅絲瘤 <sup>28)</sup> 31) 紅絲疔 <sup>28)</sup> 血絲疔 <sup>28)</sup>	或癢 <sup>28)</sup> 不癢 <sup>28)</sup>	或痛 <sup>28)</sup> 不痛 <sup>28)</sup>			形似小瘡 <sup>28)</sup>	有黃疱 <sup>28)</sup> 其狀但一水疱 清澄光瑩如小雞頭大 <sup>28)</sup> 其底下濺濺然數十小針孔，泡邊當有一絲脈如紅紅隱隱在皮裏 <sup>28)</sup>	紅絲貫穿或如一紅線 <sup>28)</sup> 其中忽紫黑色 <sup>28)</sup> 一條紅絲邊迤而上生瘤皮色紅中含血絲 <sup>31)</sup>	手足間 <sup>28)</sup> 皮含血絲 <sup>17)</sup> 頭上有之 <sup>17)</sup> 手中指節 <sup>28)</sup>	心腸積毒 氣血相凝 滯於經絡之間 發於肌膚之上 <sup>28)</sup> 風熱相乘 <sup>28)</sup> 喜怒不常 血氣逆行而生 <sup>28)</sup> 火毒不甚 <sup>17)</sup> 腎伏火 <sup>31)</sup> 此標毒不甚 廣闊 <sup>28)</sup>	如箭之速 <sup>28)</sup> 狀如線或繩 巨細不一 <sup>17)28)</sup> 發無定處 <sup>31)</sup> 雖非丹疹 其毒實同 <sup>28)</sup> 其行甚速 <sup>28)</sup> 所謂丹毒是也 <sup>28)</sup>

No.	丹名	異名	癢	痛	熱	腫	瘡	水泡	色	部位	原因	其他
77.	大頭瘟 <sup>7)</sup>			頭痛甚 <sup>2)</sup>				紅腫中自有水泡 <sup>49)</sup>		頭部가 몸 시 붓는다 <sup>2)</sup>	感天地四時非節瘟疫之氣 <sup>7)</sup>	抱頭火丹重者 <sup>29)</sup> 瘟疫의 一種 <sup>2)</sup>
78.	纏腰丹 <sup>15)41)</sup>	纏蛇丹 <sup>41)</sup> 53) 纏蛇瘡 <sup>37)</sup> 纏腰火丹 <sup>3)4)22)53)58)</sup> 跣跣瘡 <sup>4)</sup> 29) 蛇盤腰 <sup>46)</sup> 蛇串瘡 <sup>19)</sup> 22)29)31)44) 58) 蛇丹 <sup>19)</sup> 蠅蝮瘡 <sup>12)</sup> 蛇纏 <sup>12)</sup> 纏腰龍 <sup>29)</sup> 37) 火帶 <sup>58)</sup> 火帶瘡 <sup>44)</sup> 串腰龍 <sup>4)</sup> 飯帶瘡 <sup>29)</sup> 蛇瘡 <sup>3)</sup> 龍纏瘡 <sup>57)</sup>		痛苦 <sup>34)</sup> 刺痛 <sup>4)</sup> 36)53)58) 忽有疼痛 如芒刺 如刺虫 所螫 <sup>12)</sup> 劇疼 <sup>29)</sup> 頭痛 <sup>34)</sup>	寒熱 <sup>34)</sup> 灼熱 <sup>53)</sup> 壯熱 <sup>12)</sup> 皮膚灼熱感 <sup>4)</sup>	有腰間紅腫 <sup>37)</sup> 紅腫堅硬 <sup>31)</sup>	生瘡如粟成塊成路極痛 <sup>57)</sup> 初結痞瘤 小者如黍粟 大者如麻豆 如茱萸子狀 <sup>12)</sup> 腰生一紅瘡 兩邊生紅筋 <sup>15)</sup>	帶狀米粒樣小疱疹(水泡) <sup>4)22)46)46)59)</sup> 集簇性水泡 <sup>22)36)</sup> 透明混濁 에서 轉 으로 神經 4)22)59) 分布를 따라 排列 <sup>53)</sup> 身體一側에 局限 <sup>36)52)</sup> 繞腰生膿汁, 成疱 <sup>52)</sup> 四邊赤中 央有白膿 如悉粟 <sup>52)</sup>	發紅 <sup>58)</sup> 發赤如米粒大·豌豆大 <sup>4)</sup>	皮肉急舉 <sup>12)</sup> 背部神經痛 <sup>46)</sup> 脇 <sup>12)15)</sup> 胸 <sup>12)53)</sup> 腹 <sup>53)</sup> 肋 <sup>31)</sup> 脇間神經腫痛 <sup>46)</sup> 腰 <sup>12)15)31)</sup> 37) 面 <sup>53)</sup>	肝火妄動 <sup>3)15)24)31)33)</sup> 肝氣鬱結 <sup>36)</sup> 肝膽濕熱 <sup>36)</sup> 濕熱內蘊 <sup>3)34)29)</sup> 熱盛濕鬱 <sup>4)</sup> 熱毒灼營 <sup>4)</sup> 脾虛濕盛 <sup>4)36)</sup> 氣滯血瘀 <sup>4)36)</sup> 心肝二經火邪 濕毒 凝結而成 <sup>44)58)</sup> 乾性~肝心二經風火 <sup>31)57)</sup> 濕性~脾肺二經濕熱 <sup>31)57)</sup> 風熱外感 <sup>3)</sup> 外感毒邪 <sup>22)</sup>	乾性~色紅 如雲上起 風粟作癢 發熱累累 如珠 濕性~起黃 白水疱大 小不等破爛流水多 痛 <sup>31)34)57)</sup>

No.	丹名	異名	癢	痛	熱	腫	瘡	水疱	色	部位	原因	其他
79.	標瘡 <sup>41)</sup> 54)	標疹 <sup>39)</sup>						生標漿而 潰成瘡 <sup>41)</sup> 54)		從兩脇下出 於脇肋次及 身表 漸及四肢 <sup>39)</sup>	風起熱毒之氣所傷 客於皮膚 <sup>41)54)</sup>	
80.	瘡瘤 7)15)								四畔焮赤 <sup>2)</sup> 7)15)		或因有瘡誤而相觸 2)7)15)	遊走不定狀 如雲氣者是 也 <sup>7)15)</sup>
81.	胎驚 丹毒 <sup>31)</sup>				煩熱夜 啼 <sup>31)33)</sup>			初發時 散生滿面 狀如水痘 33)	忽兩眼紅暈 面色青黯 或面如燕脂 31)33)	脚微紅 <sup>33)</sup> 頸項赤如朱 砂 <sup>33)</sup> 時出時急延 及頸項 <sup>31)</sup>	孕母受驚 傳襲子胎 伏熱在內 散發於面 31) 伏熱在內 <sup>33)</sup>	繼發丹毒 <sup>31)</sup>
82.	赤白遊 腫 <sup>33)</sup>					赤腫起 33)			青黃赤白 無復定色 <sup>33)</sup> 肉上微光 <sup>33)</sup>	遊走於皮膚 之間 <sup>33)</sup>	小兒肌虛 風毒熱氣 所乘熱毒搏於血氣 <sup>33)</sup> 風熱 <sup>33)</sup>	遊走不定 <sup>33)</sup>
83.	滯熱丹 毒 <sup>31)</sup>	傷食發 丹 <sup>33)</sup>					瘡瘍發 焮周圍 有赤暈 31)			遍身赤暈 <sup>33)</sup>	嬰兒乳食過多 不能 運化 蘊熱於內 達 於肌表而生 <sup>31)33)</sup>	形若赤遊丹 較之赤遊丹 走緩慢 <sup>31)</sup> 其熱消散或 膿出自退 <sup>33)</sup>
84.	眼丹 <sup>35)</sup>									眼卒然赤腫 生翳至有十 數翳者是也 35)		

部位에 의해 區別한 丹毒은 53 種이다. 頭部에 發한 丹毒은 18種이며, 上肢部에 發한 丹毒은 10 種이며, 胸腹部에 發한 丹毒은 15種이며, 腰背部에 發한 丹毒은 22種이며 下肢部에 發한 丹毒은 21種이다.

한 部位에만 發하는 丹毒은 24種이며, 2部位에 發하는 丹毒은 14種이며, 3部位에 發하는 丹毒은 4 種이며, 4部位에 發하는 丹毒은 3種이며, 全身에 發하는 것은 7種이다.(部位에 依해 區別한 丹毒)

色과 部位에 의해 區別되지 않는 丹毒을 整理한 것으로 모두 21種이다.

丹疹은 丹毒의 全般的인 證狀을 나타내며, 丹火, 火丹, 纏腰丹, 水丹은 水疱가 生하는 丹이며, 赤遊丹, 胎瘤, 胎驚丹毒, 滯熱丹毒은 小兒에 나타나는 丹毒이며, 風瘙癩疹, 身有赤處, 紅絲瘡, 火灼瘡, 大頭瘟 等은 丹毒과 다른 證候로 볼 수 있다.(色과 部位로 區別되지 않는 丹毒)

### 5. 內服藥에 對한 使用頻度

<內服藥의 出現頻度>

No.	處方名	構成藥物	頻度
1	犀角消毒飲 (犀角解毒飲 <sup>15)16)17)</sup> 犀角消毒散 <sup>16)</sup>	牛蒡子, 荊芥, 防風, 甘草, 犀角 <sup>4)7)8)9)15)16)20)28)33)38)38)38)55)</sup> 金銀花 <sup>28)38)</sup> 黃芩 <sup>15)16)20)33)55)</sup>	13
2	龍膽瀉肝湯	龍膽草, 連翹, 生地黄, 澤瀉, 車前子, 木通, 黃芩, 黃連, 當歸, 梔子, 甘草 <sup>1)4)4)13)23)30)31)34)36)36)44)57)58)</sup>	13
3	漏蘆湯 (漏蘆散 <sup>35)</sup> )	漏蘆, 白朮, 黃芩, 麻黃, 升麻, 甘草, 大黃 <sup>23)33)35)35)35)40)41)41)43)43)43)50)55)</sup> 實 <sup>10)35)35)43)43)</sup> , 芍藥 <sup>10)35)40)41)43)43)50)</sup> , 芒硝 <sup>23)33)35)35)41)43)43)55)</sup> 白薇 <sup>10)35)40)41)43)50)</sup> , 連翹 <sup>23)33)35)35)35)41)43)55)</sup> , 枳角 <sup>43)50)</sup> , 粉草 <sup>43)</sup> , 細辛 <sup>35)</sup>	13
4	普濟消毒飲	黃芩, 黃連, 連翹, 玄參, 板藍根, 馬勃, 牛蒡子, 僵蠶, 升麻, 柴胡, 陳皮, 桔梗, 甘草, 薄荷 <sup>1)2)4)4)13)23)30)34)36)41)</sup>	10
5	紫雪丹	犀角, 羚羊角, 石膏, 寒水石, 升麻, 玄參, 甘草, 沉香, 木香 <sup>2)4)9)11)15)28)29)31)36)</sup>	9
6	除濕胃苓湯	蒼朮, 厚朴, 陳皮, 豬苓, 澤瀉, 赤茯苓, 白朮, 滑石, 防風, 梔子, 木通, 肉桂, 甘草 <sup>4)9)15)20)29)31)55)57)</sup>	8

No.	處方名	構成藥物	頻度
7	五福化毒丹	玄蔘, 桔梗, 赤茯苓, 人蔘, 龍膽草, 青黛, 芒硝, 甘草, 冰片, 硃砂, 金箔 28)28)28)29)31)31)38), 黃連 <sup>28)28)28)29)31)38)</sup>	7
8	防己散	防己, 芒硝, 犀角, 黃芩, 黃芪, 升麻 <sup>9)15)17)31)33)41)</sup> , 川芎 <sup>9)31)</sup>	6
9	藍青散	藍青, 知母, 甘草, 梔子, 黃芩, 杏仁, 柴胡, 寒水石, 石膏, 芍藥, 羚羊角 <sup>33)35)40)41)41)54)</sup> , 升麻 <sup>33)</sup> , 犀角 <sup>35)40)41)41)54)</sup>	6
10	藍葉散	藍葉, 葛根, 升麻, 生地黃, 芍藥, 川芎, 杏仁, 知母, 柴胡, 白芷, 甘草, 梔子 <sup>2)7)9)31)41)55)</sup> , 石膏 <sup>2)7)9)31)41)</sup>	6
11	化斑解毒湯	升麻, 石膏, 連翹, 牛蒡子, 人中黃, 黃連, 知母, 玄參, 竹葉 <sup>9)15)30)30)31)55)</sup>	5
12	消毒犀角飲	犀角, 防風, 甘草, 黃連 <sup>15)28)29)31)55)</sup>	5
13	消風散	生地, 當歸, 防風, 蟬蛻, 知母, 苦參, 胡麻, 荊芥, 蒼朮, 牛蒡子, 石膏, 甘草, 木通 28)28)28)33)33)	5
14	犀角解毒飲	犀角, 黃連, 金銀花, 連翹, 芍藥, 生地黃, 防風, 荊芥, 牛蒡子, 甘草 <sup>11)26)32)36)45)</sup>	5
15	大連翹飲	連翹, 石膏, 防風, 荊芥, 甘草, 滑石, 梔子, 當歸, 瞿麥, 車前子, 木通, 牛蒡子, 芍藥, 柴胡, 黃芩, 蟬蛻 <sup>15)26)28)29)31)</sup>	5

No.	處方名	構成藥物	頻度
16	犀角散	犀角, 升麻, 防己, 梔子, 芒硝, 黃芩, 黃芪, 牛黃 <sup>17)31)33)40)54)</sup>	5
17	安宮牛黃丸	牛黃, 鬱金, 犀角, 黃芩, 黃連, 梔子, 朱砂, 梅片, 麝香, 珍珠 <sup>2)4)11)29)36)</sup>	5
18	藿香正氣散	藿香, 白朮, 白芷, 桔梗 蘇葉, 陳皮, 半夏, 大腹皮, 茯苓, 厚朴, 甘草 <sup>9)28)28)33)33)</sup>	5
19	升麻膏	升麻, 大黃, 景天花, 蛇草, 梔子, 寒水石, 芒硝, 藍葉, 生地黄, 芭蕉根, 羚羊角, 梧桐皮 <sup>33)35)41)54)</sup>	4
20	升麻黃芩湯	升麻, 黃芩, 犀角, 大黃, 柴胡, 梔子, 石膏, 甘草 <sup>35)35)40)41)</sup> 葛根, 杏仁, 芍藥, 竹瀝 <sup>35)</sup> 藍葉 <sup>35)40)41)</sup>	4
21	升麻散	升麻, 黃芩, 麥門冬, 葛根, 大黃, 芒硝 <sup>33)35)41)54)</sup>	4
22	防風升麻湯	防風, 麥門冬, 木通, 梔子, 甘草, 薄荷, 升麻, <sup>2)6)33)37)</sup> 荊芥, 葛根, 玄參, 牛蒡子, 燈心 <sup>37)</sup>	4
23	犀角地黄湯	生地黄, 芍藥, 牡丹皮, 犀角, 防風, 黃芩, 甘草, 黃連, 薄荷 <sup>2)4)6)7)</sup>	4
24	消丹飲	玄參, 升麻, 麥門冬, 桔梗, 甘草 <sup>9)20)51)51)</sup>	4
25	柴胡清肝湯	柴胡, 生地黄, 當歸, 連翹, 赤芍藥, 牛蒡子, 川芎, 黃芩, 梔子, 天花粉, 防風, 甘草 <sup>15)31)</sup> <sup>34)57)</sup>	4

No.	處方名	構成藥物	頻度
26	大黃散	大黃, 防風, 升麻, 黃芩, 麻黃, 秦艽, 芒硝 <sup>35)41)54)</sup>	4
27	五香連交湯	木香, 薰陸香, 鷄舌香, 沈香, 黃芩, 升麻, 枳實, 連翹, 海藻, 射干, 麝香, 大黃, 竹瀝 <sup>33)35)41)41)</sup>	4
28	麻黃散	麻黃, 升麻, 硝石 <sup>20)33)40)41)</sup>	4
29	清瘟敗毒飲	石膏, 生地, 犀角, 黃芩, 梔子, 芍藥, 牡丹皮, 玄參, 知母, 連翹, 桔梗, 甘草, 竹葉 <sup>4)11)24)24)</sup>	4
30	防風通聖散 加減	防風, 荊芥, 連翹, 麻黃, 薄荷, 川芎, 當歸, 白芍, 白朮, 梔子, 大黃, 芒硝, 黃芩, 桔梗, 甘草, 滑石 減白朮 甘草 <sup>13)15)</sup> 減白朮 加黃栢, 牛膝, 防己 <sup>23)24)</sup>	4
31	升麻葛根湯	升麻, 葛根, 芍藥, 甘草 <sup>15)16)38)</sup>	3
32	麻黃散	麻黃, 升麻, 葛根, 射干, 鷄舌香, 甘草, 石膏 <sup>28)33)41)</sup>	3
33	葛藤滲濕湯 合 五神湯	葛解, 薏苡仁, 黃栢, 赤茯苓, 牡丹皮, 澤瀉, 滑石, 通草 合(赤茯苓), 金銀花, 牛膝, 車前子, 紫花地丁 <sup>13)29)36)</sup>	3
34	四順清涼飲	當歸, 甘草, 芍藥, 大黃 <sup>7)38)41)</sup>	3
35	犀角地黃湯 合 黃連解毒湯	生地黃, 芍藥, 牡丹皮, 犀角, 防風, 黃芩, 甘草, 黃連, 薄荷 合(黃連, 黃芩), 黃栢, 梔子 <sup>13)29)36)</sup>	3

No.	處方名	構成藥物	頻度
36	澤蘭湯	澤蘭, 川芎, 附子, 莽草, 藥本, 細辛 <sup>35)40)41)</sup>	3
37	化丹湯	獨活, 射干, 麻黃, 木香, 甘草, 石膏, 黃芩, 薄荷 <sup>29)33)55)</sup>	3
38	內托散 (紅內消散 <sup>28)</sup> )	紅內消, 當歸, 茄片, 甘草, 羌活, 黃芩, 麝香 <sup>28)38)41)</sup>	3

內服藥中 犀角消毒飲, 龍膽瀉肝湯, 漏蘆湯이 13회로 가장 높은 頻度를 나타내었으며, 3회 以上の 頻度를 나타낸 것은 모두 38種이다.

## 6. 外用藥에 對한 使用頻度

### <外用藥의 出現頻度>

#### 1) 復方

No.	處方名	構成藥物	頻度
1	升麻搨湯	升麻, 漏蘆, 芒硝, 梔子, 黃芩 <sup>23)27)33)33)41)41)</sup> 41)54)54)55) 薊蘆 <sup>33)</sup>	11
2	拔毒散	寒水石, 石膏, 黃栢, 甘草 <sup>7)7)20)28)33)41)41)41)43)50)</sup> 芭蕉汁 <sup>7)43)</sup> 黃芩 <sup>41)</sup>	10
3	如意金黃散	南星, 陳皮, 蒼朮, 黃栢, 薑黃, 甘草, 白芷, 天花粉, 厚朴, 大黃 <sup>4)9)22)24)31)34)36)47)57)</sup>	9
4	金花散	鬱金, 黃連, 黃芩, 糯米 <sup>17)28)33)33)41)41)41)48)54)</sup> 梔子, 大黃, 甘草 <sup>17)33)41)41)48)</sup>	9
5	升麻膏	升麻, 漏蘆, 芒硝, 黃芩, 連翹, 蛇銜草, 梔子, 薊蘆 <sup>7)1)35)41)41)41)54)54)55)</sup> , 白薇, 枳角 <sup>41)54)54)</sup> , 白薇, 枳實 <sup>10)27)41)55)</sup>	9
6	金黃散	連翹, 大黃, 黃芪, 黃芩, 黃栢, 鬱金, 甘草, 龍腦 <sup>2)2)13)15)24)28)36)55)</sup>	8
7	玉露散	芙蓉葉, 麻油, 菊花, 金銀花 <sup>2)2)13)29)34)34)36)</sup>	7
8	大黃搨湯	大黃, 甘草, 當歸, 川芎, 白芷, 獨活, 黃芩, 芍藥, 升麻, 沈香, 木香, 木蘭皮, 芒硝 <sup>23)33)35)40)41)58)58)</sup>	7
9	柏葉散	側柏葉, 大黃, 蚯蚓, 黃栢, 赤小豆, 輕粉 <sup>9)15) 31)31)57)</sup> 雄黃 <sup>9)31)</sup>	5
10	沖和膏	紫荊皮, 獨活, 赤芍, 白芷, 石菖蒲	3



No.	處方名	構成藥物	頻度
11	莽草膏	莽草, 當歸, 川芎, 躑躅花, 大戟, 細辛, 芍藥, 芫花, 附子 <sup>41)54)54)</sup>	3
12	黃芩湯	黃芩, 升麻, 黃連, 川芎, 大黃, 甘草, 當歸, 羚羊角 <sup>35)40)41)</sup>	3
13		大黃, 黃芩, 芒硝, 梔子, 藍葉, 商陸 <sup>33)41)54)</sup>	3
14		益母草, 蛇銜草, 愼火草 <sup>33)40)41)41)54)</sup>	5
15		車前草, 益母草, 地膽草 <sup>28)33)41)54)</sup>	4
16	冰黃散	大黃, 芒硝 <sup>7)16)20)26)29)33)33)35)38)58)59)</sup>	11
17	白玉散	滑石, 寒水石 <sup>17)26)28)29)29)33)41)53)59)</sup>	9
18		苧麻根, 赤小豆 <sup>33)33)40)41)41)54)58)</sup>	7
19		牛膝, 甘草 <sup>17)33)35)41)41)41)54)</sup>	7
20		桑白皮, 羊脂 <sup>15)17)28)33)38)41)</sup>	6
21		乳香, 羊脂 <sup>15)17)28)33)38)</sup>	5

## 2) 單方

No.	藥物	頻度
1	豆豉 <sup>11)17)23)27)27)28)28)28)33)33)33)33)35)35)35)40)41)41)41)41)41)41)</sup> 48)54)54)54)54)56)	32
2	伏龍肝 <sup>15)17)17)17)27)27)28)32)33)33)33)33)33)35)38)40)40)40)41)41)41)41)41)41)48)54)54)57)59)</sup>	29
3	赤小豆 <sup>17)20)23)26)27)27)27)27)28)35)35)35)38)40)40)40)41)41)41)41)41)41)42)53)54)54)54)57)</sup>	28
4	景天花(愼火草, 護花草) <sup>6)17)23)27)28)28)28)33)33)33)33)33)33)33)35)35)40)41)41)</sup> 41)41)41)48)54)54)54)54)54)	28
5	浮萍草 <sup>15)15)17)23)28)28)33)33)33)35)41)41)41)41)48)54)54)56)</sup>	19
6	蒴藿 <sup>17)23)23)27)28)28)33)33)33)35)40)41)41)41)48)54)54)54)</sup>	18

No.	藥 物	頻度
7	芭蕉根 <sup>15)15)17)26)28)28)32)33)33)35)40)41)41)41)54)54)57)</sup>	17
8	蚯蚓(地龍) <sup>17)23)28)28)33)33)35)37)41)46)54)54)58)58)59)</sup>	15
9	養養葉 <sup>15)27)27)28)31)34)40)41)41)41)41)41)54)54)</sup>	15
10	黃芩 <sup>15)23)28)28)33)33)41)41)41)41)48)54)58)</sup>	13
11	馬齒莧 <sup>22)23)27)29)31)33)35)40)47)54)58)58)58)</sup>	13
12	芒硝 <sup>33)33)35)41)41)41)41)41)48)54)54)54)57)</sup>	13
13	水苔 <sup>23)28)28)33)33)41)41)41)41)41)48)54)</sup>	13
14	蕎麥麵 <sup>17)23)33)35)41)41)41)46)46)54)54)56)</sup>	12
15	生地黃 <sup>23)28)28)33)33)35)41)41)41)48)54)</sup>	11
16	梔子 <sup>23)28)33)33)35)41)41)41)48)54)</sup>	10

5種以上の藥物로 構成된 處方中에서 3回以上の 頻度を 나타낸 것은 13種이며, 3-4種의 藥物로 構成된 處方中 4回以上の 頻度を 나타낸 것은 2種이며 2種의 藥物로 構成된 것 中 5回以上の 頻度を 나타낸 것은 6種이다.

單方은 10回以上の 頻度を 나타낸 것은 15種이며, 각각에서 가장 높은 頻度を 나타낸 것은 升麻搨湯과 益母草, 蛇銜草, 愼火草로 構成된 處方, 冰黃散, 豆豉이다.

#### IV. 考 察

巢等<sup>7) 8) 13) 15) 25) 28) 33) 34) 54)</sup>은 “丹者 人身體忽然撤赤如丹塗之狀 故謂之丹” 이라고 하였으며, 戴等<sup>15) 28) 33)</sup>은 “以赤故謂之丹” 이라 하여,

붉은 丹을 칠한 듯이 보인다는 뜻의 명칭으로 丹靨이라 하였다.

李<sup>28) 38)</sup>는 “丹名不一”이라 하였고 吳<sup>31)</sup>는 “丹名雖多 其理則一也”라 하여 丹毒에는 異名과 種類가 많음을 說하였다.

素問·至眞要大論에 “丹燦”라는 名이 있으며<sup>29)4)</sup> 孫<sup>27)</sup>은 “丹毒一名天火”라 하였으며, 聖濟總錄等<sup>11)29)40)41)</sup>에서는 “諸丹不同 其發無定處 俗又謂之溜”라 하였으며, 顧等<sup>15)16)17)32)</sup>은 “丹瘤”라고도 하였으며, 劉等<sup>35) 41)</sup>은 “赤流”라고도 하였다. 樓等<sup>2)4)1)7)32)53)</sup>은 “丹毒又稱 赤遊風”이라 하였고, 顧等<sup>2)4)15)29)53)</sup>은 “赤遊丹”이라 하였고, 陳等<sup>15)28)</sup>은 “赤遊丹又名火丹”, 陳<sup>51)</sup>은 “火丹者 一身盡紅也”라 하여 火丹을 丹毒으로 보았다. 또한 李<sup>37)</sup>는 “遊風丹毒 名天火 又名流火 俗謂風疔, 風疔瘡是也”라 하여 遊風, 丹毒, 流火, 風疔, 風疔瘡을 丹毒

으로 보았다.

文獻에서 많이 볼 수 있는 異名은 火丹, 赤遊丹, 赤遊風으로 丹毒과 同一한 전반적인 證狀을 나타내고 있으며, 그 외 異名에 丹腫이 있는데, 이는 丹毒의 證狀中 腫脹이 나타나는 것을 보고 丹毒을 丹腫이라 한 듯하며, 風疔, 風疔瘡도 일부분의 證狀을 보고 丹毒을 稱한 것 같다.

丹毒의 證狀에서는 色이 特徵的인데, 巢等<sup>4) 7) 11) 13) 15) 25) 27) 28) 29) 31) 33) 40) 41) 48)</sup>은 “赤如丹塗之狀”이라 하였고, 顧等<sup>15) 17) 28) 33) 34)</sup>은 丹有五色이라 하였고, 孫等<sup>28) 41)</sup>은 “不特色赤 或青 或黃 或白 或黑”이라 하여 “無定色”<sup>27) 28) 33)</sup>이라 하였다.

顧等<sup>6) 11) 15) 16) 17) 28) 32) 38) 41)</sup>은 “赤腫片片如胭脂塗染”이라 하였고, 江等<sup>11) 15)</sup>은 “紅腫光亮”하다고 하였다.

丹毒에는 乾濕의 差異가 있는데, 乾者는 色紅如雲片 上起風粟 作癢發熱하고 濕者는 色多黃白 大小不等 流水作煉多痛한다.<sup>15) 28)</sup>

其熱如火<sup>6) 15) 28) 38) 41)</sup> 發熱<sup>11) 15)</sup> 壯熱<sup>41)</sup> 熱漸引<sup>41)</sup>하며 癢痛<sup>15) 28) 33) 41) 48)</sup> 或無痛<sup>15)</sup>하기도 한다.

顧等<sup>7) 15) 28) 37) 38) 41)</sup>은 “丹毒은 遊走不定”하다고 하였는데, 馮<sup>15)</sup>은 “客風外乘 風勝則樹搖搖故令遊走殊速”하다고 하였다. 丹毒은 全身의 어느 部位에서도 發하며, 크기는 手掌大와 같다고<sup>11) 13) 15) 25) 27) 28) 31) 33) 40) 41) 54)</sup> 하였다.

重證은 疽의 형태를 나타내며<sup>13) 15) 25) 33) 54)</sup> 甚者는 “周流四體”<sup>40) 41)</sup> “遍身”<sup>11) 27) 28) 31) 33) 41) 48)</sup> 하며 “色愈紫赤, 脈亦愈堅”<sup>32)</sup> 하다. 不急治하거나 오래되면 “肌肉壞爛되고 膿血을 出한다”<sup>15) 25) 28) 33) 40) 54)</sup> 고 하였다. 馮等<sup>7) 11) 15) 17)</sup>은 “毒氣가 入腹入腎하면 不救”한다 하였으며, 竇等<sup>15) 28)</sup>은 “毒氣遂壅咽喉 必難生矣”라 하였다. 또한 巢等<sup>7) 8) 11) 15) 17) 23) 25) 28) 33) 40) 41) 48) 54)</sup>은 四肢에

서 發하며 入胸腹入腰背하면 難治 또는 死한다고 하고, 胸腹腰背에서 發하여 入四肢者는 生 또는 易治라 하였다.

丹毒의 證狀은 대부분 赤色을 띠고 或青 或黃 或白 或黑色을 띠고, 赤腫, 發熱, 癢痛하며 遊走不定, 流行甚速하며, 全身에 發하며, 손바닥 크기 임을 알 수 있고, 重證은 色愈紫赤 脈亦愈堅하며, 遊走遍身하며, 肌肉壞爛되고 膿血이 出하며, 毒氣가 四肢에서 腹으로 入하면 死한다는 것을 알 수 있었다.

原因에 대해 살펴보면, 巢等<sup>13) 15) 25) 29) 33) 36) 54)</sup>은 “風熱惡毒所爲”라 하여, “風熱毒氣 客於腠理 熱毒搏於血氣 蒸發於外 其皮上熱而赤如丹塗之狀 故謂之丹”<sup>25) 35) 54)</sup>이라 하였고, 孫等<sup>28) 41)</sup>은 “由熱毒之氣 搏於榮血而風乘之”라 하여 血熱風毒이 原因이라 하였으며, 戴等<sup>15) 28)</sup>은 “血熱肌虛 風邪所搏而發”이라 하였고, 馮<sup>15)</sup>은 “熱毒客於皮膚搏於氣血而風乘之 陰滯於陽則發丹毒”이라 하여, 風熱이 丹毒의 原因이 됨을 잘 나타내주고 있다.

內經等<sup>15) 17) 28) 39) 41)</sup>에서는 “少陽司天 客勝則丹疹外發”이라 하여, 六氣中 “火”가 原因임을 나타내었고<sup>13) 15) 17) 28) 31)</sup>, 樓等<sup>13) 17) 39) 40)</sup>은 “熱毒之氣”라 하였고, 陳<sup>51)</sup>은 “熱在皮膚 熱鬱於外而趨於內”라 하여, 熱이 原因임을 나타내었고, 張<sup>39)</sup>은 “相火의 病”, 陳<sup>48)</sup>은 “血毒”이라 하였고, 許<sup>7)</sup>는 “惡毒熱血 蘊蓄於命門 遇君相二火合起則發也”라 하여, 熱이 原因임을 알 수 있다.

陳等<sup>41) 48)</sup>은 “經云 夫諸痛癢瘡 皆屬心 心虛則癢 心實熱則痛 丹毒之病 由心實熱也. 心生血於脈 血熱則肌浮 陰滯於陽即發丹毒”이라 하였고, 陳等<sup>2) 15) 28) 31) 37)</sup>은 “心火妄動 三焦風熱乘之”하여 丹毒이 發한다고 하였으며, 馮<sup>15)</sup>은 “不出血熱而屬於心 心火內熾”라 하여, 心火가 丹毒의 原因이 됨을 알 수 있다.

李等<sup>4) 18) 35)</sup>은 濕熱이 原因이라 하였다.

丹毒은 小兒에게 多發되는데, 이에 대해, 陳 等<sup>2) 15) 29) 31) 41) 52)</sup>은 胎內之毒이 原因이라 하였으며, 孫 等<sup>4) 11) 26) 28) 36) 49)</sup>은 胎熱이 原因임을 說하고 있다.

鬚<sup>31)</sup>는 風火濕寒이 모두 丹毒의 原因이라 하여, 丹毒이 六氣에 外感되어 發病됨을 알 수 있다.

以上에서 본 바와 같이, 風熱, 火, 心火, 濕熱, 胎熱, 風火濕寒이 丹毒의 主要한 原因임을 알 수 있었다.

丹毒의 種類는 文獻을 조사해 보니 總 84種으로 나타났는데, 이 外에 名만 있고 證狀 등이 기록되지 아니한 것이 4種이 있었는데 米田丹<sup>48)</sup> 坤火丹<sup>48)</sup> 天母丹<sup>41)</sup> 馬奴火丹<sup>57)</sup> 水蛇火丹<sup>57)</sup> 등이다.

色에 의해 分類한 丹毒은 10種으로, 白色을 띠는 것은 白丹, 赤色은 赤丹, 黑色은 黑丹, 風火丹, 藍色은 藍注, 赤黑色을 띠는 것은 赤黑丹, 暴火丹이며, 또한 暴火丹은 白黑色을 나타내기도 한다. 靑黑色을 띠는 것은 石火丹, 五色을 띠는 것은 五色丹, 留火丹이며, 또한 留火丹은 赤色을 나타내기도 함을 알 수 있었다.

戴 等<sup>15) 28) 31)</sup>은 “風熱則赤, 風冷則白”이라 하였고, 劉 等<sup>35) 41)</sup>은 “因熱而得者色赤, 因風而得者色白”이라 하였다.

또한 巢<sup>25)</sup>는 “冷熱互交” 하면 赤黑色(赤黑丹)을 띠다 하였고, 巢 等<sup>23) 25) 33) 41) 54)</sup>은 “風毒之熱 有盛有衰 或冷或熱 故發五色丹”이라 하여, 丹毒은 風과 熱의 多少에 의해 色의 차이가 남을 說明하고 있다.

그래서 熱이 輕하고(이를 冷으로 說한 듯하다.) 風이 多하면 白色(白丹), 黑色(黑丹), 藍色(藍注)을 나타내고, 熱이 重하고 風이 輕하면 赤色을 나타내며, 冷熱이 相搏하면 赤黑色을 띠는 것을 알 수 있었다.

部位에 의해 區分한 丹毒은 53種이다. 頭部에 發한 丹毒은 18種이며, 上肢部에 發한 丹毒은 10

種이며, 胸腹部에 發한 丹毒은 15種이며, 腰背部에 發한 丹毒은 22種이며, 下肢部에 發한 丹毒은 21種이다. 그러므로 好發部位는 腰背, 下肢, 頭, 胸腹, 上肢 順임을 알 수 있다.

한 部位에만 發하는 丹毒은 24種으로, 頭部에만 發하는 丹毒은 天雷丹, 古竈丹, 抱頭火丹, 星子丹, 蜂子丹, 母子丹, 鬼臉火丹 等 7種이며, 上肢部에만 發하는 것은 骨火丹, 君竈丹 等 2種이다. 胸腹部에만 發하는 것은 龍火丹 1種이며, 腰背部에만 發하는 것은 鬱火丹, 茱萸火丹, 私灶丹, 竈尾丹, 住火丹, 安竈丹, 蝨纏丹 等 7種이며, 下肢部에만 發하는 丹毒은 室火丹, 癆火丹, 土虺丹, 流火, 灶丹, 母竈丹, 腿遊風 等 7種이다.

2部位에 發하는 丹毒은 14種이며, 3部位에 發하는 丹毒은 4種이며, 4部位에 發하는 丹毒은 3種이며 全身에 發하는 丹毒은 7種으로 나타났다.

以上에서 본 바와같이 部位에 의해 區別되는 丹毒의 種類는 매우 많다. 現代中醫文獻을 보면 頭部에 發하는 拘頭火丹, 腰肋部에 發하는 內發丹毒, 大腿에 發하는 腿遊風, 下腿에 發하는 腎氣遊風과 足關節에 發하는 流火로 大別한다.<sup>13) 14) 29) 30) 34)</sup>

그 外 色과 部位의 特徵으로 區別되지 않는 丹毒은 모두 21種으로, 그 中에서 丹軫은 丹毒의 일반적인 證狀을 나타내고, 火丹, 丹火, 水丹은 水疱를 형성하는 丹毒이며, 腰部에 發하는 纏腰丹도 또한 水疱를 형성한다. 赤遊丹은 丹毒의 異名으로 丹毒의 全般的인 證狀을 나타내지만, 특히 小兒의 丹毒證을 일컫는다. 胎瘤, 胎驚丹毒, 滯熱丹毒도 小兒에 특히 나타나는 丹毒이다.

風瘙隱疹은 遍身癢甚<sup>17)</sup>하여 不痛<sup>23)</sup>하는데, 王 等<sup>15)28)33)</sup>은 “痛者爲丹 癢者爲風丹”이라 하여, 痛症은 輕微하고 癢이 甚한 것을 風丹으로 본 것 같은데 이는 丹毒보다는 隱疹에 屬하는 疾患으로 볼 수 있다.

身有赤處는 皮膚色이 赤色으로 되는 證狀을 나타내는데, 丹毒의 일부분의 證狀만을 나타내므로 丹毒이라기 보다는 丹毒과 類似한 疾患으로 볼 수 있다.

馮等<sup>15)</sup>은 火灼瘡를 丹毒門에 說하고 있으나, 이는 丹毒과는 다른 疾患으로 證狀이 天疱瘡<sup>9)</sup>과 유사하다. 紅絲瘡은 丹毒의 赤色面이 手掌大, 雲片과 같은 것과는 달리 하나의 紅線이 나타나는 것으로, 經에 丹毒이라 하였지만<sup>17)</sup> 丹毒과는 다른 疾患으로 보여진다.

大頭瘟은 溫疫의 한가지로, 頭痛이甚하고 머리가 몹시 붓기 때문에 이와같이 命名하였다.<sup>2)</sup> 許<sup>2)</sup> 7)는 “大頭瘟은 봄, 여름, 가을, 겨울에 맞지 않는 기후로 인하여 돌아다니는 溫疫의 氣運에 감염된 것이다. 그 證狀은 곪아터지고 고름이 흘러서 다른 사람에게 까지 傳染되므로 溫疫이라고 한다”고 하였는데, 楊<sup>29)</sup> 등은 抱頭火丹의 重者를 大頭瘟이라 하였으나, 이는 時毒에 의한 疾患으로 丹毒과는 다르다고 하겠다.

新生兒丹毒의 原因中에 臍炎, 尿布皮炎, 虫咬, 濕疹 등에 의해 皮膚가 損傷되었는데 風熱邪毒이 침범하면 丹毒을 일으킨다고 하였는데<sup>24)45)</sup> 瘡癤는 이런 原因으로 發한 丹毒을 말한다고 볼 수 있다.

胎驚丹毒은 孕母가 受驚하여 伏熱在內하여 發한 것이요, 滯熱丹毒은 嬰兒가 乳食이 過多하여 不能運化하여 蘊熱於內하여 發한 丹毒이라 하였는데, 이는 丹毒의 初起 證狀 中에서 胃納不香<sup>13)36)</sup>의 消化器 症狀이 나타나는 것을 보고, 原因을 食滯로 한 것 같으나, 滯熱丹毒은 消化器 證狀이 主證으로 나타나는 丹毒으로 原因은 風熱이라 할 수 있겠다. 赤白遊腫은 丹毒 證狀중 赤腫의 證狀을 特徵으로 命名된 것 같다.

小兒赤遊丹에 대해 살펴보면, 陳<sup>33)</sup>은 “小兒赤遊丹 乃受毒於未生前 發病於有生後 蓋身在胞胎 皆

賴父精母血籍以生養 父母不能節其慾 多致淫火猖熾 胎必侵受 既生之後 熱湯洗浴 烘熯衣物 觸動內毒”이라 하여, 淫火侵胎하여 胎熱이 伏한 中에 태어난 後 熱湯으로 洗浴을 하거나 烘熯衣로 말미암아 內毒을 觸動하여 赤遊丹이 發한다고 하였다. 寶<sup>28)</sup>는 “皆母胎中受蘊熱 或母懷胎之時 好食辛辣毒物 沐浴熱湯 冬天炭火以致熱氣入胎 嗜慾無度 或生下火烘衣裳或火烘床褥 以致熱毒內外交攻 半歲上下無 有不發者”라 하여 胎熱毒이 原因이 됨을 說하고 있다. 또 小兒衛生總微論<sup>23)</sup>에서는 “乳母受食燒炙飲酒皆令兒病丹”이라 하였다.

以上에서 본 바와 같이, 小兒赤遊丹은 胎毒, 胎熱에 의해 發하는데, 母의 懷孕時의 飲食, 起居의 節制가 重要함을 알 수 있었다.

纏腰丹은 纏蛇丹<sup>41)53)</sup>, 蛇盤要<sup>46)</sup>, 蛇串瘡<sup>19)22)29)31)44)58)</sup> 등 異名이 많다. 原因은 肝火妄動<sup>3)15)24)31)33)</sup>, 肝氣鬱結<sup>36)</sup>, 肝膽濕熱<sup>3)29)34)</sup>, 脾虛濕盛<sup>4)36)</sup> 心肝二經火邪 濕毒凝結而成<sup>44)58)</sup> 하는 것으로, 濕·熱이 心肝膽脾에 作用하여 發하는 것이다.

纏腰丹은 帶狀疱疹<sup>4)12)30)46)53)</sup>으로 帶狀疱疹은 水痘, 帶狀疱疹 virus에 의한 感染症이다.<sup>60)</sup> 纏腰丹은 丹毒이지만<sup>37)</sup> 現代醫學上으로는 丹毒이 β 溶血性 A連鎖球菌에 의한 細菌性 疾病이므로, 原因이 다르기 때문에 다른 疾病이라 하겠다.

聖惠方等<sup>41)54)</sup>에는 丹毒門에 標瘡이 나오는데, 水疱와 瘡을 형성하고 脇下에서 出하는 것으로, 水丹, 纏腰丹과 類似하다고 생각된다.

劉<sup>35)</sup>는 “眼卒然赤腫 生翳: 至有十數翳者”를 眼丹이라 했는데, 이는 丹毒의 感染이 眼 주위에 생기면 眼瞼의 浮腫이 아주 甚해져서 눈을 뜰 수 없게 되는데<sup>5)</sup>, 이를 眼丹이라 한 것이라고 생각된다.

그러므로 文獻을 통해 조사한 丹毒의 總種類는 79種이다.

丹毒의 治療는 針으로 瀉血시키는 방법과, 內

服藥, 外用藥이 사용되었는데 內服藥보다 外用藥이 더 많이 기록되고 있고, 單方의 種類가 많았다.

內服藥의 頻度を 보면 犀角消毒飲, 龍膽瀉肝湯, 漏蘆湯이 13회로 가장 높은 頻度を 나타내었으며, 普濟消毒飲이 10회, 紫雪丹이 9회, 除濕胃苓湯이 8회, 五福化毒丹이 7회, 防己散, 藍靑散, 藍葉散이 6회, 化斑解毒湯, 消毒犀角飲, 消風散, 犀角解毒飲, 大連翹飲, 犀角散, 安宮牛黃丸, 藿香正氣散이 5회로 나타났다.

外用藥의 出現頻度を 보면, 升麻搨湯이 11회로 가장 높은 頻度を 나타냈으며, 拔毒散이 10회, 如意金黃散, 金花散, 升麻苻가 9회, 金黃散이 8회, 玉露散, 大黃搨湯이 7회, 柏葉散이 5회를 나타내었고, 3種의 藥物로 구성된 處方中 芫蔚草, 蛇銜草, 愼花草로 구성된 處方이 5회로 가장 높은 頻度を 나타내었고, 2種의 藥物로 構成된 것은 冰黃散이 11회로 가장 높은 頻度を 나타내었고, 白玉散이 9회를 나타내었다.

單方은 種類가 200여 가지 정도 되는 중에서, 豆豉가 32회로 가장 높은 頻度を 나타내었고, 伏龍肝이 29회, 赤小豆, 景天花가 28회, 浮平草가 19회, 薊藜가 18회, 芭蕉根이 17회, 蚯蚓, 萎薑葉이 15회의 頻度を 나타내었다.

## V. 結 論

丹毒에 대해 文獻을 調査하여 整理, 總括, 考察하였던 바, 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 丹毒은 天火, 火丹, 赤遊風, 赤遊丹, 赤瘤 등의 異名이 多現하였다.

2. 證狀은 紅·腫·熱·痛·遊走不定하며 四肢에서 發하여 入腹臟하면 死한다.

3. 原因은 風熱, 火, 心火, 濕熱, 胎毒(胎熱), 風火濕寒이다.

4. 丹毒은 總 79種으로 色에 의해 10種으로 分類되었으며, 部位에 의해 53種으로 區分되었고, 그외 16種이 있었다.

5. 風瘙癢疹(風丹), 身有赤處, 火灼瘡, 紅絲瘡, 大頭瘟은 丹毒과 다른 疾病이다.

6. 纏腰丹은 帶狀疱疹으로 丹毒에서 분리시켜야 한다.

7. 內服藥은 犀角消毒飲이 가장 有效한 方劑로 나타났으며, 外用藥은 升麻搨湯, 單方으로는 豆豉가 가장 有效한 것으로 나타났다.

## 參 考 文 獻

1. 金永勳 : 晴崗醫鑑, 서울, 成輔社, pp.361-363, 1984.
2. 손병권·진홍룡·윤규범 : 東醫外科學, 서울, 여강출판사, pp.374-377, 378-379, 1992.
3. 申天浩 : 千家妙方, 서울, 成輔社, pp.357-358, 434-435, 1992.
4. 李鳳教 : 症狀鑑別治療, 서울, 成輔社, pp.661-662, 750-751, 779-780, 1991.
5. 李文鎬外 : 內科學, 서울, 金剛出版社, p.506, 1979.
6. 丁茶山 : 丁茶山小兒科秘方, 서울, 杏林出版社, pp.42-43, 1976.
7. 許 浚 : 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, p.286, 527, 653, 1981.
8. 黃道淵 : 醫宗損益, 서울, 醫藥社, pp.280-281, 1973.
9. 蔡炳允 : 漢方外科學·皮膚科學, 서울, 慶熙大學校·韓醫科大學, 皮膚科學, pp.40-41, 58-64, p.116, pp.121-122, p.130, 135, 138, 146, 151, 153, 158, 170, pp.173-174, p.188, 192, 219.

10. 葛 洪：肘後備急方，北京，人民衛生出版社，p.94, pp.96-98.
11. 江育仁：中醫兒科學，北京，人民衛生出版社，pp.314-318, 1991.
12. 高鏡朗：古代兒科疾病新論，上海，上海科學技術出版社，pp.75-76, 1983.
13. 顧伯康：中醫外科學，서울，一中社，pp.66-67, 1990.
14. 顧伯華：實用中醫外科學，上海，上海科學技術出版社，pp.426-428, 1985.
15. 顧世澄：瘍醫大全，北京，人民衛生出版社，p.771, 841, 949, pp.982-983, 1130-1136, 1987.
16. 龔廷賢：萬病回春，台北，大中國圖書公司，上冊，pp.184-185, 下冊，p.154, 1982.
17. 樓全善：醫學綱目，臺南，北一出版社，(II)卷20, pp.1-4, (III)卷37, pp.17-21, 1973.
18. 董建華：中國現代名中醫醫案精華，北京，北京出版社，卷1, pp.507-510, 卷2, p.931, pp.1089-1091, 卷3, pp.1570-1572, p.1692, 1857, 1904, 1990.
19. 潘文昭·玉振熹：奇難雜症效方精造，廣西，廣西科學技術出版社，pp.59-61, 1990.
20. 傅景華：古代驗方大全，中醫古籍出版社，pp.803-804, 1990.
21. 傅青主：傅青主男女科，力行書局有限公司，p.30, 109.
22. 北京中醫學院·北京中醫學校：漢醫學臨床病理，서울，成輔社，pp.496-497, 558-560, 1983.
23. 著者未詳：小兒衛生總微論方，北京，人民衛生出版社，pp.586-592, 1990.
24. 上海中醫學院：中醫兒科學，香港，商務印書館，pp.280-283, 1981.
25. 巢元方：諸病源候論，台中，昭人出版社，卷31, pp.6-9, 卷49, pp.1-9.
26. 簫正安：中醫兒科學，四川省，四川科學技術出版社，pp.53-54, 1991.
27. 孫思邈：備急千金要方，서울，大星文化社，pp.403-404, 1984.
28. 孫慶元：瘍科會粹，北京，人民衛生出版社，p.494, pp.514-516, 654-655, 661-663, 719-725, 814-819, 1987.
29. 楊思澍·張樹生·傅景華：中醫臨床大全，北京，北京科學技術出版社，pp.749-750, 903-905, 1991.
30. 楊蘊祥·劉翠榮編：古今名方，河南省，科學技術出版社，p.52, 54, 105, 520, 524, 558, 779, 785, 1983.
31. 吳謙：醫宗金鑑，北京，人民衛生出版社，p.62, pp.65-66, 71-72, 166-167, p.189, 193, 206, pp.245-246, 315-316, 333-334, 393-394, 441-443, 446-449, 1981.
32. 吳克潛：吳氏兒科學，臺北，新文豐出版公司，pp.50-53, 1977.
33. 王肯堂：六科準繩，臺北，新文豐出版公司，四冊，p.258, 304, pp.359-364, 1979.
34. 原安徽中醫學院：中醫臨床手冊，서울，成輔社，pp.235-236, 318-320, 331-332, p.353, pp.362-364, 1978.
35. 劉 昉：幼幼新書，北京，人民衛生出版社，pp.1397-1436, 1987.
36. 劉鵬舉·孫校·夏洪生：中醫臨證指南，吉林，科學技術出版社，pp.611-613, 355-356, 309-310.
37. 李遜齊：增輯驗方新編，上海，上海啓新書局，p.507, 513, pp.526-528, 1986.
38. 李 梈：醫學入門，서울，翰成社，p.433, 1982.
39. 張子和：儒門事親，台北，旋風出版社，卷1, p.24, 卷5, pp.15-21, 卷12, p.9, 40, 45, 1978.
40. 趙 佶：聖濟總錄，北京，人民衛生出版社，下冊，pp.2289-2291, 2952-2957, 1987.
41. 朱橚等：普濟方，北京，人民衛生出版社，第7冊，

- pp.228-239, 第9冊, pp.1339- 1347, 1364-1392, 1983.
42. 朱 佐：類編朱氏集驗醫方，北京，人民衛生出版社，pp.168-169, 1983.
  43. 朱震亨：丹溪心法附餘，서울，大星文化社，下冊，p.457, 563, 568, pp.571-572, 1982.
  44. 周天心：中醫兒科證治，廣東，廣東科學技術出版社，pp.202-203, 1990.
  45. 周天心：兒科病的中醫治療，甘肅，科學技術出版社，pp.64-66, 1990.
  46. 周洪範：中國秘方全書，北京，科學技術文獻出版社，p.572, 583, 1989.
  47. 陳貴廷·楊思澍：實用中西醫結合診斷治療學，서울，一中社，pp.1202-1203, 1992.
  48. 陳無擇：陳無擇三因方，台聯，國風出版社，卷16, pp.2-4, 1978.
  49. 秦伯未：實用中醫學，臺北，新文豐出版公司，p.3, pp.618-620, 1977.
  50. 陳師文：太平惠民和劑局方，台北，旋風出版社，p.229, 226.
  51. 陳士鐸：辨證錄，北京，人民衛生出版社，pp.609-612, 1989.
  52. 陳修園：陳修園醫書七十二種，臺北，文光圖書有限公司，下冊，p.2029, 1981.
  53. 鄒馥馨：小兒常見病外治偏方驗方，江西，江西科學技術出版社，pp.125-128, 130- 132, 1991.
  54. 太宗命撰：太平聖惠方，서울；翰成社，四卷，pp.1988-1992, 五卷 pp.2919-2933, 1980.
  55. 彭懷仁：中華名醫方劑大全，金盾出版社，p.36,135,139,142,167,171,209,371,397, 406,503, pp.550-551, p.552,557,680,712,718,735,743,748.
  56. 偏方大全編馮組編著：偏方大全，北京，科學技術出版社，pp.358-362, 1987.
  57. 鮑相璈：驗方新編，北京，人民衛生出版社，下冊，pp.172-173, p.174,178, pp.209- 211, 220-221, 1990.
  58. 胡國臣：新編偏方秘方匯海，中國古籍出版社，pp.410-412, 429-434, 809-810.
  59. 黃宗助：常見病中草藥外治療法，福建，科學技術出版社，pp.72-73, 89-90, 1988.
  60. 西山茂夫：圖解皮膚科學，서울，第一醫學社，p.250,263, 1991.