

孕胎時 胎兒의 性鑑別에 對한 文獻的 考察

朴美淳 · 柳同烈*

I. 緒 論

우리나라는 傳統的으로 儒敎를 바탕으로 하여 오랫동안 農耕社會를 維持해온 東洋 文化圈속의 한 나라로서 有用한 勞動 人力의 確保와 자식에의 老後依託, 代를 이어 祭儀를 修行할 사람이 必要하다는 認識 하에 뿌리 깊은 男尊女卑 思想을 이어 왔다. 이러한 男兒善好思想은 더우기 超音波나 羊水檢査法 등 現代 醫學의 發達로 쉽게 胎兒의 性別 區分이 可能해 짐에 따라 孕胎중 胎兒의 性別을 鑑別하여 女兒일 경우 많은 사람이 人工中絶을 하게 함으로써 이제 男女性比의 不均衡이라는 심각한 社會問題를 發生시키는 要因이 되기도 하였다. 時代의 變化로 인하여 이러한 極端的인 男兒善好思想은 많이 줄어들기는 하였으나 아직까지도 孕胎한 胎兒의 性別에 各별한 關心을 가지는 것이 우리의 社會的 現實이다. 胎兒의 男女 區分에 대한 지대한 關心은 文獻上으로도 쉽게 찾아볼 수 있으니 男兒를 孕胎하는 법이나 轉女爲男法, 또 胎兒의 男女 性別을 區別하는 法 등에 對한 많은 記錄이 있다.

妊娠을 하게 되면 母體內外로 여러가지 變化가 出現하게 되는데 그 證候들을 자세히 觀察하면 胎兒의 性別을 鑑別하는데 有用한 정보를 얻을 수 있으니 脈象이나 腹形, 乳房의 核, 胎動, 孕婦의 行動을 관찰하는 것이 그것이다.

이 중 脈에 의한 鑑別法은 가장 一般的으로 使用되는 方法으로서 王¹⁾은 “婦人妊娠四月 欲知男女法 左疾爲男 右疾爲女 俱

疾爲生二子”라 하였고, 陳⁶⁾은 “妊娠 其脈三部俱滑大而疾 在左卽男 在右卽女. 左手尺脈浮洪者爲男胎也 右手尺部浮洪者爲女胎也”라 하였으며 孫³⁾張⁴⁾등 後世의 醫家들 대부분이 王¹⁾의 견해를 따라 左男右女說을 기본으로 하였으니 左脈이 빠르면 男兒이고 右脈이 빠르면 女兒로 判定하는 것이다. 乳房으로 男女를 區分하는 法으로는 乳房의 核의 位置로 男女를 區分하는 方法과 乳頭의 色이 짙은 정도로 男女를 辨別하는 方法이 있다. 그 외 胎兒의 性別을 區分하는 方法으로 迴首辨男女法, 腹形辨男女法, 胎動辨男女法, 八卦辨男女法, 臍辨男女法, 抱兒辨男女法, 羊水檢査法, 超音波檢査法 등이 있다.

以上の 胎兒의 男女 性鑑別에 대하여 그 文獻的 資料를 收集考察함으로써 若干의 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 調查資料 및 研究方法

1) 調查資料

王叔和의 《脈經》과 《脈訣》등의 脈學書와 婦人科 書籍 20餘種의 문헌 中에서 妊娠時 胎兒의 男女區別法에 對한 記錄을 拔萃 이를 調查對象으로 삼았다.

2) 研究方法

諸文獻 中 各家의 妊娠辨男女法에 대한 文獻別記錄을 拔萃 研究하였으되, 胎兒의 男女 性別을 決定짓는 要因이나 性別決定에 影響을 주어 性を 選別하여 낳도록 하는 方法 등에 對한 記錄은 排除하였다. 여

* 大田大學校 韓醫科大學 婦人科學教室

기에서는 순수하게 이미 孕胎되어 性分化가 이루어진 胎兒를 外觀上 鑑別하는 方法들에 對한 記錄만을 모아, 過去 醫療機器가 없던 시절 어떠한 直觀으로 胎兒의 性別을 推測해 내었는지 考察해보는데 意義를 두었으며, 諸方法들 중 重複言及되고 있는 부분들을 方法別로 分類하여 比較考察하였다.

III. 本論

1. 《脈經》¹⁾

婦人이 妊娠 四個月에 男女의 여부를 알려면 좌측맥이 疾한 것은 男兒이고 우측맥이 疾한 것은 女兒이며 모두 疾한 것은 쌍둥이다. 또한 太陰脈이 나타나면 男兒이고 太陽脈이 나타나면 女兒이고 太陰脈은 沈하고 太陽脈은 浮한 것이다. 좌측의 脈이 沈實하면 男兒이고 우측의 脈이 浮大하면 女兒이며 좌우가 모두 沈實하면 두 男兒를 낳고 좌우가 모두 浮大하면 두 女兒를 낳는다. 尺脈에서 좌측만 大하면 男兒이고 우측만 大하면 女兒이며 좌우가 모두 大하면 쌍둥이를 낳으며 大한 것은 實한 맥과 같은 것이다. 좌우의 尺脈이 모두 浮하면 두 男兒를 낳고 그렇지 않으면 女兒가 男兒로 되는 것이다. 左右의 尺脈이 모두 沈한 것은 두 女兒를 낳고 그렇지 않으면 男兒가 女兒로 되는 것이다. 妊娠婦를 남쪽으로 향해 걷게 하고 그를 불러서 답할때 머리가 좌측으로 돌면 男兒이고 우측으로 돌면 女兒이다. 변소에서 남편이 뒤에서 갑자기 불렀을때 머리를 좌측으로 돌리면 男兒이고 우측으로 돌리면 女兒이다. 부인이 임신되고 그의 남편의 左側의 유방에 核이 있으면 男兒이고 右側의 유방에 核이 있으면 女兒이다.²⁾

婦人妊娠四月 欲知男女法 左疾爲男 右疾爲女 俱疾爲生二子

又法得太陰脈爲男 得太陽脈爲女 太陰脈

沈 太陽脈浮.

又法左手沈實爲男 右手浮大爲女 左右手俱沈實 猥生二男 左右手俱浮大 猥生二女.

又法尺脈左偏大爲男 右偏大爲女 左右俱大產二子 大者如實狀.

又法左右尺俱浮 爲產二男 不爾則女作男生 左右尺俱沈 爲產二女 不爾則男作女生也.

又法遺妊娠人面南行 還復呼之 左廻首者是男 右廻首者是女也.

又法看上圍時 夫從後急呼之 左廻首是男 右廻首是女也.

又法婦人妊娠 其夫左乳房有核是男 右乳房有核是女也¹⁾.

2. 《脈訣》²⁾

左疾爲男右爲女 流利相通速來去 兩手關脈大相應 已形亦在前通語.

左脈帶縱兩個男 右手帶橫一雙女 左手脈逆生三男 右手脈順還三女 寸關尺部皆相應 一男一女分形證.

3. 《備急千金要方》³⁾

妊娠四月 欲知男女法 左疾爲男 右疾爲女 左右俱疾爲產二子.

又法左手沈實爲男 右手浮大爲女 左右手俱沈實 猥生二男 俱浮大 猥生二女.

尺脈若左偏大爲男 右偏大爲女 手尺中沈細者女 若來而斷絕者 月水不利.

又法左右尺俱浮 爲產二男 不然女作男生 俱沈爲產二女 不爾男作女生.

又法得太陰脈爲男 得太陽脈爲女 太陰脈沈 太陽脈浮.

又遺妊娠人面南行 還復呼之 左廻首者是男 右廻首者是女.

又看上圍時 夫從後急呼之 左廻首是男 右廻首是女.

又婦人妊娠 其夫左乳房有核是男 右乳房有核是女.

4. 《景岳全書》⁴⁾

胎有男女即成有遲速，體有陰陽即懷有向背。男動在三月，陽性早也，女動在五月，陰性遲也。女胎背母而懷故母之腹軟，男胎面母而懷故母之腹硬，此皆得理之談，所當察也。

5. 《東醫寶鑑》⁵⁾²²⁾

婦人이 胎를 가졌는데 손으로 어루 만져보아 술잔을 엮어 놓은 것 같으면 남자요 팔목을 만지는 것처럼 參差不齊 한 것은 女子다.《脈經》

左유방에 核이 있으면 남자요 右유방에 核이 있으면 여자다.《醫鑑》

孕婦로 하여금 南쪽으로 향하여 가게 하고 문득 불러서 왼쪽으로 머리를 돌려서 보면 男이요 오른쪽으로 돌아보면 女이다. 孕婦가 便所에 들어갈 때 남편되는 사람이 뒤에서 급히 불러서 왼쪽으로 돌아보면 男이요 오른쪽으로 돌아보면 女이다. 대개 男胎는 왼쪽에 있으니 왼쪽이 무거운 고로 머리를 돌릴때에 무거운 곳을 삼가 護衛하기 때문에 왼쪽으로 돌리는 것이요 女胎는 오른쪽에 있으니 오른쪽이 무거운 고로 역시 머리를 돌릴 때에 무거운 곳을 삼가 護衛하기 때문에 오른쪽으로 돌리는 것이다.

脈을 推測하여 보아도 뜻이 또한 그러하니 왼쪽에 있으면 血氣가 胎를 保護하여 왼쪽이 盛한 故로 脈도 또한 그러하니 왼쪽에 있으면 血氣가 胎를 保護하여 왼쪽이 盛한 고로 맥도 또한 따라서 왼쪽이 빠르고 男이 되는 것이니 左脈이 큰것이 卽 그것이요 오른쪽이 女가 되는 것도亦是 이와 같은 것이어서 陰陽의 이치가 자연히 그렇게 된다.

婦人의 妊娠 四月에 男女를 알고자 한다면 왼쪽이 빠르면 男이요 오른쪽이 빠르면 女이며 左右가 다 빠르면 雙童을 낳는 것이니 다 같이 滑하고 빠르다는 것이

다. 尺脈이 왼쪽이 편벽하게 크면 男이 되고 오른쪽이 편벽하게 크면 女가 되고 左右가 다 크면 雙童을 낳는다.

左手脈이 沈하고 實하면 男이요 右手脈이 浮하고 大하면 女이며 左右手의 脈이 다 같이 沈實하면 二男을 낳고 다 같이 浮大하면 二女를 낳는다. 男女의 區別을 左右로써 取하는데 左가 疾하면 男이 되고 右가 疾하면 女가 되는데 沈實한 것은 左에 있고 浮大한 것은 右에 있으니 右女와 左男을 이로써 豫知할 수 있다²²⁾.

婦人有妊，令人摸之，如覆盃者卽男兒也，如肘頸參差起者女也.《脈經》

婦人有妊，左乳房有核是男，右乳房有核是女也.《醫鑑》

遺妊婦面南行還復呼之，左面首者是男，右回首者是女.

看妊婦上圍時，夫從後急呼之，左回首者是男，右回首者是女，蓋男胎在左，卽左重故回首時慎護重處而就左也，女胎在右卽，右重故回首時，慎護重處而就右也.

推之於脈，其義亦然，胎在左則，血氣護胎而盛於左，故脈亦從之而，左疾爲男，左大爲男也，胎在右則，血氣護胎而盛於右，故脈亦從之而右疾爲女，右大爲女也，陰盛之理，自然如是也.《脈經》

婦人妊娠四月，欲知男女法，左疾爲男，右疾爲女，俱疾爲生二子，爲俱滑而疾也. 尺脈左偏大爲男，右偏大爲女，左右俱大產二子，左手沈實爲男，右手浮大爲女，左右手俱沈實，猥生二男，左右手具浮大，猥生二女.《脈經》

男女之別，以左右取，左疾爲男，右疾爲女，沈實在左，浮大在右，右女左男，可以預剖.《脈訣》⁵⁾

6. 《婦人良方大全》⁶⁾

王子亨云 若妊娠 其脈三部俱滑大而疾在左卽男 在右卽女.

左手尺脈浮洪者爲男胎也 右手尺部浮洪

者爲女胎也 兩手尺部俱洪者爲兩男 俱沈實者爲兩女。

左疾爲男右爲女 流利相通速來去 兩手關脈大相應 已形亦在前通語。

左手脈疾爲懷男 右手脈疾爲懷女 及兩脈流行滑利相通 疾速來去 是或兩手關脈洪大相應 是其胎已有形狀也。

左脈帶縱兩個男；縱者 夫行乘妻 水行乘火 金行乘木 卽鬼賊脈也。名曰縱見 在左手卽懷兩個男兒也。

右手帶橫一雙女；橫者妻乘夫也 是火行乘水 木行乘金 卽所勝脈也。名曰橫 見於右手卽懷一雙女兒也。

左手脈逆生三男；逆者子乘母也 是水行乘金 火行乘木 卽已生脈也 名曰逆 見於左手卽懷三個男兒也。

右手脈順還三女；順者母乘子也 是金行乘手 木行乘火 卽生已之脈也 名曰順 見於右手卽懷三個女兒也。

寸關尺部皆相應 一男一女分形證；寸關尺部 脈大小遲疾相應者 是懷一男一女形證之脈也 謂關前爲陽關後爲陰 陰陽脈相應故懷一男一女也。

左手太陽浮大男；左手寸口爲太陽 其脈浮大卽是懷男子。

右手太陰沈細女；右手寸口爲太陰 其脈沈細是懷女脈也。

諸陽爲男諸陰女 指下分明長記取；諸陽脈皆爲男 卽爲大疾數滑實之類也 當懷男子 諸陰脈三 卽沈細之類是也 當懷女子。

7. 《女科經綸》⁷⁾

辨男女以左右之脈

王叔化曰；婦人妊娠四月，欲知男女法，左疾爲男，右疾爲女，俱疾爲生二子。又曰；左脈尺內偏大爲男，右尺內偏大爲女，左右俱大產二子。大者 如實狀也。卽陰搏陽別之義 尺脈實大 如寸脈殊別。但分男左女右也。又曰；左脈沈實爲男 右脈浮大爲女。

辨男女以左右陰陽虛實論

張景岳曰；以左右分陰陽 卽左爲陽 右爲陰；以尺寸分陰陽 卽寸爲陽 尺爲陰；以脈體分陰陽 卽鼓搏沈實爲陽 虛弱浮澁爲陰。諸陽實者爲男 諸陰虛者爲女 庶爲一定之論。

辨男女以左右氣血論

婁全善曰；按丹溪云 男受胎在左子宮 女受胎在右子宮 推之于脈 其義亦然。如胎在左 則氣血護胎而盛于左 故脈亦從之而左疾爲男 左大爲男也；胎在右則氣血護胎而盛于右 故脈亦從之而右疾爲女 右大爲女也。亦攷經云；陰搏陽別 謂之有子。言受胎處臍腹之下 氣血護胎而盛于下 故陰之尺脈鼓搏有力 與陽之寸脈殊別也。

辨男女以左右之疾勝

潘碩甫曰；《學要》云男女之別 以左右取 左疾爲男 右疾爲女 沈實在左 浮大在右 左男右女 可以預剖。蓋左脈疾勝于右是爲男 胎以男屬陽居左 胎氣重于陽 故左勝 右脈疾勝于左 是爲女 胎以女屬陰居右 胎氣重于陰故右勝也。又更視其腹如箕爲女胎 腹如釜爲男胎。蓋男女胎于胞中 女面母腹 卽足膝低腹 下大上小 故如箕。男面背母 卽背脊抵腹 其形正員故如釜也。又胎有男女 卽或有遲速；男動在三月 陽性早也 女動在五月 陰性遲也。

8. 《醫宗金鑑》⁸⁾

上小下大女腹箕 中正圓高男腹釜 左疾爲女 右疾男 胎氣動於陰陽主。

；上小下大如箕形 蓋以女胎面向母腹 其足膝抵腹故有是形也。中正圓高如釜之形 蓋以男胎面向母背 則背脊抵腹故有是形也。右手屬陰脈疾爲女 左手屬陽脈疾爲男 是胎氣鍾於陰 則右盛主女 鍾於陽則左盛主男也。

9. 《醫學心悟》⁹⁾

經謂“婦人有妊者 身有病而無邪脈也” 有病謂經閉 無邪脈謂脈息如常不斷絕也。

經又云“手少陰脈動甚者 妊者也” 少陰心也 心主血脈 心脈旺則血旺而爲妊子之兆。

經又云“陰搏陽別謂之有子”言二尺脈旺 與兩寸迴別 亦爲有妊。

以上三者 但得其一 卽爲妊脈 分而言之 合而推之 而妊脈無遁情矣。

或謂流利雀啄 亦爲妊脈 何也？答曰 流利者 血正旺 雀啄者 經脈閉塞不行 故脈疾而數至 此數月之胎也 不知者 斷爲病脈而令人恥笑。

或謂妊有男女 何以脈而知之也 答曰 左寸爲太陽 脈浮大 知爲男也 右寸爲太陰 脈沈實 知爲女也 若兩寸皆浮大 主生二男 兩寸皆沈實 主生二女 凡妊脈 賢緊滑利爲順 沈細微弱爲逆也。

10. 《女科輯要》¹⁰⁾

王叔和曰 妊娠四月 其脈 左疾爲男 右疾爲女 俱疾爲生二子。又曰 左尺偏大爲男 右尺偏大爲女 左右俱大產二子 大者如實狀卽陰搏之意。尺脈實大與寸脈迴別 但分男女左右也。又曰尺脈沈實爲男 右脈浮大爲女。

丹溪云 男受胎在左子宮 女受胎在右子宮 推之於脈 其義亦然 如胎在左 則氣血護胎必盛於左 故脈左疾爲男 左大爲男也 胎在右 則氣血護胎必盛於右 故脈右疾爲女 右大爲女也。

千金云 令妊婦面南行 從背後呼之 左迴首者是男 右迴首者是女 又女腹如箕 以女胎背母 足膝抵腹 下大上小 故如箕 男腹如釜 男胎向母 背脊抵腹 其形正圓 故如釜也。

受胎時偏左成男 氣血聚于左則左重 故呼之則左顛便 脈必形於左尺 受胎時偏右成女 氣血聚於右則右重 呼之則右顛便 脈必形於右尺 此一定之理也。至若丹溪男受胎於左子宮 女受胎於右子宮 此是語病 猶言偏於子宮之左 偏於子宮之右耳 原非有二子宮也。惟左男右女 指醫人之左右手言 恐未必然。

11. 《胎產心法》¹¹⁾

凡懷男妊 動在三月 陽性早也 婦臍必突 按之頗實 兩乳甚黑 男面背母而懷 背脊抵

腹 其形圓如釜 母腹故硬 女妊動在五月 陰性遲也 婦臍軟 乳頭雖黑不甚 女面母腹而懷 族膝抵腹 下大上小 其形如箕。又法 令妊婦抱未生齒兒女 是男妊 則所抱女兒瀉青糞 若男妊抱男兒 女妊抱女兒 則無恙……丹溪以左大順男 右大順女 爲醫人左右手豈非智者之一失歟 但丹溪治產精微 恐無此失大約以此診男女之病而分順逆 原非診別男女也。

12. 《六科準繩》¹²⁾

婦人妊娠四月 欲知男女法 左疾爲男 右疾爲女 俱疾爲生二子；王子亨云 妊娠三月 俱滑而疾 在左爲男 在右爲女。

遺妊娠人面南行 還復呼之 左迴首者是男 右迴首者是女 看上圍時 夫從後急呼之 左迴首是男 右迴首者是女也 婁全善云按丹溪云 男受胎在左子宮 女受胎在右子宮 斯言大契是設也 蓋男胎在左則左重故迴首時慎護重處而就左也 女胎在右則右重故迴首時慎護重處而就右也 推之於脈 其義亦然。胎在左則 血氣護胎而盛於左 故脈亦從之而左疾爲男 左大爲男也 胎在右則血氣護胎而盛於右 故脈亦從之而右疾爲女 右大爲女也 亦猶經云陰搏陽別謂之有子 言受胎處在臍腹之下 則血氣護胎而盛於下 故陰之尺脈鼓搏有力而與陽之寸脈殊別也。

左疾爲男右爲女 流利相通速來去 兩手關脈大相應 已形亦在前通語；左手脈疾爲懷男 右手脈疾爲懷女 及兩脈流行滑利相通疾速來去 是或兩手關部脈洪大相應 是其胎已有形狀也。

左手帶縱兩個男；縱者 夫行乘妻 水行乘火 金行乘木 卽鬼賊脈也。名曰縱 見在左手則懷兩個男兒也。

右手帶橫一雙女；橫者妻乘夫也 是火行乘水 木行乘金 卽所勝脈也。名曰橫 見於右手卽懷一雙女兒也。

左手脈逆生三男；逆者子乘母也 是水行乘金 火行乘木 卽已生脈也 名曰逆 見於左

手卽懷三個男兒也。

右手脈順還三女；順者母乘子也 是金行乘手 木行乘火 卽生已之脈也 名曰 順見於右手卽懷三個女兒也。

寸關尺部皆相應 一男一女分形證；寸關尺部 脈大小遲疾相應者 是懷一男一女形證之脈也 謂關前爲陽關後爲陰 陰陽脈相應故懷一男一女也。

左手太陽浮大男；左手寸口爲太陽 其脈浮大是懷男之脈。

右手太陰沈細女；右手寸口爲太陰 其脈沈細是懷女脈也。

諸陽爲男諸陰女 指下分明長記取；諸陽脈皆爲男 卽浮大疾數滑實之類是也 當懷男子 諸陰脈者 卽沈細之類是也 當懷女子。

13. 《四診心法》¹³⁾

婦人有子 陰搏陽別 少陰動甚 其胎已結 滑疾而散 胎必三月 按之不散 五月可別 左男右女 妊娠是主 女腹如箕 男腹如釜。

(註)此一節 明女科胎前之脈也。陰搏陽別者 寸爲陽 尺爲陰 言尺陰之脈 搏指而動寸陽之脈 則不搏指 迥然分別 此有子之診也。或手少陰心脈獨動而甚者 蓋心主血 血主胎 故胎結而動甚也 動者 謂往來流利之動而滑 非厥厥搖動爲病之動也。疾卽數也 滑而且數 按之而散 三月之胎也 按之不散 五月之胎也。左爲陽 故左疾爲男胎 右爲陰 故右疾爲女胎。五六月後 妊娠之乳房有核吮之有乳者 則主有子也。女胎腹形 狀如箕之圓也 男胎腹形 狀如釜之上小而下大也。

14. 《診療要鑑》¹⁴⁾

妊娠 婦人の 腹部를 손으로 어루만져 보아 잔을 엮어 놓은 것 같으면 男子이고 肘頸을 만지는 것처럼 參差不齊(가지런하지 않은 것)한 것은 女子이다。

妊娠의 左乳房에 核이 있으면 男子이고 右乳房에 核이 있으면 女子이다。

妊娠로 하여금 南쪽을 向하여 걸게 하

고 문득 불러서 왼쪽으로 머리를 돌려서 보면 男子이고 오른쪽으로 돌아보면 女子이다。

男女分別의 診脈法；婦人の 妊娠 四月에 男女를 알고자 할 때 左脈이 疾하면 男子이고 右側脈이 疾하면 女子이며 左右가 다 빠르고 滑하면 雙童의 脈이다. 左右脈이 偏大하면 男子이고 右側脈이 偏大하면 女子이고 左右가 俱大한 것은 雙胎脈이다. 左手脈이 沈하고 實하면 男子이고 右手脈이 浮하고 大하면 女子이며 左右手의 脈이 다 같이 沈實하면 二男을 낳고 다같이 浮大하면 二女를 낳는다.

15. 《薛氏醫案》¹⁵⁾

左疾爲男右爲女 流利相通速來去 兩手關脈大相應 已形亦在前通語；左手脈疾爲懷男 右手脈疾爲懷女 及兩脈流行滑利相通疾速來去是或兩手關部脈洪大相應是其胎已有形狀也。

左手帶從兩箇男；縱者 夫行乘妻 水行乘火 金行乘木 卽鬼賊脈也。名曰縱 見在左手 則懷兩個男兒也。

右手帶橫一雙女；鑽者妻乘夫也 是火行乘水 木行乘金 卽所勝脈也。名曰橫 見於右手卽懷一雙女兒也。

左手脈逆生三男；逆者子乘母也 是水行乘金 火行乘木 卽已生脈也 名曰逆 見於左手卽懷三個男兒也。

右手脈順還三女；順者母乘子也 是金行乘手 木行乘火 卽生已之脈也 名曰 順見於右手卽懷三個女兒也。

寸關尺部皆相應 一男一女分形證；寸關尺部 脈大小遲疾相應者 是懷一男一女形證之脈也 謂關前爲陽關後爲陰 陰陽脈相應故懷一男一女也。

左手太陽浮大男；左手寸口爲太陽 其脈浮大則是懷男子。

右手太陰沈細女；右手寸口爲太陰 其脈沈細是懷女脈也。

諸陽爲男諸陰女 指下分明長記取； 諸陽脈皆爲男 卽爲大疾數滑實之類也 當懷男子 諸陰脈三 卽沈細之類是也 當懷女子。

16. 《濟陰綱目》¹⁶⁾

婦人妊娠四月， 欲知男女法， 左疾爲男， 右疾爲女， 俱疾爲生二子。

遺妊娠人 面南行 還復呼之 左迴首者是男 右迴首者是女。 看上闔時 夫從後急呼之 左迴首是男 右迴首者是女也。 婁全善云 按丹溪云 男受胎在左子宮 女受胎在右子宮 斯言大契是說也。 蓋男受胎在左則左重 故迴首時 慎護重處 而就左也 女受胎在右則右重 故迴首時 慎護重處 而就右也 推之於脈 其義亦然。 胎在左則 血氣護胎而盛於左 故脈亦從之 而左疾爲男 左大爲男也 胎在右則 血氣護胎而盛於右 故脈亦從之 而右疾爲女 右大爲女也。

17. 《濟衆新篇》¹⁷⁾

摸腹如覆杯者男 如肘頸參差起者女。

左乳房有核男 右有核女。

遺妊娠南行急呼之 左顧男 右顧女。

左疾男 右疾女 俱滑疾雙男 左尺大男 右尺大女 左沈實男 右浮大女 左右俱沈實雙男 左右俱浮大雙女。

18. 《脈訣刊誤》¹⁸⁾

左疾爲男右爲女 流利相通速來去 兩手關脈大相應 已形亦在前通語。

： 脈經曰 妊娠四月 欲知男女法 左尺偏大爲男 右尺偏大爲女 左右尺俱大生二子 大者如實狀 左 疾爲男 右疾爲女 俱疾生二子 旣分左右脈疾 又云流利相通 又云兩手關脈相應乃是 左右尺脈疾大上與關大相應 又流利相通與寸通應 但分左右尺以別男女 左陽右陰 以位定也 池氏 以左疾爲左寸心部 屬太陽經 以右疾爲右寸肺部 屬太陰經 蓋惑于脈賦太陰洪而女妊 太陽大而男妊 不知脈賦惑于 脈訣之差蓋脈賦 脈訣皆竊叔和

之名以行世所述之脈醇疵相半聲律之賦 晉代未有而世鮮知其非明于醫者間亦改之一二 而未能盡正云。

左手太陽浮大男 右手太陰沈細女

； 脈經曰 得太陰脈爲男 得太陽脈爲女 太陰脈沈 太陽脈浮 又云左手沈實爲男 右手浮大爲女 左右手俱沈實猥生二男 左右手俱浮大猥生二女 李氏雖改脈訣 沈細爲沈大 猶未知 太陽脈浮非男 脈經作女診也 太陰脈沈非女 脈經作男診也 又以太陽爲左手心部 太陰爲右手肺部是又惑于 脈訣脈賦之差 徇 池氏以舛注舛之非也 脈經雖曰 太陽脈沈爲男 太陰脈浮爲女 亦不明言 以何經爲太陽太陰當于何部診之 不若脈經後條浮大爲女 沈實爲男 爲明白故依後條改之。

諸陽爲男諸陰女 指下分明長記取

； 左右尺俱浮 爲產二男 不爾則男作女生 左右尺俱沈 爲產二女 不爾則女作男生 前云 右浮大爲女 左沈實爲男 是獨以左右脈各異立言 今左右俱浮爲二男 俱沈爲二女 是並左右兩尺脈 一同以立言其于諸陽男 諸陰女 未嘗差也 左沈實左疾 左偏大與俱浮 或以脈 或以位 皆陽也 右浮大 右疾 右偏大與俱沈 或以脈 或以位 皆陰也 此二句總結 男女分診定法也 已上辨四月之後 妊娠男女之診。

母乘子兮縱氣露 妻乘夫兮橫氣助 子乘母兮逆氣參 夫乘妻兮順氣護

； 仲景謂脈有相乘 水行乘火 金行乘木曰縱 謂其氣直恣乘其所勝也 火行乘水 木行乘金曰橫 謂其氣橫逆反乘所不勝也 水行乘火 火行乘木曰逆 謂子加于母其氣逆也 金行乘水 木行乘火爲順 謂由母至子其氣順也 李晞范不知此論 相乘脈中夫妻母子却作人身形之夫妻母子解之理 不能通然脈訣引此以診別 男女妊形 據脈經別載于前不載在診 妊娠之條 只是取仲景所論相乘之脈 脈訣不能欵別混引以歌妊娠今枯依 仲景解之 此四句元在後今移在此 與縱橫逆順從類其縱順二脈 改作仲景元文。

左手帶縱兩箇男 右手帶橫一雙女 左手脈逆生三男 右手脈順還三女 寸關尺部皆相應 一男一女分形證

；已上十句皆脈訣自僕之辭 恐難以診 妊娠男女之別也 且相乘之脈乃五臟之邪 發爲病証見之于脈 妊娠乃陰陽和平 陽施陰化以成形 豈有逆于理承于藏現于脈 用爲男女之診 又寸關尺皆應卽 是左右手前後如一也 卽脈經所謂三部浮沈正等之脈 何以應一男一女乎 已上係脈訣差取仲景所論相乘之脈以論妊娠今條其非如前.

19. 《韓方婦人科學》¹⁹⁾

1) 脈辨男女法

《脈經》에 “胎가 左에 있으면 血氣가 護胎하여 左가 盛하는 故로 脈도 亦是 이를 따라서 左脈이 疾大하게 되니 이는 男子이고, 胎가 右에 있으면 血氣가 護胎하여 右가 盛하는 故로 脈도 이를 따라서 右脈이 疾大하게 되니 이는 女胎이다.” 하였다.

《脈訣》에 “沈實이 左手에 나타나고 浮大가 右手에 나타나는 狀態에 따라 右는 女이고 左는 男임을 可히 豫側할 수 있다.” 하였다.

《良方》에 “左尺이 浮實한 것은 爲男이고 右尺이 浮洪한 것은 爲女라.” 하였다.

2) 乳房辨男女法

《金鑑》에 “婦人이 妊娠하여 左乳房에 核이 있으면 이는 男이고, 右乳房에 核이 있으면 이는 女이다.” 하였다.

3) 回首辨男女法

《脈經》에 “妊婦가 步行時(上圍時)에 男便이 뒤에서 急히 부를 때 妊婦가 左迴首하는 자는 男胎이고, 右迴首하는 자는 女胎이다. 대개 男胎는 左側에 있어서 左側이 무거움으로 迴首時에 重處를 慎護하기 위하여 左側으로 돌리게 되고, 女胎는 右에 있으므로 右側이 무겁기 때문에 迴首時 右側으로 돌린다.” 하였다.

4) 腹形辨男女法

《綱目》에 “腹形이 上小下大하여 箕形과 같은 것은 女胎이니, 女胎는 面을 母腹에 向하고 있으므로 그 足膝이 腹部에 있기 때문이다. 만약 腹의 中央이 마치 釜形과 같이 둥글게 높아져 있는 것은 男胎이니 男胎는 面을 母背에 向하고 있으므로 兒는 背脊이 母腹에 닿아 있기 때문이다.” 하였다.

《景岳》은 “女胎는 母에 背를 대고 懷妊되므로 母의 腹이 軟하고, 男胎는 母를 面하고 懷妊하므로 母腹이 鞭하다.” 하였다.

5) 八卦辨男女法

《金鑑》에 “먼저 父의 生年으로 一爻를 作하여 上에 놓고, 母의 生年을 一爻로 하여 下에 놓은 다음, 受胎月을 그 中間에 놓아 作卦하였을 경우, 乾坎艮震이면 陽象이니 이는 男子로 判定하고, 巽離坤兌는 陰象이니 女兒로 判定한다.” 하였다.

6) 胎動辨男女法

《王叔和》는 “胎不安 腹痛時에 腹部를 觸診하여 杯를 얹어 놓은 것 같은 것은 男이고, 만일 肘頸을 뺀 것 같은 것은 女胎라.” 하였다.

7) 羊水檢査法

羊水內의 細胞를 染色하여 鏡檢할때 그 속의 特殊性 染色質을 나타내는 細胞가 25%以上 包含되어 있으면 女兒로 診斷하는 方法인데, 이 方法도 絶對的으로 確實한 것은 아니라 한다.

20. 《產科學》²⁰⁾

○양수검사법; 임신 15주 내지 18주에는 양수로부터 성염색질체(barr body)와 Y염색체의 염색, 혹은 더 정확하게 세포배양과 핵형 분석으로 태아의 성 감별을 할 수 있다. 성염색질체 유무에 의한 태아 성감별은 정확도가 95%이며 Y염색체 염색은 97%로 보고 되어 있다. 따라서

태아 성감별이 꼭 필요한 경우 양수세포를 배양하여 핵형분석으로 확인하는것이 필수적이다.

○초음파검사법: 해상력이 좋은 초음파로는 태아의 외성기를 관찰하여 성감별을 할 수 있다. birnholz(1983)은 15주 이상의 태아 590명중 69%에서 태아 성기를 관찰 할 수 있었고 이중 99%에서 성별을 결정 할 수 있다고 보고 하였다. 20주 이후에는 태아의 성기가 90% 이상에서 관찰된다.

Table I. 脈辨男女法에 대한 比較

男	女	引用文獻
左疾爲男	右疾爲女	1,2,3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18
左手太陰(沈)脈	右手太陽(浮)脈	1,3
左沈實	右浮大	1,3,5,7,10,14,17
左尺偏大	右尺偏大	1,3,5,7,10,14,16,17,18
其脈三部俱滑大而疾 在左爲男 在右爲女		6,12
左手尺脈浮洪	右手尺脈浮洪	6
左手太陽浮大	右手太陰沈細	6,12,15,18
左寸太陽浮大	右寸太陰沈實	9
諸陽脈皆爲男 (大疾滑數實)	諸陰脈皆爲女 (沈細之類)	6
諸陽實爲男 (鼓搏沈實)	諸陰虛爲女 (虛弱浮澁)	7

IV. 總括 및 考察

胎兒의 男女 性分化는 妊娠 三個月에 이루어 지는데 《得效方》¹⁹⁾에 보면 “妊娠 三個月을 始胎라고 하는데 이때는 血脈이 不流하고 形象이 變化하는 것이니 男女가 아직 決定되지 않았기 때문에 服藥, 혹은 方術에 의해서 男胎로 轉換 할 수 있다.”고 하였고 現代醫學의으로도 胎生初期(6-7周)의 胎兒는 男女性腺이 未分化 狀態로서 未分化 生殖腺과 2雙의 管(Muller's duct, Wolff's duct)을 지니

고 있으므로 男女 어느쪽으로도 分化할 수 있음을 밝혔다.²³⁾ 따라서 妊娠 四個月부터는 孕胎한 胎兒의 性別을 分別하는 일이 可能 해지게 되는데, 文獻上 記錄되어 있는 辨別方法으로는 脈辨男女法, 乳房辨男女法, 迴首辨男女法, 腹形辨男女法, 胎動辨男女法, 八卦辨男女法, 臍辨男女法, 抱兒辨男女法이 있다.

첫째로 脈에 의한 鑑別法을 살펴보면 이는 韓醫學 文獻上 가장 많이 言及되고 있으며 臨床上 가장 널리 使用되고 있는 方法이라고 할 수 있다. 妊娠이 되면 母體의 生理變化의 特徵을 따라 그 脈象이 滑하면서 沖和하거나, 滑數하면서 힘이 있거나, 또는 尺脈이 滑數하거나 寸脈微小등의 脈象이 나타나게 되는 데 이를 妊娠脈 또는 胎脈이라고 한다. 《素問·陰陽別論》에서는 “陰搏陽別爲之有子”라 하였고 《素問·平人氣象論》에서는 “婦人少陰脈動甚者 妊者也”라 하였고 《瀕湖脈學》에서는 “滑利沖和妊脈可決”이라 하였으며 《醫宗金鑑》《四診心法要訣》에서는 “滑疾而散 胎必三月 按之不散 五月可別”이라 하였으니 이는 모두 妊娠의 脈象이다²⁴⁾. 脈으로 妊娠 중 胎兒의 性別을 區別하는데에는 ‘男左女右’의 좌우분별법이 많이 쓰였으니 男爲陽 女爲陰하고 《素問·方盛衰論》²⁵⁾에서 言及하였듯 “陽從左 陰從右”하기 때문이다.

王¹⁾은 “左疾爲男 右疾爲女”라 하였는데, 孫³⁾ 張⁴⁾ 陳⁶⁾등 以後의 醫家 대부분이 그의 見解를 따르고 있다. 그러나 서로 엇갈리는 주장들도 있으니 王¹⁾과 陳⁶⁾은 “左疾爲男 右疾爲女”라는 基本的인 辨脈法에서는 의견이 같으나 具體的 脈象으로 男女를 나누는 데에는 差異가 있다. 王¹⁾은 “得太陰脈爲男 得太陽脈爲女 太陰脈沈 太陽脈浮”라 하여 左手를 太陰으로 보아 沈脈이면 男이고, 右手를 太陽으로 보아 浮脈이면 女라고 한데 반하여 陳⁶⁾은 “左

手太陽浮大 右手太陰沈細女”라 하여 左手를 太陽으로 보아 脈이 浮大하면 男이고 右手를 太陰으로 보아 脈이 沈細하면 女라고 하여 太陽, 太陰을 서로 相反되게 말하고 있다.

脈象 또한 王은 左沈實을 男으로, 右浮大를 女로 보고, 陳⁶⁾은 左浮大, 浮洪을 男으로 右沈細를 女로 보아 서로 相反되는 주장을 하고 있으며, 程⁹⁾은 左浮大는 男으로 右沈實을 女로 보았다. 後世의 醫家들은 孫³⁾이 王¹⁾의 見解를 따르고 있는 반면 王¹²⁾ 薛¹⁵⁾ 戴¹⁸⁾ 등은 모두 “左手太陽浮大 右手太陰沈細女”라 하여 陳⁶⁾의 見解를 따르고 있다. 또 陳⁶⁾은 “諸陽爲男諸陰女”라고도 하여 大疾數滑實之類의 脈은 모두 男胎이며 沈細之類의 脈은 모두 女胎라 하였으며, 蕭⁷⁾ 또한 “諸陽實者爲男 諸陰虛者爲女”를 말함에 있어 鼓博沈實은 陽이므로 男胎이고 虛弱浮澁은 陰이므로 女胎라 하여 脈體로 陰陽을 나누어 男女를 判別하는 法을 말하였다.

以上에서 考察하였듯 脈으로 胎兒의 性別을 區別하는 데에는 若干의 見解 差異가 있기는 하나 모든 醫家들이 王이 말한 “左疾爲男 右疾爲女”를 基本的인 脈辨 男女法으로 認定하고 있으며 덧붙여 脈의 性質의 陰陽을 判別하여 男女를 區別하였음을 알 수 있다.

둘째로 乳房에 의한 辨別法은 우선 乳房의 核이 左右 어느쪽에 있느냐로 男女를 判別하는 법이 있으니 醫鑑에 “婦人有妊, 左乳房有核是男, 右乳房有核是女也”라 하여 脈에 있어서의 男左女右說과 같이 妊婦의 左側乳房에 核이 있으면 男胎이고 妊婦의 右側乳房에 核이 있으면 女胎로 判別한다 하였다. 이후 許⁵⁾ 康¹⁷⁾ 李¹⁴⁾ 등이 모두 위의 說을 따르고 있다. 다만 王¹⁾과 孫³⁾이 “婦人妊娠 其夫左乳房有核是男 右乳房有核是女”라 하여 婦人이 妊娠되고 그의 男便의 左側의 乳房에 核이 있으면

男兒이고 右側의 乳房에 核이 있으면 女兒라고 하였으나, 婦人이 妊娠한 때에 婦人의 腹中에 있는 胎兒의 性別을 男便의 乳核의 左右與否로 알아낸다는 것은 있을 수 없는 일이라 判斷되어 아마도 誤字가 插入된 것이거나 또는 解釋書²¹⁾의 誤謬가 아닐까 推測된다.

또한 乳房의 색깔이 짙은 정도로 男女를 判別하는 법이 있으니 閻¹¹⁾은 “凡懷男妊 動在三月……兩乳甚黑, 女妊動在五月……乳頭雖黑不甚”이라 하여 乳頭의 색이 짙은 黑色이면 男胎이고 乳頭의 색이 옅으면 男胎라고 하였다.

세째로 迴首辨男女法이 있으니 王¹⁾이 “妊娠人面南行 還復呼之 左迴首者是男 右迴首者是女也 又法看上圍時 夫從後急呼之 左迴首是男 右迴首是女也”라 하여 妊婦로 하여금 남쪽을 향하여 걷게 하고 문득 불러서 왼쪽으로 머리를 돌려서 보면 男子이고 오른쪽으로 돌아보면 女子로 判別함을 말하였다. 그 原因은 王¹²⁾, 許⁵⁾가 말하길 “蓋男胎在左則左重故迴首時慎護重處而就左也 女胎在右則右重故迴首時慎護重處而就右也 推之於脈 其義亦然”이라 하였으니 이는 대개 男胎는 왼쪽에 있으니 왼쪽이 무거운 故로 머리를 돌릴 때에 무거운 곳을 삼가 護衛하기 때문에 왼쪽으로 돌리는 것이요 女胎는 오른쪽에 있으니 오른쪽이 무거운 故로 역시 머리를 돌릴 때에 무거운 곳을 삼가 護衛하기 때문에 오른쪽으로 돌린다는 것으로서 辨脈法의 男左女右說과 역시 相通하는 意味이다. 그러나 迴首法으로 胎兒의 性別을 判別하는 것은 偶然性이 너무 많이 개입되며, 따라서 실제로 適用하여 使用하기에는 未洽한 점이 있다고 思料된다.

네째 腹形으로 男女를 구별하는 法이 있다. 蕭⁷⁾는 “其腹如箕爲女胎 腹如釜爲男胎, 蓋男女妊于胞中 女面母腹 卽足膝低腹下大上小 故如箕, 男面背母 卽背脊抵腹 其

形正員故如釜也”라 하였으니 腹形이 아래가 넓고 위가 뾰족하여箕形과 같은 것은女胎이니 女胎는 面을 母腹에 向하고 있으므로 그 足膝이 腹部에 있기 때문이며, 만약 腹의 中央이 마치 釜形과 같이 둥글게 높아져 있는 것은 男胎이니 男胎는 面을 母背에 向하고 있으므로 兒는 背脊이 母腹에 닿아 있기 때문이라는 것이다. 吳⁸⁾도 “上小下大女腹箕 中正圓高男腹釜”라 하였으니 中正圓高는 釜形과 같은 것이며, 許⁵⁾가 “如覆杯者即男兒也, 如肘頸參差起者女也”라 하여 孕婦의 배를 손으로 만져보아 잔을 엮어 놓은 것 같으면 男胎요 肘頸을 만지는 것처럼 가지런하지 않은 것은 女胎라 한 것도 같은 맥락에서 把握할 수 있다.

또한 腹部를 만져보아 腹部의 硬度로 男女를 判別하기도 하였으니 張⁴⁾은 “女胎背母而懷故母之腹軟, 男胎面母而懷故母之腹硬”이라 하여 腹部가 비교적 軟하면 女이고 腹部가 단단하면 男이라고 하였다. 이 腹形判別法은 脈辨男女法과 함께 비교적 많이 使用되어 온 方法이다.

다섯째로 胎動辨男女法은 張⁴⁾이 “胎有男女即成有遲速, 體有陰陽即懷有向背. 男動在三月, 陽性早也, 女動在五月, 陰性遲也”라 하고 許⁵⁾ 蕭⁷⁾ 閻¹¹⁾등도 이를 따라 “凡懷男妊 動在三月 陽性早也, 女妊動在五月 陰性遲也”라 하였듯이 비교적 이른 妊娠 三個月에 胎動이 시작되는 것은 男胎이고, 五個月이 되어서야 胎動이 시작되는 것은 女胎로 判別하는 方法이다.

여섯째 八卦辨男女法이 있으니 이것은 《金鑑》에 “먼저 父의 生年으로 一爻를 作하여 上에 놓고, 母의 生年을 一爻로 하여 下에 놓은 다음, 受胎月을 그 中間에 놓아 作卦하였을 경우, 乾坎艮震이면 陽象이니 이는 男子로 判定하고, 巽離坤兌는 陰象이니 女兒로 判定한다”한 것이다.¹⁹⁾

일곱째 臍辨男女法이 있으니 이는 閻

¹¹⁾이 “凡懷男妊 動在三月 陽性早也 婦臍必突……女妊動在五月 陰性遲也 婦臍軟”이라 하여 臍가 突出한 것은 男으로 臍가 軟한것은 女로 判別하는 方法이다.

마지막으로 抱兒辨男女法은 閻이 著述한 《胎產心法》¹¹⁾에 나오는 것으로 “令妊婦抱未生齒兒女 是男妊 則所抱女兒瀉青糞 若男妊抱男兒 女妊抱女兒 則無恙”라 하여 妊婦가 齒牙가 나지 않은 女兒를 안고있을 때 만약 그 아이가 青便을 瀉하면 男胎를 妊娠한 것으로 보고 그렇지 않으면 女兒로 判別하며, 반대로 齒牙가 나지 않은 男兒를 안고 있을 때 이 男兒가 青便을 瀉하면 女兒를 妊娠한 것으로, 그렇지 않으면 男兒를 妊娠한 것으로 본다는데 事實上 이 方法은 適合性의 如何함에 疑心이 간다.

以上 考察하여 본 바 胎兒의 性鑑別法은 脈辨法이나 腹形辨法, 迴首辨法, 乳房辨法等이 모두 男左女右에 基礎하고 있음을 알 수 있었으며, 그 實際 應用에 있어서의 有意性은 더욱 研究 調查가 必要할 것으로 思料된다.

V. 結 論

歷代文獻上에 나타난 胎兒性鑑別法에 對하여 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 胎兒의 性分化는 妊娠 三個月에 이루어지므로 妊娠 四個月이 되어야 胎兒의 性鑑別이 可能하다.
2. 脈辨男女法은 左側脈이 빠르면 男子이고 右側脈이 빠르면 女子이다. 左側脈이 浮大하면 男子이고 右側脈이 沈細하면 女子이다.
3. 乳房辨男女法은 婦人의 左乳房에 核이 있으면 男子이고 右乳房에 核이 있으면 女子이다.
4. 迴首辨男女法은 婦人은 문득 뒤에서

블러 左側으로 迴首하여 돌아보면 男子이고 右側으로 迴首하여 돌아보면 女子이다.

5. 腹形辨男女法은 腹形이 아래가 넓고 위가 뾰족하여 箕形과 같은 것은 女兒이니 이는 女胎가 面母腹하여 胎兒의 足膝이 母腹에 닿아 있기 때문이며, 腹形이 釜形과 같이 완만하고 둥글게 높아져 있는 것은 男胎이니 이는 男胎가 面母背하여 胎兒의 背脊이 母腹과 닿아 있기 때문이다.

6. 胎動辨男女法은 胎動이 三個月 前後로 일찍 發生하면 男子이고 五個月 前後로 비교적 늦게 發生하면 女子이다.

7. 八卦辨男女法은 父의 生年으로 一爻를 作하여 上에 놓고, 母의 生年을 一爻로 하여 下에 놓은 다음, 受胎月을 그 中間에 놓아 作卦하였을 경우, 乾坎艮震卦이면 男子이고, 巽離坤兌卦이면 女子이다.

8. 臍辨男女法은 臍가 突出하면 男子이고 臍軟하면 女子이다.

9. 抱兒辨男女法은 妊婦가 齒牙가 나지 않은 女兒를 안고 있을때 이 女兒가 靑便을 瀉하면 男胎를 가진 것이고 그렇지 않으면 女胎를 임신한 것이다.

參 考 文 獻

1. 王叔和: 脈經, 香港, 商務印書館, 1973, (新刊王氏脈經卷第九) p.1-2.
2. 王叔和: 脈訣, 서울, 成輔社, 1955, (卷四) p.239.
3. 孫思邈: 備急千金要方, 서울, 自由出版社, 1959, p.19-20.
4. 張介賓: 景岳全書, 서울, 大星文化社, 1988, (下卷) p.19.
5. 許俊: 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1991, p.606.
6. 陳自明: 婦人良方大全, 台北, 文光圖書有限公司, 1983, (卷十一)p.1-4.
7. 蕭損: 女科經綸, 江蘇, 江蘇科學技術

出版社, 1988, p.84-86.

8. 吳謙: 醫宗金鑑, 서울, 大星文化社, 1991, (中卷)p.467.
9. 程國彭: 《醫學心悟》, 香港, 友聯出版社, 1981, p.237.
10. 沈堯封: 女科輯要, 北京, 人民衛生出版社, 1988, p.38-40.
11. 閻純璽: 胎產心法, 北京, 人民衛生出版社, 1988, p.177-178.
12. 王肯堂: 六科准繩, 서울, 翰成社, 1982, p.321-322.
13. 吳謙: 四診心法, 世一書局, p.83-84.
14. 李定濟編著: 診療要鑑, 서울, 東洋醫學研究院, 1983, p.664-665.
15. 薛己: 薛氏醫案(中國醫學大系卷31), 麗江出版社, 1987, p.801-802.
16. 武之望: 濟陰綱目, 서울, 大星文化社, 1980, p.273-278.
17. 康命吉: 濟衆新篇, 서울, 圖書出版鼎談, p.245.
18. 戴啓宗: 脈訣刊誤(中國醫學大系卷十四), 麗江出版社, p.918-919.
19. 宋炳基: 漢方婦人科學, 서울, 杏林出版, 1990, p.134-135.
20. 大韓產婦人科學會教科編纂委員會: 產科學, 서울, 圖書出版칼빈서적, 1991, p.691-692.
21. 李炳國譯: 王叔和脈經, 서울, 癸丑文化史, 1985, p.229-230.
22. 金永熏譯: 國譯增補東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1966, p.960-961.
23. 新太陽社編輯局: 原色最新醫療大百科辭典, 新太陽社, 1991(卷十) p.115.
24. 韓醫學大辭典編纂委員會: 韓醫學大辭典, 서울, 東洋醫學研究院 1977, p.174.
25. 洪元植編: 精校黃帝內經, 서울, 東洋醫學出版部, 1981, p.198.