

## On a Bayesian P-value with the Coherence Property<sup>1)</sup>

Hyungtae Hwang<sup>2)</sup>

### Abstract

Schervish(1996) and Lavine and Schervish(1999) have shown that the classical P-values and the Bayes factors fail to achieve the so-called coherence property, respectively. In this paper, we propose a new type of Bayesian P-value, namely the type LR Bayesian P-value, satisfying the coherence property. The proposed Bayesian P-values are very easy to use with since they are simple functions of likelihood ratio. Their performances are discussed and compared with those of other methods under several situations.

*Keywords* : coherence property, Bayesian P-values, Bayes factors, likelihood ratio

### 1. 서론

일관성의 원리(coherence property)는 최초에 Gabriel(1969)에 의하여 다중비교방법의 영역에서 제시된 개념으로, Schervish(1996)는 일반적인 가설검정방법들에 대하여 그 개념을 다음과 같이 정립하였다.

#### 일관성의 원리

가설  $H$ 가 가설  $H'$ 을 내포하고 있다고 하자. 즉,  $H$ 가 참이면  $H'$ 도 참이라고 하자. 어떤 검정방법에 의하여 가설  $H'$ 이 기각될 때 가설  $H$ 도 항상 기각된다면 그 검정방법은 일관성이 있다고 한다. 또한, 가설들에 대한 어떤 증거의 측도(measure of support, or measure of evidence)에 대하여  $H'$ 에 대한 값이 항상  $H$ 에 대한 값 이상인 성질을 가질 때 그 증거의 측도는 일관성이 있다고 한다.

Schervish(1996)는 고전통계학에서 일양최강력불편검정법(UMPU tests)에 의한 P-값이 일관성의 원리를 충족하지 못한다는 사실을 보임으로써, 고전적 P-값이 가설에 대한 증거의 측도로써 부적절한 측면이 있음을 주장한 바 있다.

한편 베이즈 통계학에서는 베이즈요인(Bayes factor)의 개념이 Jeffreys(1960)에 의하여 최초로 소개된 이후로 가설에 대한 증거의 측도로써 널리 보편화되어 사용되어 왔다. Schervish(1995, p.283)는 베이즈요인을 ‘자료에 존재하는 가설에 대한 근거의 정도를 정량화 하는 수단’으로 표현

1) The present research was conducted by the research fund of Dankook University in 2003.

2) Professor, Department of Informational Statistics, Dankook University, Seoul, 140-714, Korea,  
E-mail : hthwang@dankook.ac.kr

하였으며, Kass and Raftery(1995)는 베이즈 요인에 대한 정의, 의미, 계산 방법, 적용 사례 및 여러 가지 논점들에 대하여 광범위하게 토의하고 정리한 바 있다.

그러나 베이즈 가설검정에 있어서 베이즈요인의 한계에 대한 비판도 여러 학자들에 의하여 제기되어왔다. 그 중에서도 Lavine and Schervish(1999)는 베이즈요인이 일관성의 원리를 충족하지 못함을 보임으로써 베이즈요인이 갖고 있는 논리적 약점을 지적하였으며, 이와 같은 비일관성의 문제로 인하여 베이즈요인의 사용이 위험한 결과(dangerous consequences)를 초래할 수도 있음을 경고하였다. 일관성의 원리는 이 논문의 매우 중요한 동기를 제공하게 될 것이므로, 우리는 베이즈요인이 비일관적임을 보여주는 하나의 예를 다음의 2절에서 살펴보게 될 것이다.

최근에 Hwang(2001)과 Hwang and Oh(2002)는 각각 유의수준의 개념을 갖는 베이즈 가설검정 방법과 그에 따른 베이즈 P-값의 개념을 소개한 바 있다. 그들이 제안한 방법은 여러 가지 측면에서 상당히 바람직한 성질들을 갖는 것으로 보고되었으나, 다음의 2절에서는 그들의 검정방법 역시 일관성의 원리는 충족하지 못함을 보게될 것이다.

이에 따라 이 연구에서는 Hwang and Oh(2002)가 제안한 베이즈 P-값을 새로운 관점에서 수정하여 일관성의 원리를 충족하는 새로운 유형의 베이즈 P-값으로 LR형 베이즈 P-값을 제안하고, 그 성질에 대하여 검토해보고자 한다. 새롭게 제안되는 LR형 베이즈 P-값은 가능도 비(likelihood ratio)의 간단한 함수의 형태로써 표현될 수 있다.

## 2. 기존 가설검정방법들의 비일관성 검토

이 절에서는 이 연구에서 제안할 LR형 베이즈 P-값에 대한 도입동기를 이해하는데 도움이 되기 위하여, 기존 가설검정방법들의 비일관성에 대하여 간단하게 정리하여 살펴보기로 한다.

먼저 Schervish(1996)가 지적한 바와 같이 고전통계학에서 일양최강력불편검정법에 의한 P-값이 비일관적이라는 사실은 다음과 같은 예에서 확인할 수 있다.

[예 2-1] 정규모집단  $N(\mu, \sigma^2)$ 에서 다음과 같은 두 가지 가설검정을 고려해보자.

$$H_0: \mu = 0 \quad v.s. \quad H_1: \mu > 0 \quad (2.1)$$

$$H_0: \mu = 0 \quad v.s. \quad H_1': \mu \neq 0 \quad (2.2)$$

여기에서 가설  $H_1$ 은 가설  $H_1'$ 을 내포하지만 단측검정과 양측검정의 특성상 동일한 관측치에 대한 일양최강력불편검정법에 의한 P-값은 가설  $H_1$ 에 대한 값보다 가설  $H_1'$ 에 대한 값이 더 작은 값을 갖게된다. 이렇게 되면 가설  $H_1$ 을 채택하면서도 가설  $H_1'$ 은 채택하지 못하는 경우가 발생할 수 있게된다.

위의 예에서와 같은 경우 때문에 Schervish(1996)은 일양최강력불편검정법에 의한 P-값이 비일관적이라고 지적했던 것이나, 그의 지적이 있기 전에도 이런 점들은 이미 인지되고 있었던 사실이다. 고전적 P-값이 갖고 있는 비일관성의 문제는 단측검정과 양측검정 사이에 유의수준의 배분방법의 차이에서 비롯되는 것이다. 실제로 대립가설을 단측가설로 제한하는 경우에는 고전적 P-값의 비일관성의 문제는 더 이상 논의의 대상이 되지 않음을 알 수 있다.

한편 1절에서의 언급과 같이 Lavine and Schervish(1999)는 베이즈 통계학에서 대표적으로 가

설에 대한 증거의 측도로 사용되고 있는 베이즈요인 역시 일관성의 원리를 충족하지 못함을 지적하였다. 일관성의 원리라는 측면에서 베이즈요인의 구조적인 문제점을 보다 구체적으로 살펴보기 위하여 다음의 예를 들어보기로 한다.

[예 2-2] 모형  $x | \theta \sim N(\theta, 1)$  으로부터  $x=0.5$ 의 관측값을 얻었으며, 이를 근거로 다음과 같은 가설들에 대한 검정을 실시하려고 한다.

$$H_0: \theta \in [-1, 0] \quad v.s. \quad H_1: \theta \in (0, 1] \quad (2.3)$$

$$H_0: \theta \in [-1, 0] \quad v.s. \quad H_1': \theta \in (0, 2] \quad (2.4)$$

사전분포에 대하여는 각 가설로 주어지는  $\theta$ 의 각 영역내부에서  $\theta$ 에 대한 균등분포를 가정하기로 한다. 이때 식(2.3)과 식(2.4)에서 주어진 가설들에 대한 베이즈요인의 값을 계산해보면 각각  $B_1 = 0.6310$  과  $B_2 = 0.7738$  을 얻게되어  $B_1 < B_2$  이 됨을 알 수 있다. 그런데 더 작은 베이즈요인의 값은 대립가설에 대한 더 강한 믿음으로 해석될 수 있으므로, 가설  $H_1: \theta \in (0, 1]$  이 가설  $H_1': \theta \in (0, 2]$  를 포함에도 불구하고 동일한 관측값  $x=0.5$ 에 대한 베이즈요인의 값들은  $H_1'$  보다  $H_1$ 에 더 강한 지지를 보여주는 비일관성의 논리적 모순을 초래하게 되는 것이다.

Lavine and Schervish(1999)이 지적한 바와 같이, 베이즈요인의 이러한 비일관성은 가설에 대한 지지의 측도로서 베이즈요인이 자체적으로 갖고 있는 구조적 결함에 기인한다고 볼 수 있다. 이 점을 살펴보기 위하여 일반적으로 다음과 같은 가설들을 고려해 보자.

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \quad v.s. \quad H_1: \theta \in \Theta_1 \quad (2.5)$$

이때 베이즈요인은 보통 다음의 식으로 표현될 수 있다(Lee(1989), p.126 참고).

$$B = \frac{\int_{\theta \in \Theta_0} l(\theta | x) \rho_0(\theta) d\theta}{\int_{\theta \in \Theta_1} l(\theta | x) \rho_1(\theta) d\theta} \quad (2.6)$$

여기에서,  $l(\theta | x)$  는 가능도함수(likelihood function)을 뜻하며,  $\rho_i$  는  $\Theta_i$ 의 범위에서 제한된 사전분포를 뜻한다( $i=1, 2$ ). 즉,  $\rho_i$  는  $p(\theta)$  가 모두  $\theta$ 의 사전밀도함수이고,  $\pi_i = P[\theta \in \Theta_i]$  일 때 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned} \rho_0(\theta) &= p(\theta)/\pi_0 \quad \text{for } \theta \in \Theta_0 \\ \rho_1(\theta) &= p(\theta)/\pi_1 \quad \text{for } \theta \in \Theta_1 \end{aligned} \quad (2.7)$$

식(2.6)을 살펴보면 베이즈요인은 각  $\Theta_i$  내에서의 평균적인 가능도(likelihood)의 비로 해석될 수 있다. Lavine and Schervish(1999)는 가능도의 평균을 채용한다는 점이 바로 베이즈요인이 가설검정에서 증거의 측도로써 기능하는데 구조적인 문제를 발생시키는 것으로 파악하였다. 예를 들어, 어떤 사람의 나이가 40대라는 주장에 대한 증거의 측도가 그 사람의 나이가 40세 이상이라는 주장에 대한 증거의 측도보다 더 큰 값을 가져서는 곤란할 것이다. 하지만 만일 각 주장의 영역에 속하는 각 나이에 대한 어떤 가능성들의 평균을 증거의 측도로 선택한다면, 그 사람이 50세 이상이라는 가능성의 가능성은 상당히 낮은 경우에는 그 사람이 40대라는 주장에 대한 증거의 측도가 40세 이상이라는 주장에 대한 증거의 측도보다 더 큰 값을 갖게될 위험이 있다는 것이다. 사실 베이즈요

인의 이러한 문제점은 앞서 단측가설과 양측가설의 문제에서 비롯되는 고전적 P-값의 비일관성의 문제보다 더욱 심각한 구조적 결함으로 보여지는 측면이 있다. 베이즈요인은 고전적 P-값과 달리 단측가설에 국한해서도 언제든지 이러한 검정결과의 모순에 노출될 위험을 갖고 있는 것이다.

한편 최근에 Hwang(2001)은 주어진 신뢰수준을 갖는 신뢰영역(credible region)을 이용하여 유의수준의 개념을 갖는 베이즈 가설검정방법을 제안하였으며, Hwang and Oh(2002)는 이에 기반한 베이즈 P-값을 제안한 바 있다. 이들의 연구는 우리 연구의 내용과 상당히 밀접한 관계를 갖고 있으므로, 여기에서는 먼저 이들의 연구결과를 간략하게 요약하여 소개하도록 한다.

식(2.5)에서 주어진 가설들을 검정하기 위하여 모두  $\theta$ 에 대한 무정보적 사전분포를 가정하고, 주어진 관측치  $x$ 에 대하여  $C_{1-\alpha}(x)$ 를  $\theta$ 에 대한 하나의  $100(1-\alpha)\%$  신뢰영역이라고 하자. 이 때 Hwang(2001)이 제안한 유의수준  $\alpha$ 의 베이즈 가설검정 방법은 다음과 같다.

$$C_{1-\alpha}(x) \subset \Theta_1 \text{ 일 때만 } H_0 \text{를 기각한다.} \quad (2.8)$$

신뢰영역  $C_{1-\alpha}(x)$ 의 형태를 선택함에 있어서 Hwang(2001)이 제안한 원칙들은 다음과 같다.

첫째, 단측검정에서는 대립가설에서 지정하는 모수의 영역과 같은 방향의 단측 신뢰영역을 사용한다. 예를 들어, 대립가설이  $H_1: \theta > \theta_0$ 와 같은 형태일 때는  $C_{1-\alpha} = [t(x), +\infty)$ 의 형태로, 대립가설이  $H_1: \theta < \theta_0$ 와 같은 형태일 때는  $C_{1-\alpha} = (-\infty, t(x)]$ 의 형태로 신뢰영역을 구한다.

둘째, 단측검정 이외에는 HPD 영역을 이용한다.

이와 같이 Hwang(2001)에 의하여 제안된 베이즈 가설검정방법을 바탕으로, Hwang and Oh(2002)는 주어진 관측치  $x$ 에 대하여 베이즈 가설검정 방법이 귀무가설을 기각하는 최소의 유의수준  $\alpha$ 를 관측치  $x$ 에 대한 베이즈 P-값으로 정의하였다. 이들은 여러 가지 예를 통하여 이와 같이 정의된 베이즈 P-값이 기존의 고전적 P-값이나 또는 베이즈요인에 비하여 검정방법으로써 많은 강점들을 갖고 있음을 보여주었다. 그러나 일관성의 원리라는 측면에서 살펴보면, [예2-1]과 같은 경우에서는 그들의 베이즈 가설검정방법이 고전적 가설검정방법과 일치된 결과를 얻게됨이 그들의 논문에서 보여졌으므로, 이 방법들 역시 고전적 가설검정방법과 마찬가지로 일관성의 원리를 충족하지 못하고 있음을 알 수 있는 것이다.

### 3. LR형 베이즈 P-값의 제안

편의상 앞 절의 식(2.5) 이후의 모든 표기들은 이 절에서도 그대로 사용하기로 한다. 이 절에서 제안되는 베이즈 P-값은 앞 절에서 소개한 Hwang(2001)과 Hwang and Oh(2002)의 아이디어를 기본적으로 계승하되, 그 내용을 다음과 같이 일부 수정함으로써 얻을 수 있게 된다.

먼저, 신뢰영역  $C_{1-\alpha}(x)$ 의 형태를 선택함에 있어서 Hwang(2001)이 제안했던 두 가지 원칙들 가운데 두 번째 원칙을 제외하고, 항상  $\Theta_1$ 의 원소들을  $\Theta_0$ 의 원소들에 우선하여 신뢰영역  $C_{1-\alpha}(x)$ 에 포함시키도록 한다. 이렇게 되면 식(2.8)에서 주어진  $H_0$ 의 기각조건은 다음과 같이 표현될 수 있음을 쉽게 알 수 있다.

$$P[\theta \in \Theta_1 | x] \geq 1 - \alpha \text{ 일 때만 } H_0 \text{를 기각한다.} \quad (3.1)$$

따라서,  $\alpha \geq 1 - P[\theta \in \Theta_1 | x] = P[\theta \in \Theta_0 | x]$  일 때만  $H_0$ 를 기각하게 되어  $H_0$ 를 기각하는 최

소의 유의수준  $\alpha$ 가  $P[\theta \in \Theta_0 | x]$ 이므로, Hwang and Oh(2002)의 베이즈 P-값의 정의에 따라 이 경우의 베이즈 P-값은  $P[\theta \in \Theta_0 | x]$ , 즉, 귀무가설에 대한 사후확률을 알 수 있는 것이다.

다음으로, 사전분포로서 Hwang(2001)과 Hwang and Oh(2002)에서 가정했던 무정보적사전분포의 가정 대신에 다음과 같은 방법으로 사전분포를 가정하도록 한다. 우선, 주어진 관측치  $x$ 에 대하여  $\Theta_0$ 와  $\Theta_1$ 에서의 MLE들이 존재한다고 가정하고, 이들을 각각  $\widehat{\theta}_0$ 과  $\widehat{\theta}_1$ 으로 표기하자. 이때 우리가 가정할 사전분포는  $\pi_0 = \pi_1 = 1/2$ 과  $\rho_0(\widehat{\theta}_0) = \rho_1(\widehat{\theta}_1) = 1$ 으로써 주어진다. 즉, 귀무가설과 대립가설에 대하여 각각 1/2 씩의 공평한 사전확률(impartial prior probability; Casella and Berger(1987) 참조)을 부여하고, 각 가설내부의 사전분포로는 각 영역의 MLE 한 점에 집중된 포인트 매스(point mass)들을 가정하자는 것이다. 물론 사전분포가 주어진 자료에 의존한다는 점에서 다소의 이견이 있을 수 있겠으나, 경험적 사전분포(empirical prior distribution)의 일종으로 이해될 수 있을 것이다.

이와 같은 가정들 아래 얻게되는 베이즈 P-값을 LR형 베이즈 P-값(Type LR Bayesian p-value)이라고 하고  $P_{LR}$ 라고 표기하자. 즉, 앞에서 언급한 바와 같이  $P_{LR}$ 은 주어진 가정 아래 귀무가설에 대한 사후확률이므로, 다음의 식과 같이 주어지게 된다.

$$\begin{aligned} P_{LR} &= P[\theta \in \Theta_0 | x] \\ &= \frac{\pi_0 \int_{\theta \in \Theta_0} l(\theta | x) \rho_0(\theta) d\theta}{\pi_0 \int_{\theta \in \Theta_0} l(\theta | x) \rho_0(\theta) d\theta + \pi_1 \int_{\theta \in \Theta_1} l(\theta | x) \rho_1(\theta) d\theta} \\ &= \frac{l(\widehat{\theta}_0 | x)}{l(\widehat{\theta}_0 | x) + l(\widehat{\theta}_1 | x)} = \frac{1}{1+R} \end{aligned} \quad (3.2)$$

여기에서  $R = \frac{l(\widehat{\theta}_1 | x)}{l(\widehat{\theta}_0 | x)}$ 은 일반적으로 가능도 비(likelihood ratio)로 알려져 있는 통계적 양이다. 또한  $R$ 을 다음의 식(3.3)으로 표현하게 되면 이는 일반적으로  $\Theta_0$ 에서나  $\Theta_1$ 에서의 MLE들이 존재하지 않는 모든 경우를 포괄할 수 있게 될 것이다.

$$R = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_1} l(\theta | x)}{\sup_{\theta \in \Theta_0} l(\theta | x)} \quad (3.3)$$

식(3.2)에 의하여 제안된  $P_{LR}$ 의 일관성에 관하여 검토해 보자. 식(3.2)에서  $P_{LR}$ 이 가능도 비  $R$ 의 감소함수이고, 식(3.3)에서  $\Theta_0$ 가 넓어질 때  $R$ 의 값은 커지지 않으며, 반면에  $\Theta_1$ 이 넓어질 때  $R$ 의 값은 작아지지 않는다는 사실로부터  $P_{LR}$ 은 일관성 있는 증거의 척도임을 쉽게 알 수 있으며, 이는 다음의 [정리 3.1]에 기술되어 있다.

[정리 3.1] 식(3.2)에 의한 LR형 베이즈 P-값  $P_{LR}$ 은 가설에 대한 증거의 측도로써 일관성의 원리를 만족한다.

편의상 식(3.2)에서 제안된  $P_{LR}$ 에 대비하여, 고전적 P-값은  $P_C$ 로, Hwang and Oh(2002)가 제안했던 베이즈 P-값은  $P_{HO}$ 로 표기하기로 하자.

Berger and Sellke(1987)는  $H_0: \theta = \theta_0$  와 같이 단일점 단순가설(point null hypothesis)에서 양측검정인 경우에,  $\pi_0 = \pi_1 = 1/2$ 인 공평한 사전분포들의 여러 가지 족(class)에서 최소화한  $H_0$ 의 사후확률의 값, 즉,  $P[H_0 | x]$ 의 최소값을 귀무가설에 반하는 증거의 척도(measure of evidence against  $H_0$ )로 상정하고, 이 값들과 고전적 P-값인  $P_C$ 를 비교하여 연구한 바 있다. 그들의 연구 결과는 Robert(1994, p.198)의 교재에 고전적 P-값에 대한 베이지안의 대안으로서 상세하게 소개되어 있기도 하다.

여기에서 일단 주목하고자 하는 점은 단일점 귀무가설에서 양측가설의 경우로 한정하여 볼 때, Berger and Sellke(1987)의 결과를 가운데 모든 공평한 사전분포들의 족에서 최소화한  $P[H_0 | x]$ 의 값이 식(3.2)에서 제안된  $P_{LR}$ 의 값과 정확하게 일치하고 있다는 점이다. 따라서 단일점 귀무가설에서 양측검정의 경우에 대한  $P_{LR}$ 의 특성을 알아보는데는 Berger and Sellke(1987)의 연구 결과를 직접적으로 참고할 수 있을 것이다. 그들은 정규모집단의 경우에  $P_C$ -값들이 그들이 구한  $P[H_0 | x]$ 의 최소값보다 항상 상당히 작은 값을 갖는다는 사실을 보여주었다. 그들은 이와 같은 결과에 근거하여, 단일점 귀무가설에서 양측가설의 경우에 고전적 P-값이 귀무가설에 반하는 증거의 척도로 사용하기에 상당한 문제가 있을 수 있음을 경고한 바 있다.

#### 4. 적용 예

앞 절에서 단일점 귀무가설에서 양측가설의 경우에는  $P_{LR}$ 의 성질에 대하여 언급하였으므로, 이 절에서는 그 이외의 경우에 대한 예들을 통하여  $P_{LR}$ 의 성능이나 성질에 대하여 추가적으로 검토해보자 한다.

[예 4-1] 표본  $x_1, \dots, x_n$ 은 정규분포  $N(\mu, 1)$ 로부터의 크기  $n$ 인 확률표본이고, 검정하고자 하는 가설들은 다음과 같다.

$$H_0: \mu \leq 0 \quad v.s. \quad H_1: \mu > 0 \quad (4.1)$$

표본으로부터 계산된  $z = \frac{\bar{x} - 0}{1/\sqrt{n}}$  의 관측값이  $z > 0$ 이라고 하자. 이 때  $P_{LR}$ 의 값은 다음과 같음을 유도할 수 있다.

$$P_{LR} = \frac{1}{1 + \exp(z^2/2)} \quad (4.2)$$

또한 이 경우에  $P_{HO}$ 는 가능성비 검정에 의한  $P_C$ 와 일치하는 값을 갖게 되며,  $\Phi$ 를 표준정규분포의 분포함수라고 할 때 다음 식으로 표현된다.


$$P_{HO} = P_C = 1 - \Phi(z) \quad (4.3)$$

다음의 [표 1]에는 참고적으로 몇 가지 특별한  $z$ 값들에 대하여  $P_{LR}$ 과  $P_{HO} = P_C$ 의 값들이

주어져 있으며, [그림 1]에는  $P_{LR}$ 과  $P_{HO}=P_C$ 의 값들을 그림으로 비교한 결과가 주어져 있다.

[표 1] [예 4-1]에서  $P_{LR}$ 과  $P_{HO}=P_C$ 의 값들의 비교

$z$	$P_{HO}=P_C$	$P_{LR}$
1.282	0.100	0.305
1.645	0.050	0.205
2.326	0.010	0.063
2.576	0.005	0.035



[그림 1] [예 4-1]에서  $P_{LR}$ 과  $P_{HO}=P_C$ 의 추이 비교

[표 1] 및 [그림 1]을 살펴보면  $P_{LR}$ 의 값이  $P_{HO}=P_C$ 의 값보다 전반적으로 큰 값으로 나타나고 있다. 즉, 식(4.1)과 같은 단측가설검정의 경우에 있어서는  $P_{LR}$ 은  $P_{HO}$ 나  $P_C$ 에 비하여 귀무가설의 기각에 상당히 신중한 경향이 있음을 보여주고 있으므로,  $P_{LR}$ 을 사용할 때는 이 점에 유의해야 할 것으로 보인다.

다음의 [예4-2]는 Hwang and Oh(2002)에 의하여 제기되었던 예를 약간 변형해본 것으로서, 여기서는 귀무가설과 대립가설이 모두 단순가설인 경우에  $P_{LR}$ 의 성능을 검토해보기 위하여 인용해보도록 한다.

[예4-2]  $X \sim N(\mu, 1)$ 에 대하여 다음과 같은 단순가설들을 생각해 보자.

$$H_0: \mu = 0 \quad v.s. \quad H_1: \mu = \mu_1 \quad (4.4)$$

여기서,  $\mu_1 > 0$ 은 정해진 양수이다. 이제  $X$ 의 관측값이  $x = 3$ 라고 하자.

먼저 고전적 P-값은  $\mu_1 > 0$ 의 값에 관계없이 다음과 같다.

$$P_C = 1 - \Phi(3) = 0.0013 \quad (4.5)$$

또한 Hwang and Oh(2002)에 의한 베이즈 P-값은 다음과 같다.

$$P_{HO} = \begin{cases} \frac{1}{1 + \exp(3\mu_1 - \mu_1^2/2)}, & 0 < \mu_1 \leq 6 \\ 1, & 6 < \mu_1 \end{cases} \quad (4.6)$$

다음으로, LR형 베이즈 P-값은 식(3.2)에 의하여 계산해 보면 다음과 같이 주어진다.

$$P_{LR} = \frac{1}{1 + \exp(3\mu_1 - \mu_1^2/2)} \quad (4.7)$$


위의 식(4.6)과 식(4.7)로부터  $P_{HO}$ 와  $P_{LR}$ 는 그 값들이 0.5이하인 경우, 즉,  $0 < \mu_1 \leq 6$ 인 경우에 는 동일한 값을 갖게 된다는 사실을 알 수 있다. 다음의 [표 2]는 식(4.5) ~ (4.7)을 이용하여 몇 가지 선택된  $\mu_1$ 의 값들에 대한 각 P-값들을 비교하여 도표화 한 것이며, [그림 2]는  $\mu_1$ 의 값에 따른  $P_{LR}$ 의 값의 추이를 그림으로 나타낸 것이다.

[표 2] [예 4-2]에서  $P_C$ ,  $P_{HO}$  및  $P_{LR}$ 의 비교

$\mu_1$	$P_C$	$P_{HO}$	$P_{LR}$
0.01	0.0013	0.4925	0.4925
0.854	0.0013	0.1000	0.1000
1.236	0.0013	0.0500	0.0500
3.00	0.0013	0.0110	0.0110
4.764	0.0013	0.0500	0.0500
5.146	0.0013	0.1000	0.1000
6.00	0.0013	0.5000	0.5000
8.00	0.0013	1.0000	0.9997

고전적 P-값인  $P_C$ 의 값이  $P_{HO}$ 나  $P_{LR}$ 과는 달리  $\mu_1 > 0$ 의 값에 관계없이 일정한 값을 갖는다는 사실은 다음과 같은 직관적인 관점에서 비판받을 만하다.

먼저,  $\mu_1 = 0.01$ 과 같이 0에 매우 가까운 경우를 생각해 보자. 고전적 P-값은  $H_0: \mu = 0$ 이 참일 때  $x$ 의 값이 현재 관측값인 3 이상일 확률로 계산되며, 그 값이 0.0013으로 매우 작다는 사실을 근거로 하여 귀무가설을 기각하고 매우 강력한 증거에 의해서 대립가설  $H_1: \mu = 0.01$ 을 채택하게 한다. 그러나 자세히 살펴보면  $H_1$ 이 참인 경우에도  $x$ 의 값이 3 이상일 확률은 0.0014로



[그림 2] [예4-2]에서  $\mu_1$ 의 값에 따른  $P_{LR}$ 의 값의 추이

서  $H_0$ 가 참인 경우와 별 차이가 없으므로, 관측값  $x=3$ 이  $H_0$ 에 비하여  $H_1$ 이 참이라는 매우 강력한 증거라는 고전적 P-값의 결론은 직관적으로 받아들이기 어렵다. 이 경우에는 0.4925의 값으로써 귀무가설이 거짓인 증거가 별로 없다는 결론을 얻고 있는  $P_{HO}$ 나  $P_{LR}$ 가 직관에 더 부합하고 있음을 알 수 있는 것이다.

이번에는  $\mu_1=8.0$ 과 같이  $H_0: \mu=0$ 에서보다 관측값  $x=3$ 에서 더 멀리 있는 경우를 생각해 보자. 이 경우에도 고전적 P-값인  $P_C$ 는 역시 0.0013으로 매우 강력한 증거에 의하여  $H_0$ 를 기각하고  $H_1$ 을 채택하게 된다. 그러나 상식적으로  $x=3$ 의 관측값이  $H_0: \mu=0$ 에 비하여  $H_1: \mu=8.0$ 이 참이라는 강력한 증거로는 보여지지 않으므로, 고전적 가설검정의 결과는 받아들여 어렵다. 반면에 이 경우에도  $P_{LR}$ 은 0.9997의 매우 큰 값을 갖는 경향을 가짐으로써 검정력의 저하가 초래되는 단점도 보여주고 있으므로, 이에 대한 보완 연구도 필요할 것으로 생각된다.

## 5. 결론

이 논문에서는 고전적 검정방법이나 베이즈 요인 등 기존의 검정방법들이 일관성의 원리를 만족하지 못한다는 점에 착안하여, 새로운 형태의 베이즈 P-값을 제안하였다. 제안된 베이즈 P-값은 가능도 비의 단순한 함수의 형태로 표현되어 쉽게 계산될 수 있다는 장점을 갖고 있으며, 검정방법으로서 일관성의 원리를 만족한다. 또한 [예4-2]에서 보는 바와 같이 대립가설에 적응하여 직관에 잘 부합하는 결론을 이끌어 내는 바람직한 성질도 보여주었다. 그러나 [예 4-1]과 같은 경우에는 고전적 P-값에 비하여 상당히 큰 값을 갖는 경향을 가짐으로써 검정력의 저하가 초래되는 단점도 보여주고 있으므로, 이에 대한 보완 연구도 필요할 것으로 생각된다.

### 참 고 문 헌

- [1] Berger, J.O. and Sellke, T. (1987). Testing a point null hypothesis: the irreconcilability of p-values and evidence, *Journal of the American Statistical Association*, 82, 112-122
- [2] Casella, G. and Berger, J.O. (1987). Reconciling Bayesian and frequentist evidence in the one sided testing problem, *Journal of the American Statistical Association*, 82, 106-111
- [3] Gabriel, K.R. (1969). Simultaneous test procedures - Some theory of multiple comparisons, *The Annals of Mathematical Statistics*, 40, 224-250
- [4] Hwang, H.T. (2001). A Bayesian hypothesis testing procedure possessing the concept of significance level, *The Korean Communications in Statistics*, Vol. 8, No. 3, 787-795
- [5] Hwang, H.T. and Oh, H.J. (2002). A study on Bayesian p-values, *The Korean Communications in Statistics*, Vol. 9, No. 3, 725-732
- [6] Jeffreys, H. (1960). *Theory of probability (3 ed.)*, Oxford: Carendon Press.
- [7] Kass, R.E. and Raftery, A.E. (1995). Bayes factors, *Journal of the American Statistical Association*, 90, 773-795
- [8] Lavine, M. and Schervish, M.J. (1999). Bayes factors: What they are and what they are not, *The American Statistician*, 53, No. 2, 119-122
- [9] Lee, P.M. (1989). *Bayesian Statistics : an Introduction*, Edward Arnold, London.
- [10] Robert, C.P. (1994). *The Bayesian Choice: a decision theoretic motivation*, New York: Springer-Verlag.
- [11] Schervish, M.J. (1995). *Theory of Statistics*, New York: Springer-Verlag.
- [12] Schervish, M.J. (1996). P-values: What they are and what they are not, *The American Statistician*, 50, No. 3, 203-206

[ 2003년 6월 접수, 2003년 9월 채택 ]