

苦參이 항암제 cisplatin의 腺 · 心臟 부작용 감소에 미치는 영향

김진철 · 임성철 · 정태영 · 서정철 · 한상원*

대구한의대학교 한의과대학 침구경혈학교실

Inhibitory Effects of *Sophora Flavescens* on the Pancreatic & Cardiac Side Effects of Chemotherapy by Cisplatin

Jin Cheo Kim, Seong Chul Lim, Tae Young Jung, Jung Chul Seo, Sang Won Han*

Department of Acupuncture & Moxibustion, College of Oriental Medicine, Daegu Haany University

The objective of this study is to investigate the inhibitor effects of an traditional oriental herb, *Sophora flavescens* on the pancreatic & cardiac side effects of chemotherapy were studied by using B16-BL6 melanoma-injected C57BL6 mouse tumor model. In this study, the effects of an traditional oriental herb, *Sophora flavescens*, on the side effects of chemotherapy were studied using B16 melanoma-injected C57BL6 mouse tumor model. Anticancer drugs widely used in clinical situation. *Sophora flavescens* has significant effect on the reduction of the side effects of chemotherapy. Water extract of *Sophora flavescens* significantly inhibited cisplatin-induced increase of amylase (AMY) which is a good indicator of pancreatic toxicity. *Sophora flavescens* extract does not decrease the anti-tumor activity of cisplatin showing that it can selectively inhibit side effects of anticancer drugs preserving beneficial effect. Theses results suggest a possibility that *Sophora flavescens* extract can be used for cancer patients for the reduction of the side effects and improving the quality of life during chemotherapy of cancer patients.

Key words : *Sophora flavescens*, Cisplatin, antitumor activities

서 론

科學技術의發展에 따른 생활 및 의료수준의 향상에도 불구하고 산업 발전에 따른 환경오염, 스트레스 등으로 인하여, 전 세계적으로 癌으로 인한 死亡率이 增加하고 있다. 우리나라의 경우도 癌으로 인한 死亡率이 해마다 높아지는 추세이며 2003년도에도 사망원인 중 1위로 보고되었다¹⁾.

癌에 대한 치료로 西洋醫學에서는 外科的 手術療法, 放射線療法, 化學療法, 免疫療法 등이 활용되고 있는데, 특히 化學療法과 放射線療法은 치료 후 骨髓造血臟器異狀, 胃腸障礙, 脱毛 등의 각종 副作用²⁾이 생겨 腫의 질을 저하함으로 이를 개선해야 할 필요성이 대두되고 있다. 그 중 化學療法 抗癌劑인 cisplatin (cis-diamminedichloroplatinum II)은 고환암, 식도암, 난소암, 방광암, 뇌종양, 위암, 폐암, 자궁경부암, 전립선암, 골육종 등의 다양한 癌 치료에 광범위하게 이용되고 있으나, 신장독성 및 각종 副

作用을 유발하여 임상적 사용에 세심한 주의가 요구되고 있다³⁻⁶⁾. 이러한 腎otoxicity 유발기전은 아직 완전히 밝혀지지는 않았으나, 遊離基(Free radical) 특히 활성산소(Reactive Oxygen Species, ROS)가 연관되어 있음이 보고⁷⁻¹¹⁾되고 있다.

최근 韓醫學界에서는 韓藥材를 이용하여 이러한 抗癌劑의 副作用을 輕減시키고 免疫力を 增加시켜 직·간접적으로 抗癌效果를 증진시키고, 肿의 질을 개선할 수 있도록 抗癌劑 副作用 抑制와 抗癌劑와의 병용투여에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다¹²⁻¹⁷⁾. 苦參은 豆科에 속한 多年生 草本인 苦參(*Sophora flavescens* Ait.)의 根을 乾燥한 것으로, 神農本草經 中品 草部에 최초로 기재된 이래로 清熱燥濕, 祛風殺蟲, 利尿 등의 효능이 있어 熱痢, 便血, 黃疸尿閉, 赤白帶下, 陰腫陰痒, 濕疹, 濕瘡, 皮膚瘙痒, 疥癬麻風 등의 치료에 多用되어 왔다¹⁸⁻²⁰⁾.

苦參에 관한 기존의 實驗研究로는 항산화작용이 우수하고²¹⁻²²⁾ 家兔에 cisplatin으로 유발된 급성신부전을 개선시키는 것으로 보고²³⁾된 바 있으며, 당뇨개선효능²⁴⁾, 항균효능²⁵⁻²⁸⁾, 혈관 및 심장에 미치는 효능²⁹⁻³⁴⁾을 보고한 바는 있으나, 白鼠의 癌誘發病態模型에 대한 cisplatin의 副作用 減少에 관한 報告는 접하지

* 교신저자 : 한상원, 대구시 수성구 상동 165 대구한의대 부속대구한방병원

· E-mail : hansw@dhu.ac.kr, · Tel : 053-770-2236

· 접수 : 2005/05/30 · 수정 : 2005/06/29 · 채택 : 2005/08/01

못하였다.

이에 著者는 cisplatin의 臨毒性 등 副作用이 활성산소와 연관되어 있고 苦參이 항산화작용 및 토끼의 급성신부전을 완화시킨다는 기존의 보고에 착안하여, 苦參이 cisplatin의 抗癌 副作用을 抑制할 수 있을 것으로 추정하고, 癌誘發 白鼠 病態模型에 cisplatin과 苦參을 병용투여한 후 體重 및 抗癌效能, 體重 對比 脾·心臟 重量比에 미치는 影響과 心臟/筋肉機能(CK ; creatin kinase), 脾臟機能(AMY ; amylase)에 미치는 效果를 觀察을 한結果 有意性이 있어 報告하는 바이다.

재료 및 방법

1. 동물 및 재료

1) 동물

動物은 體重 240~260g의 4週齡 C57BL/6 mouse 수컷(대한바이오링크, 충북, 음성)을 使用하였고, 물과 펠렛飼料(제일사료 Co., 대전)를 자유롭게 먹도록 하였으며, 飼育室內의 溫度는 21~24°C, 濕度는 40~60%로 維持하였고, 낮과 밤의 週期는 각각 12時間으로 하였으며, 實驗室 環境에 2週間 適應시킨 後 使用하였다.

2) 재료

苦參(Sophora flavescens Ait.)은 대구한의대학교 부속대구 한방병원 약제과에서 300g을 구입하여, -20°C에 보관한 후 필요할 때에 추출하여 사용하였다. 기타 시약들은 Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, USA)로부터 구입하였다.

2. 방법

1) 시료의 조제

乾燥시킨 韓藥材 200g에 증류수 1ℓ를 가하여 2시간동안 열수 추출하였다. 추출액을 체로 거르고 증류수 1ℓ를 가하여 재차 추출하였다. 추출액을 다시 체로 거른 후 3,000rpm으로 5분간 원심분리하여 잔사를 제거한 후, 상정액을 Rotary evaporator (Buchi, R-114)를 사용하여 70°C로 가열하면서 60cmHg에서 약 150ml 까지 농축하였다. 이것을 25ml씩 나누어 -70°C에서 얼린 후 동결건조기(일신, Bondiro)를 이용하여 -55°C, 10mTorr의 조건에서 용매를 완전히 제거한 추출물을 얻은 후 밀봉된 tube에 넣어 보관하였다.

2) 세포배양

B16-BL6 세포주는 MD Anderson Cancer Center (Texas, USA)의 I.J. Fidler 박사로부터 제공받았으며, 5 % FBS(fetal bovine serum)을 포함한 DMEM 배지에서 배양되었고 passage number가 30회 이내의 것이 사용되었다.

3) 실험동물의 암 유발

C57BL/6 mouse의 오른쪽 옆구리의 털을 깎은 후, B16-BL6 melanoma 세포를 한 마리당 $5 \times 10^5 \sim 10^6$ cell 씩 0.1ml의 부피로 피하에 주사하였다. 7일 후 뚜렷한 종양이 피부에 형성된 것을 보고, cisplatin과 苦參抽出物을 투여하였다.

4) 실험군 분류 및 처치

각각의 實驗群은 10마리로 하여, 對照群(Control)은 B16-BL6

melanoma 세포를 피하에 주사한 군이며, 處置群은 cisplatin群, 苦參群 및 cisplatin+苦參群으로 암 유발 mouse에 다음과 같이 처치하였다. cisplatin群은 cisplatin을 2mg/kg의 용량으로 매일 1회씩 4일간 복강 주입한 군이고, 苦參群은 苦參抽出物을 각각 복강주사 5일전부터 500mg/kg/day로 복강주사개시 후 4일째까지 9회 경구 투여하였으며, cisplatin+苦參群은 상기의 방법과 같이 동시에 시행한 군이다. 실험동물을 하루 절식시킨 후 5일째 되는 날 mouse의 무게를 재고 마취시킨 후, 개복하여 肿瘍의 무게를 측정하였다.

5) 혈액생화학 분석

혈액을 5,000rpm으로 5분간 원심분리하여 혈장을 분리하였다. 상청액을 새로운 tube로 옮기고, 10,000rpm으로 2분간 다시 원심분리하여, 혈장 중의 세포를 완전히 제거하였다. 이렇게 얻어진 혈장을 -20°C에 저장하였다가 생화학분석에 사용하였다. 생화학 분석기(Synchron CX, Coulter, USA)를 사용하여 心臟/筋肉機能(CK), 脾臟機能(AMY) 등을 측정하였다.

6) 통계처리

SPSS 9.0을 사용하여 일원배치 분산분석과 사후검정으로 LSD test에 의해 수행하였고, 유의수준 p<0.05로 검정하였다.

성 적

1. 체중에 미치는 영향

對照群에 비해 cisplatin群과 cisplatin+苦參群은 有意한 體重의 減少를 보였으나, 苦參群의 경우에는 對照群과 유사한 體重을 보였다. cisplatin+苦參群의 경우 cisplatin群에 비해 약간의 體重增加를 보였으나 有意性은 없었다(Table 1).

Table 1. Effect of *Sophora flavescens* on body weight reduction induced by cisplatin

	Control	cisplatin	<i>Sophora flavescens</i>	cisplatin + <i>Sophora flavescens</i>
Body Weight(g)	24.2 ± 1.58 ^a	17.1 ± 0.32 ^b	23.7 ± 1.01 ^a	17.8 ± 0.72 ^b

Each data is Mean ± s.e.m.

2. 종양의 크기에 미치는 영향

腫瘍의 크기는 對照群에 비하여 cisplatin群과 cisplatin+苦參群에서 有意性 있는 減少를 보였으나, 苦參群은 對照群과 有意한 차이를 보이지 않았다. 그리고 cisplatin+苦參群과 cisplatin群 간에는 有意性이 인정되지 않았다(Table 2).

Table 2. Effect of *Sophora flavescens* on antitumor activity of cisplatin

	Control	cisplatin	<i>Sophora flavescens</i>	cisplatin + <i>Sophora flavescens</i>
Tumor mass(g)	3.12 ± 0.48 ^a	1.07 ± 0.15 ^b	3.68 ± 0.44 ^a	1.85 ± 0.25 ^b

Each data is Mean ± s.e.m.

3. 심장/근육 기능 중 CK에 미치는 영향

對照群에 비해 cisplatin群과 cisplatin+苦參群이 增加되었으

나, 다른 群 간의 有意性은 없었다(Table 3).

Table 3. Effect of *Sophora flavescens* on the concentration of serum CK induced by cisplatin

Control	cisplatin	<i>Sophora flavescens</i>	cisplatin + <i>Sophora flavescens</i>
CK(IU/l) 869.8 ± 164.0 ^a	1237.0 ± 163.1 ^a	875.1 ± 252.8 ^a	1201.6 ± 97.7 ^a

Each data is Mean ± s.e.m.

4. 肺장기능 중 AMY에 미치는 영향

對照群에 비해 cisplatin群과 cisplatin+苦參群은 有意性있게增加하였으며, 苦參群은 有意性이 없었다. Cisplatin群에 비해 cisplatin+苦參群이 有意性있게 減少하였다(Table 4).

Table 4. Effect of *Sophora flavescens* on the increase of serum AMY induced by cisplatin

Control	cisplatin	<i>Sophora flavescens</i>	cisplatin + <i>Sophora flavescens</i>
AMY(IU/l) 1175 ± 34.7 ^a	3565 ± 137.9 ^b	1266 ± 85.1 ^a	1965 ± 175.2 ^a

Each data is Mean ± s.e.m.

고 찰

癌은 우리 몸을 구성하는 기본 단위인 細胞가 그 정상적인 調節機能의 範疇와 주위 臟器의 정상적인 영향력을 벗어나 自律성을 지니고 非可逆의로 過剩 增殖을 하는 것으로, 臨床 및 病理形態의 소견에 의하여 良性腫瘍과 惡性腫瘍으로 구분된다³⁵⁾.

이 중 일반적으로 癌이라고 하는 모든 惡性腫瘍은 빠른 成長, 浸潤, 체내 각 부위로의 擴散 및 轉移 등과 같은 특성이 있어 生命에 위험을 초래한다. 우리나라에서도 癌에 의한 死亡率이 최근 20년 간 꾸준한 상승을 보여 전체 死亡原因 1위를 차지하면서 국민보건을 위협하는 가장 큰 요인이 되고 있다^{1,35-36)}.

韓醫學에서 癌은 外感六淫, 內傷七情, 飲食不節, 過勞 및 邪毒 등에 의하여 개체의 臟腑機能 및 氣血이 失調되어 氣滯血瘀, 痰結濕聚, 熱毒蘊結, 正氣虛弱, 經絡瘀阻 등의 病理變化가 單獨 혹은 相互錯雜 되면서 氣機不通하고 聚集日久하여 發生하는 만성적인 痘瘍³⁵⁾으로 볼 수 있다.

韓醫學에서 癌治療는 病因, 病位 및 환자의 상태 등에 따라 陰陽氣血과 臟腑의 虛實에 근거하여 益氣健脾, 滋陰補血, 養血生津, 溫補脾腎 등을 위주로 하는 扶正固本法³⁵⁾과 行氣理血, 活血化瘀, 清熱利濕, 軟堅散結하는 攻邪法³⁵⁾ 및 이 두 가지 방법을 동시에 사용하는 扶正祛邪法³⁵⁾ 등의 세 가지로 대별된다.

한편, 西洋醫學에서 癌에 대한 치료는 外科의 手術法, 免疫療法, 放射線療法, 化學療法 등이 활용되고 있으며, 그 중에서도 抗癌劑에 의한 化學療法가 가장 많이 활용되고 있다³⁶⁾. 그러나 抗癌劑가 癌細胞 뿐만 아니라 정상세포까지도 독성을 나타내어 肺瘍細胞를 殺滅하는 동시에 골수조혈기능을 抑制하고, 소화기관 및 전신에 반응하여 副作用을 유발하여 인체의 免疫機能을 저하시키는 문제점이 있다³⁶⁾. 이에 따라 抗癌劑의 副作用을 減少시킬 수 있는 치료법의 개발이 요구되고 있다.

化學療法劑가 다른 약물과 비교하여 가장 중요한 특징은 유효농도에서 일반적으로 대단히 심각한 副作用이 함께 나타난다는 점이다. 副作用이 심각하므로 化學療法 중의 암환자는 세밀한 관찰을 필요로 하며 副作用이 심각해지기 전에 처치의 강약을 조절하는 것이 필요하다²⁾.

대부분의 抗癌劑에 공통되는 급성 副作用²⁾으로는 造血機能抑制(백혈구減少, 혈소판減少, 빈혈), 메스꺼움 및 구토, 점막 궤양, 탈모증 등을 들 수 있는데, 이러한 副作用들은 化學療法劑들이 암세포와 활발하게 자라는 정상세포(골수조혈세포 및 점막, 피부, 모근의 상피세포)에 구별됨이 없이 작용하기 때문이다.

化學療法劑의 종류별로 특이적인 副作用²⁾으로는 cisplatin의 신장독성, 신경독성, vinca alkaloids의 신경독성, ifosfamide, cyclophosphamide의 출혈성 방광염, anthracycline계의 심근질환, bleomycin의 폐 섬유화, asparaginase의 아나필락시스(알레르기), ifosfamide의 중추신경독성, mitomycin의 용혈성 요독증, procarbazine의 음식과의 상호작용, paclitaxel의 신경독성, 급성민감증, fludarabine, cladribine, pentostatin의 장기적인 세포성 면역의 억제 및 이로 인한 기회감염 등을 들 수 있다.

그 중 백금착화합물로서 알킬화제인 cisplatin은 고환암, 난소암, 방광암의 치료를 위하여 FDA의 공인을 받은 후 뇌, 부신피질, 유방, 자궁, 자궁경부, 자궁내막, 머리, 목, 식도, 폐, 피부, 전립선, 위, 뼈, 임파선, 영양세포(trophoblast)의 肿瘍에 광범위하게 이용되고 있다. Cisplatin의 특징적인 副作用³⁻⁶⁾으로는 회복 불가능한 急性腎臟損傷이 초래되므로 환자에게 충분한 수분공급과 배설이 수행되어야 한다. 아울러 고용량의 cisplatin 처리 시에는 회복 불가능한 renal tubule의 손상이 발생할 수 있으므로 대단히 조심하여야 한다. 환자의 腎臟機能이 지속적으로 점검되어야 하고 腎臟機能을 나타내는 지표인 혈청 creatinin이 1.5mg/dl 이상으로 올라가는 경우에는 cisplatin 투여가 불가능하다. 그 밖의 副作用으로는 백혈구감소증, 혈소판감소증, 빈혈 등의 조혈계 副作用, 메스꺼움, 구토, 식욕부진, 설사 등의 소화기관계 副作用, 肝otoxicity, 神經系 副作用, 청력손상 등이 알려져 있다.

Cisplatin의 腎otoxicity 유발기전은 명확하지 않으나, 활성산소가 직접 작용하거나 또는 지질의 과산화를 통해서 세포막 투과성을 增加시키므로써 세포사를 일으켜 신증후군과 급성사구체신염 등을 일으키는 腎otoxicity 손상의 원인물질로 보고⁷⁻¹¹⁾되고 있으므로, 과산화 억제작용을 가지는 약물이 cisplatin으로 인한 腎otoxicity 등의 副作用을 抑制하는 기능을 가진다고 추정할 수 있다.

최근 韓醫學界에서는 韓藥의 抗癌 작용에 대한 연구와 아울러 東西醫學의 상호보완을 통해 癌治療의 효과를 증대시키고 癌患者의 삶의 질을 높이려는 방향에서 化學療法과 放射線療法의 副作用을 減少시키는 治法 및 處方에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다¹²⁻¹⁷⁾.

苦參은 『神農本草經』¹⁸⁾에 처음 기재된 아래, 無毒味苦하고 心·肝·胃·大腸·膀胱經에 入하여 清熱燥濕, 祛風殺蟲, 利尿 등의 效能이 있어 热痢, 便血, 黃疸尿閉, 赤白帶下, 陰腫陰痒, 濕疹, 濕瘡, 皮膚瘙痒, 疥癬麻風 등의 치료¹⁸⁻²⁰⁾에 多用되어 온 약물이다.

苦參에 대한 최근의 실험연구에서 朴 등²¹⁻²²⁾이 抗酸化作用을, 黃 등²³⁾이 cisplatin으로 유발된 家兔의 급성신부전에 미치는影響을, 金 등²⁴⁾이 糖尿에 미치는 影響을, 韓 등²⁵⁾이 食中毒菌의 증식억제에 미치는 효과를 보고하였다. 그리고 趙 등²⁶⁻²⁸⁾이 抗菌효과를, 權 등²⁹⁾이 家兔의 血管收縮抑制에 미치는 影響을, 權 등³⁰⁻³¹⁾이 심장내피세포와 혈관내피세포에 미치는 影響을, 金 등³²⁾이 적출 심장에 미치는 影響을, 宋 등³³⁾이 메틸水銀의 心筋otoxicity에 대한 影響을, 조 등³⁴⁾이 마우스 백혈병 세포에 대한 세포독성효과를 보고한 바는 있으나, 白鼠의 癌誘發病態模型에 대한 cisplatin의 副作用減少에 관한 報告는 접하지 못하였다.

본 연구에서는 苦參이 抗癌剤 투여로 인한 副作用을 최소화할 수 있는가를 확인하고자, 癌 유발 白鼠 病態模型에 化學療法제인 cisplatin과 苦參을 병용투여한 후 體重 및 抗癌效能, 心臟/筋肉機能(CK), 脾臟機能(AMY)에 미치는 효능을 측정하였다.

먼저 體重에 미치는 影響에서는 對照群에 비해 cisplatin群과 cisplatin+苦參群은 有意한 體重의 減少를 보였으나, 苦參群의 경우에는 對照群과 유사한 髐重을 보였다. cisplatin+苦參群의 경우 cisplatin群에 비해 약간의 髐重增加를 보였으나 有意性은 없었다.

腫瘍의 크기에 있어서는 對照群에 비하여 cisplatin群과 cisplatin+苦參群에서 有意性있는 減少를 보였으나, 苦參群은 對照群과 有意한 차이를 보이지 않았다. 그리고 cisplatin+苦參群과 cisplatin群 간에는 有意性이 인정되지 않았다. 이를 볼 때 苦參 자체의 抗癌效果는 뚜렷하지 않은 것으로 觀察되었다.

心臟/筋肉 기능을 나타내는 CK³⁵⁾는 원발성 근질환이나 심근경색의 진단에 중요하다고 알려져 있으며, creatine phosphate의 합성 분해를 촉매 하는 반응에 관여한다. Creatine phosphate는 근육 수축에 관여하는 energy원으로서 불가결한 것이다. CK의 생체 내 분포는 골격근, 심근, 뇌, 및 평활근에 고농도로 존재하고 있으며, 최근에는 심근경색을 중심으로 한 심장질환에서 유용성이 확립되었고, 또한 중추 신경계 및 뇌 분비 질환에서도 CK 활성을 널리 측정하게 되었다. 그러므로 CK 활성 측정의 임상적 의의는 심근경색의 조기 진단 상 유용한 효소이며, 특히 치료 측면에서도 긴급을 요하는 검사이다. 그러므로 혈청 CK 활성 측정으로 이 효소가 많이 함유된 장기의 손상 또는 세포막의 투과성 변화를 파악할 수 있다. 심장 및 근육기능의 지표인 CK 수치를 비교한 결과 對照群에 비해 cisplatin群과 cisplatin+苦參群이 增加되었으나, 다른 群 간의 有意性은 없었다.

脾臟機能의 진단에 유용한 AMY³⁵⁾는 전분이나 glycogen 같은 다당류처럼 1,4-a-D-glucoside 결합이 분자 내에 최소 3개를 소유한 dligpsaccaride까지 작용하여 glucoside 결합을 maltose까지 가수분해하는 효소로 사람의 주요 생산 장기는 脾臟과 타액선이다. 이 AMY는 1929년에 Elman에 의해 급성 脾臟염 진단에서 AMY 활성 측정의 유용성이 밝혀졌다. 그 이후로 혈청 AMY 측정은 급성脾臟염, 만성 脾臟염 진단 및 脾臟암을 진단하거나 경과 관찰에 유일한 지표로 이용되어 지금까지 脾臟기능의 중요한 지표로 사용되고 있다.

脾臟機能에 미치는 影響에서 AMY 수치를 비교한 결과 對照群에 비해 cisplatin群과 cisplatin+苦參群은 有意性있게 增加

하였으며, 苦參群은 有意性이 없었다. Cisplatin群에 비해 cisplatin+苦參群이 有意性있게 減少하였다. 苦參은 cisplatin의 脾臟毒性을 완전히 抑制하는 못하였지만, 의미있는 抑制效果를 보여주었다. 苦參群은 對照群과 같은 수치를 보여 苦參 자체의 脾臟毒性은 없는 것으로 관찰되었다.

본 실험의 결과 苦參은 抗癌剤 cisplatin 투여 시 나타나는 副作用을 어느 정도 減少시키는 것으로 나타나, 抗癌剤 투여 환자에 苦參 병용투여로 副作用을 改善시키는 效果가 있음을 의미하나, 자세한 機轉을 규명하기 위해서는 향후 더 많은 연구가 진행되어야 할 것으로 여겨진다.

결 론

苦參이 화학요법 항암제 cisplatin의 副作用을 감소시키는지를 알아보자, 癌 유발 白鼠 病態model에 cisplatin과 苦參을 병용투여한 후 髐重 및 抗癌效能, 心臟/筋肉機能(CK), 脾臟機能(AMY)에 미치는 效果를 觀察을 한結果 다음과 같은 결론을 얻었다. 髐重에 미치는 影響에서 對照群에 비해 cisplatin群은 有意한 髐重의 減少를 보였으나, cisplatin+苦參群의 경우 cisplatin群에 비해 약간의 髐重增加를 보였으나 有意性은 없었다. 腫瘍의 크기는 對照群에 비하여 cisplatin群은 有意性있는 減少를 보였으나, cisplatin+苦參群과 cisplatin群 간에는 有意性이 인정되지 않았다. 心臟/筋肉 機能 중 CK는 對照群에 비해 cisplatin群은 增加되었으나, 다른 群 간의 有意性은 없었다. 脾臟機能 중 AMY는 對照群에 비해 cisplatin群은 有意性있게 增加하였으며, cisplatin群에 비해 cisplatin+苦參群이 有意性있게 減少하였다. 骨髓內 有核細胞 數는 正常群에 비해 cisplatin群은 減少되었으나, cisplatin+苦參群은 cisplatin群에 비해서 현저한 增加를 보였다.

참고문헌

1. 통계청. 2003년 사망원인통계연보. 대전:통계청. 22-24, 2004.
2. Skeel, R.T. Handbook of Cancer Chemotherapy Fifth Ed. Lippincott Williams & Wilkins. pp 34-55, 89-91, 1999.
3. Borch, R.F. The platinum antitumor drugs. In : Powis G, Prough, R.A., eds. Metabolism & Action of Anticancer Drugs. London:Taylor & Francis. pp 163-193, 1987.
4. Madias, N.E., Harrington, J.T. Platinum nephrotoxicity. Am J Med. 65(2):307-314, 1978.
5. Garnick, M.B., Mayer, R.J., Abelson, H.T. Acute renal failure associated with cancer treatment. In : Brenner, B.M., Lazarus, J.M. eds. Acute Renal Failure. New York : Churchill Livingstone. pp 621-657, 1988.
6. Kim, Y.K., Byun, H.S., Kim, Y.H., Woo, J.S., Lee, S.H. Effect of cisplatin on renal function in rabbits:Metabolism of reduced glucose reabsorption. Toxicol Appl Pharmacol. 130(1):19-26, 1995.

7. Sugihara, K., Nakano, S., Koda, M., Tanaka, K., Fukuishi, N., Gembra, M. Stimulatory effect of cisplatin on production of lipid peroxidation in renal tissues. *Jpn J Pharmacol.* 43(3):247-252, 1987.
8. Hannemann, J., Duwe, J., Baumann, K. Iron-and ascorbic acid-induced lipid peroxidation in renal microsomes isolated from rats treated with platinum compounds. *Cancer Chemother Pharmacol.* 28(6):427-433, 1991.
9. Brady, H.R., Zeidel, M.L., Kone, B.C., Giebisch, G., Gullans, S.R. Differential actions of cisplatin on renal proximal tubule and inner medullary collecting duct cells. *J Pharmacol Exp Ther.* 265(3):1421-1418, 1993.
10. Anderson, M.E., Naganuma, A., Meister, A. Protection against cisplatin toxicity by administration of glutathione ester. *FASEB J.* 41(14):3251-3255, 1990.
11. Montine, T.J., Borch, R.F. Role of endogenous sulfur-containing nucleophiles in and in vitro model of cis-diamminedichloro-platinum(II)-induced nephrotoxicity. *Biochem Pharmacol.* 39(11):1751-1757, 1990.
12. 김한섭, 흥순복, 성현제, 문근아, 윤유식. 녹혈의 化學療法 抗癌劑 副作用 抑制 效能. 생약학회지. 34(2):145-149, 2003.
13. 조수인, 김형우. Cisplatin 유도 신장독성에 대한 蓼根 추출물의 보호 효과. 대한본초학회지. 18(4):127-134, 2003.
14. 이경태, 노영수, 안규석, 장성구, 정지창. 생약제제인 이공산(異功散)의 Cisplatin 유도 신장독성 보호 효과. 생약학회지. 29(3):258-264, 1998.
15. 안창범, 권혜연, 윤현민, 장경진, 송준호. 黃芩藥鹼液이 Cisplatin에 의해 유발된 急性腎不全에 미치는 影響. 大韓鍼灸學會誌. 19(3):156-167, 2002.
16. 박춘하, 채우석, 윤여총. 車前子藥鹼이 Cisplatin에 의해 유발된 급성신부전에 미치는 影響. 대한침구학회지. 21(2):155-164, 2004.
17. 조종관. 消積白朮散의 抗癌效果 및 cisplatin副作用 減少에 미치는 影響. 대전대논문집. 4(2):255-272, 1996.
18. 孫星衍. 神農本草經. 山西省: 山西科學技術出版社. pp 18, 61, 1991.
19. 전국한의과대학본초학교수. 본초학. 서울: 永林社. pp 156-185, 1994.
20. 江蘇中醫學院. 中藥大辭典. 서울:大星出版社. 1316-1318, 1992.
21. 박용기, 강병수. 蔷薇仁과 苦參의 抗酸化作用에 關한 研究. 대한본초학회지. 15(2):57-67, 2000.
22. 박용기. 葛花와 麻金 및 苦參의 抗酸化作用에 關한 比較研究. 대한본초학회지. 16(1):41-53, 2001.
23. Hwang, W.M., Jeong, J.C. Effect of Salviae Radix extract on renal function in cisplatin-intoxicated rabbits. 한방성인병학회지. 5(1):234-244, 1999.
24. 김진철, 김미려, 양재하, 최종백. 苦參이 糖尿에 미치는 影響에 關한 實驗的 研究. 동서의학. 16(3):47-67, 1991.
25. 한자숙, 신동화. Listeria monocytogenes의 증식抑制에 미치는 뽕나무 및 고삼 예탄을 추출물의 分획별 효과. 한국식품과학회지. 26(5):539-544, 1994.
26. 조훈, 원성란, 양은영, 김종수, 유일수, 류도곤 외. 고삼추출물의 항균효과. 약학회지. 43(4):419-422, 1999.
27. 백승화, 강길웅, 최은영. 고삼 메탄을 추출물의 항균효과에 관한 연구. 기초과학연구지. 118(1):111-114, 2000.
28. 이현옥, 이경희, 박남규, 정승일, 백승화, 한동민. 고삼의 Streptococcus mutans에 대한 항세균 효과. 한국식품영양학회지. 13(6):539-546, 2000.
29. 권오율, 남창규, 정찬길. 고삼이 家兔의 血管收縮抑制에 미치는 影響. 세명대학교 한의학연구소 논문집. 2:41-54, 1999.
30. 권강범, 박천수, 김인규, 김현규, 최기방, 김용복 등. 苦參 추출물이 배양 심장내피세포에 미치는 影響. 동의생리병리학회지. 17(1):220-224, 2003.
31. 권강범, 이호승, 김인수, 김인규, 류도곤. 苦參 추출물이 XO/HX에 의해 손상된 血管內皮細胞에 미치는 影響(I). 동의생리병리학회지. 17(2):549-552, 2003.
32. 김상범, 권강범, 박준수, 박관하, 류도곤. 苦參 유기용매 분획 층이 적출 심장에 미치는 影響. 동의생리병리학회지. 16(1):160-164, 2001.
33. 송호준, 하대호, 유교상, 박승택, 이강창, 서부일. 鎏銀의 心筋毒性에 대한 苦參의 影響. 대한본초학회지. 17(2):119-124, 2002.
34. 조훈, 양은영, 김종수, 유일수, 류도곤, 강길웅 등. L1210 및 P388D1에 대한 고삼 메탄을 추출물의 세포독성에 관한 연구(II). 생약학회지. 30(4):351-354, 1999.
35. 이귀녕, 이종순, 임상병리파일. 서울의학문화사. pp 234, 285. 1999.