

東醫寶鑑 中 黃連解毒湯의 活用に 대한 研究

김형률·이상현·윤용갑
원광대학교 한의과대학 방제학교실

A Study on Application of Hwangnyeonhaedok-tang Blended Prescriptions in Dongeuibogam

Hyeong-Yul Kim · Sang-Hyun Lee · Young-Gab Yun

The results of documentary survey of 81 prescriptions of Hwangnyeonhaedok-tang and Hwangnyeonhaedok-tang blended ones introduced in Dongeuibogam in which there are 42 of prescriptions using Hwangnyeonhaedok-tang as main constituent and 39 of prescriptions using Hwangnyeonhaedok-tang as assistant constituent can be summarized as followings.

1. Hwangnyeonhaedok-tang blended prescriptions using Hwangnyeonhaedok-tang as main constituent are applied to 20 categories of disease such as 7 of external disease from the chapters of various dermatosis, various injury, tumor(16.6%), 5 of fire disease from the chapter of fire(12%), 5 of eye diseases from the chapter of eye(12%), 4 of disease originated from damage by coldness from the chapter of coldness(9%), etc.
2. It has been found that mainly considered causative agents in diseases, when making up Hwangnyeonhaedok-tang blended prescriptions using Hwangnyeonhaedok-tang as main constituent, are feverish toxin in internal organs, followed by exogenous damp and fever, feverish toxin from damage by coldness and more such as extravasated blood, damp toxin, lack of ki and blood, lack of yin, congestion, the seven passions, blood overflow and excess liquor and sex.

Key words : Hwangnyeonhaedoktang, Dongeuibogam, blended prescriptions

1. 緒 論

黃連解毒湯은 外臺秘要의 崔氏方에 처음 수록된 方劑로 構成藥物은 黃連·黃芩·黃柏·山梔子 등 4가지이다¹⁾. 구성약물 중 黃連은 心火와 中焦의 火를 瀉하고, 黃芩은 上焦의 火를 瀉하며, 黃柏은 下

교신저자 : 윤용갑. 전북 익산시 신용동 344-2
원광대학교 한의과대학 방제학교실
(Tel : 063-850-6834 E-mail : yunyg@wonkwang.ac.kr)
• 접수 2009/02/27 • 수정 2009/03/25 • 채택 2009/04/03

焦의 火를 瀉하고, 梔子は 三焦의 火를 瀉하여 導火下行 하므로 전체적으로는 瀉火解毒 清化濕熱하는 효능을 발휘한다²⁻¹⁰. 그러므로 黃連解毒湯은 三焦의 實火를 치료하는 基本處方으로써 一切實熱火毒之症, 大熱煩燥, 口燥咽乾, 錯語不眠, 或熱病吐血, 衄血, 或熱甚發斑, 身熱下痢, 濕熱黃疸, 外科膿瘍疔毒, 小便黃赤, 因飲酒復劇, 舌紅苔黃, 脈數有力한 症狀 等의 치료에 널리 사용되어왔다^{1-5,8,11-25}.

최근의 연구보고에 의하면 黃連解毒湯이 腦血流增加, 降壓, 解熱, 抗粥狀動脈硬化, 微細循環調節, 抗潰瘍, 止瀉, 抗菌, 鎮痛消炎, 抗酸化 등의 藥理作用이 있어²⁶⁻²⁹ 肝炎, 肝硬化, 脂肪肝, 吐血, 下血, 咯血, 敗血症, 膿毒血症, 咽喉炎, 扁桃腺炎, 高血壓, 腦血管疾患, 中風後遺症, 痢疾, 肺炎, 泌尿器系 炎症, 急性胃腸炎, 更年期障礙, 神經症, 精神病, 不眠症, 帶狀疱疹, 알레르기성 皮膚炎, 酒齧鼻 등의 여러 질환^{2,8,28,30-36}에 활용하고 있다.

한편 東醫寶鑑에서의 黃連解毒湯은 黃連·黃芩·黃栢·山梔子 各 1.25錢으로 구성되어 있어 外臺秘要에 수록된 構成藥物의 사용량과는 다소 차이가 있으며, 外臺秘要和 비슷하게 "傷寒 大熱煩躁 不得眠 或差後 飲酒復劇者 及一切熱毒을 치

료한다"고 하였다. 東醫寶鑑에서의 黃連解毒湯 및 그 連繫方은 瘡瘍, 癰疽, 火, 眼科, 傷寒, 出血, 婦人病 등의 20개의 治療領域에서 사용되었고, 惡瘡, 癩癧, 天疱瘡, 湯火瘡, 杖傷, 癰疽, 三焦火, 上焦熱, 火熱, 外障, 翳膜, 傷寒譫語, 傷寒昏沈, 少陰熱痢 등 33개의 病症치료에 활용되고 있다³⁷⁻³⁹. 이와 같이 다양한 治療領域과 病症에 黃連解毒湯 및 그 連繫方을 사용하고 있는 바, 이에 저자는 東醫寶鑑에 수록된 黃連解毒湯 및 그 連繫方 중에서 黃連解毒湯이 主方으로 사용된 42종의 處方과 輔助方으로 사용된 39종의 處方을 합한 총 81종의 處方分析을 통하여 黃連解毒湯의 治療領域, 病症 및 主治, 病因, 病機, 處方構成內容과 黃連解毒湯의 활용에 대한 方劑學的 知見을 얻었기에 보고하는 바이다.

II. 本 論

1. 黃連解毒湯의 連繫方 區分

1) 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 경우

東醫寶鑑에서 활용하고 있는 黃連解毒湯 連繫方 중 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 42개 處方을 構

표(1) 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 處方들의 構成藥物別 분류

區分	處方名	引用處方數
黃連, 黃芩, 黃栢, 梔子 가 모두 포함된 경우	加味金花丸, 加味四物湯, 當歸羌活湯, 赴宴散, 速效散, 柴胡連翹湯, 退黃散, 解毒四物湯, 解毒湯, 黃連解毒湯, 黃連解毒湯(2)	11
黃連이 빠진 경우	茵陳大黃湯	1
黃芩이 빠진 경우	葵花散, 保精湯, 清腸湯, 黃連阿膠湯	4
黃栢이 빠진 경우	芩連半夏湯, 陶氏導赤各半湯, 陶氏生地芩連湯, 三黃湯, 洗肝明目湯, 連翹散, 龍膽湯, 地榆散, 清衄湯, 解毒丸, 化痰清火湯, 黃芩湯	12
梔子が 빠진 경우	芩朮梔皮丸, 綠雲膏, 大金花丸, 大明復光散, 瀉陽補陰湯, 四黃散, 三補丸, 三黃熟艾湯, 消風敗毒散, 連栢益陰丸, 五黃膏, 五黃散, 解毒金花散, 黃連消毒散	14
합계		42

成藥物별로 분류하여 보면 다음 표(1)과 같다. 단, 여기서 主方이라 함은 黃連解毒湯을 구성하고 있는 黃連, 黃芩, 黃柏, 梔子 등의 藥物이 사용량에서나 效能에서 君臣의 역할을 하고 있는 處方으로 한정하였다. 處方名은 같고 構成이나 主治가 다른 처방은 (2) 라고 표시하여 구분하였다.

2) 黃連解毒湯이 輔助方으로 사용된 경우

東醫寶鑑에서 활용하고 있는 黃連解毒湯 連繫方 중 黃連解毒湯이 輔助方으로 활용된 39개 處方을 構成藥物별로 분류하여 보면 다음 표(2)와 같다. 단, 여기서 輔助方이라 함은 黃連解毒湯을 구성하고 있는 黃連, 黃芩, 黃柏, 梔子 등이 사용량에서

표(2) 黃連解毒湯이 輔助方으로 활용된 處方들의 構成藥物別 분류

區分	處方名	引用處方數
黃連, 黃芩, 黃柏, 梔子 가 모두 포함된 경우	祛風至寶丹, 三黃石膏湯, 三黃敗毒散, 龍虎湯, 清熱解毒湯, 清臟湯, 通明利氣湯	7
黃連이 빠진 경우	瀉白湯	1
黃芩이 빠진 경우	없음	0
黃柏이 빠진 경우	內疎黃連湯, 保中湯, 茯苓滲濕湯, 莎芎散, 瀉心湯, 三黃解毒丸, 生地芩連湯, 龍膽瀉肝湯, 清涼散, 清上防風湯, 清心湯, 清胃湯, 清咽利膈散, 清火湯, 清火化痰湯, 清火豁痰丸, 黃連通聖散, 回春涼膈散	18
梔子が 빠진 경우	救苦湯, 當歸六黃湯, 木香檳榔丸, 散腫潰堅湯, 三補枳朮丸, 升陽益胃散, 神奇散, 涼膈元, 涼血地黃湯, 清經四物湯, 清上瀉火湯, 打膿散, 五瘟丹	13
합계		39

표(3) 黃連解毒湯 連繫方의 治療領域 區分

治療領域	處方名	處方數	頻度數
外科疾患(諸瘡門, 諸傷門, 癰疽門)	葵花散, 綠雲膏, 消風敗毒散, 四黃散, 五黃散, 黃連消毒散, 當歸羌活湯	7개	16.6%
火熱病(火門)	加味金花丸, 大金花丸, 三補丸, 黃芩湯, 黃連解毒湯(2)	5개	12%
眼科疾患(眼門)	洗肝明目湯, 五黃膏, 速效散, 大明復光散, 連栢益陰丸	5개	12%
傷寒病(寒門)	柴胡連翹湯, 黃連解毒湯, 陶氏導赤各半湯, 三黃熟艾湯	4개	9%
出血性疾患(血門)	陶氏生地芩連湯, 清衄湯, 清腸湯	3개	7%
婦人科疾患(胞門, 婦人門)	解毒四物湯, 芩連半夏湯, 芩朮樗皮丸	3개	7%
大便病(大便門)	地榆散, 解毒金花散, 黃連阿膠湯	3개	7%
口舌病(口舌門)	三黃湯, 赴宴散	2개	5%
黃疸(黃疸門)	茵陳大黃湯, 退黃散	2개	5%
頭痛(頭門)	加味四物湯	1개	2.4%
內傷(內傷門)	化痰清火湯	1개	2.4%
下藥(下門)	解毒丸	1개	2.4%
面部疾患(面門)	連翹散	1개	2.4%
耳部疾患(耳門)	龍膽湯	1개	2.4%
精(精門)	保精湯	1개	2.4%
虛勞(虛勞門)	瀉陽補陰湯	1개	2.4%
後陰(後陰門)	解毒湯	1개	2.4%
합계		42개	100%

나 效能에서 佐使의 역할을 하고 있는 것으로 한정하였다.

2. 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 분석

1) 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 治療區分

東醫寶鑑중 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 42종

의 黃連解毒湯 連繫方을 각 治療領域으로 구분하여 보면 다음 표(3)과 같다.

2) 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 病症調査

東醫寶鑑중 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方을 각 病症별로 구분하여 보면 다음 표(4)와 같다.

표(4) 黃連解毒湯 連繫方의 病症調査

病症	處方名	治療領域
有名無名諸惡瘡 瘰癧 天疱瘡 湯火瘡 杖傷 癰疽 癰疽五發證	葵花散 綠雲膏 消風敗毒散 四黃散 五黃散 黃連消毒散 當歸羌活湯	外科疾患 (諸瘡癰疽)
三焦火 上焦熱 火熱	加味金花丸, 大金花丸, 三補丸 黃芩湯 黃連解毒湯(2)	火熱病
外障 通治眼病 翳膜	洗肝明目湯, 五黃膏, 速效散 大明復光散 連栢益陰丸	眼科疾患
傷寒譫語鄭聲 差後昏沈 少陰病熱痢	柴胡連翹湯, 黃連解毒湯 陶氏導赤各半湯 三黃熟艾湯	傷寒病
衄血 尿血	陶氏生地芩連湯, 清衄湯 清腸湯	出血性疾患
崩漏 惡阻 帶下	解毒四物湯 芩連半夏湯 芩朮樗皮丸	婦人科疾患
膿血痢	地榆散, 解毒金花散, 黃連阿膠湯	大便
口甘 口舌瘡糝付藥	三黃湯 赴宴散	口舌病
黃疸通治藥	茵陳大, 黃湯退黃散	黃疸
氣厥頭痛	加味四物湯	頭痛
嘈雜	化痰清火湯	內傷
下藥	解毒丸	下藥
面上雜病	連翹散	面部疾患
耳聾	龍膽湯	耳部疾患
夢泄	保精湯	精
陰虛	瀉陽補陰湯	虛勞
臟毒	解毒湯	後陰

丑(5) 黃連解毒湯 連繫方의 主治調査

主治	處方名	病症
一切熱瘡	葵花散	有名無名諸惡瘡
瘰癧	綠雲膏	瘰癧
天疱楊梅瘡初起	消風敗毒散	天疱瘡
湯火熱油 所傷皮爛肉痛	四黃散	湯火瘡
杖瘡止痛	五黃散	杖傷
癰疽發腦發背腫毒 發麻木不痛宜先灸之服此藥	黃連消毒散	治癰疽大法
五發癰疽 膏梁熱鬱者最宜	當歸羌活湯	癰疽五發證
瀉三焦火 止嗽化痰 清頭目	加味金花丸	三焦火
三焦火熱	大金花丸	三焦火
去三焦積熱 瀉五藏火	三補丸	三焦火
心肺蘊熱 口瘡咽痛 小便淋濁	黃芩湯	上焦熱
通治火熱 及大熱煩燥 并三焦實火	黃連解毒湯(2)	火熱
一切風熱 眼目赤腫疼痛	洗肝明目湯	外障
目赤腫痛	五黃膏	外障
努肉紅綠 紅白翳障 及白珠上有死血 紅筋 或上臉胞腫如桃 日夜疼痛昏暗	速效散	外障
一切眼疾 內外障	大明復光散	通治眼病藥
膀胱肝腎經 鬱遏不通於目 青白翳見大眥	連栢益陰丸	翳膜
傷寒發熱 譫語呻吟 睡臥不得	柴胡連翹湯	傷寒譫語鄭聲
傷寒 大熱 煩躁 不得眠 或差後 飲酒復劇者 及一切熱毒 差後昏沈	黃連解毒湯	傷寒譫語鄭聲
傷寒大下 熱利不止	陶氏導赤各半湯	差後昏沈
鼻衄成流不止 失血過多 譫語 失神 閉目 撮空 不省人事	三黃熟艾湯	少陰病熱病
衄血	陶氏生地芩連湯	衄血
尿血	清衄湯	衄血
崩漏面黃腹痛	清腸湯	尿血
惡阻病 胸背滿痛	解毒四物湯	崩漏
孕婦 白帶	芩連半夏湯	惡阻
熱毒 下痢膿血	芩朮樗皮丸	帶下
熱毒膿血痢	地榆散	膿血痢
熱毒下痢膿血 或如爛肉汁	解毒金花散	膿血痢
脾熱口甘	黃連阿膠湯	膿血痢
口瘡藥痛	三黃湯	口甘
傷寒大熱 發黃疽	赴宴散	口舌瘡糝付藥
黃疽 身面女金 小便如黃栢汁	茵陳大黃湯	黃疽通治藥
血虛 陰火上衝 頭痛	退黃散	黃疽通治藥
嘈雜	加味四物湯	氣厥頭痛
一切熱毒 癰腫 瘡瘍 咬牙 驚悸	化痰清火湯	嘈雜
面生穀疳 俗名粉刺	解毒丸	下藥
忿怒動膽火 致左耳聾	連翹散	面上雜病
陰虛火動 夜夢遺精	龍膽湯	耳聾
酒色過度 妄泄真陰 以致陰虛火動	保精湯	夢泄
臟毒	瀉陽補陰湯	陰虛用藥
	解毒湯	臟毒

3) 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 主治調査

東醫寶鑑중 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方을 각 主治별로 구분하여 보면 다음 표(5)와 같다.

4) 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 病因·病機 調査

東醫寶鑑중 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方을 각 病因·病機별로 구분하여 보면 다음 표(6)과 같다.

5) 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 處方構成分析

東醫寶鑑중 黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 處方構成 內容調査⁴⁰⁾를 통하여 配合藥物과 合方 및 變方 관계를 조사하여 보면 다음 표(7-1)에서 표(7-10)과 같다.

3. 黃連解毒湯이 輔助方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 處方構成分析

東醫寶鑑중 黃連解毒湯이 輔助方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 處方構成 內容調査⁴⁰⁾를 통하여 配合藥物과 合方 및 變方 관계를 구분하면 다음 표(8-1)에서 표(8-9)과 같다.

표(6) 黃連解毒湯 連繫方의 病因病理 調査

區分	病機	處方名	病症
臟腑	肝臟積熱 心熱 膀胱肝腎經鬱遏 不通於目 心移熱於小腸 妊娠之初 經脈內閉 育養胎息 腸胃沮洳 散入焦膈 脾熱	洗肝明目湯 速效散 連栢益陰丸 清腸湯 芩連半夏湯 三黃湯	外障 外障 腎膜 尿血 惡阻 口甘
六淫	多由肝脾腎風濕熱之毒 因男女房室傳染 濕熱下迫 脾受濕熱 鬱而不行 濕毒甚盛 蘊積熱毒	消風敗毒散 解毒四物湯 退黃散 黃連阿膠湯 解毒湯	天庖瘡 崩漏 黃疸 膿血痢 臟毒
傷寒	陽明熱鬱 陽明病 胃實則譫語 發汗不盡 餘毒在心胞間所致 傷寒大熱	清衄湯 柴胡連翹湯 陶氏導赤各半湯 茵陳大黃湯	衄血 傷寒譫語鄭聲 差後昏沈 黃疸
氣血	鼻通於腦 血上溢於腦 所以從鼻而出 氣血虛而邪氣逆上	陶氏生地芩連湯 加味四物湯	衄血 氣厥頭痛
痰飲	瘀血 胃中痰積 流下滲入膀胱 出於大小腸	地榆散 芩朮樗皮丸	膿血痢 帶下
其他	痰火 陰虛火動 酒色過度 妄泄眞陰 膏梁熱鬱 忿怒動膽火	化痰清火湯 保精湯 瀉陽補陰湯 當歸羌活湯 龍膽湯	嘈雜 夢泄 陰虛 癰疽五發證 耳聾

丑(7-1) 外科疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
葵花散	鬱金 黃連 黃栢 梔子 葵花各等分	黃連解毒湯 去 黃芩 加 鬱金 葵花	有名無名諸惡瘡
綠雲膏	黃連 大黃 黃芩 玄參 黃栢 木鱉子肉 各一錢 香油 一兩 松脂 五兩 豬膽三箇汁 銅綠醋浸一宿 去滓三錢	大金花丸 加 玄參 木鱉子	瘰癧
消風敗毒散	當歸尾 川芎 赤芍藥 升麻 乾葛 黃芩 生地黃 各一錢 黃連 黃栢 連翹 防風 各八分 羌活 金 銀花 甘草 各五分 蟬殼 二箇 初服加大黃 二錢 芒硝 一錢半	升麻葛根湯 防風湯 解毒四物湯類 金銀花散 調胃承氣湯	天疱瘡
四黃散	大黃 黃芩 黃連 黃栢 白芨 各等分	大金花丸 加 白芨	湯火瘡
五黃散	黃丹 黃連 黃芩 黃栢 大黃 乳香 各等分	大金花丸	杖傷
黃連消毒散	黃連 羌活 各一錢二分 黃芩 黃栢 蘘本 防己 桔梗 各七分 生地黃 知母 獨活 防風 連翹 當 歸尾 各六分 人參 甘草 各五分 蘇木 陳皮 澤 瀉 黃芪 各四分	黃連解毒湯 去 梔子 防風湯 保元湯	癰疽
當歸羌活湯	當歸 黃芩 黃連 並酒製 各一錢半 酒黃栢 連翹 防風 羌活 梔子 甘草 各七分 獨活 蘘本 各五 分 澤瀉 三分	黃連解毒湯 防風湯	癰疽五發證

丑(7-2) 火熱病에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
加味金花丸	黃連 黃栢 黃芩並酒炒 梔子 各一兩 大黃煨 人 參 半夏 桔梗 各五錢	黃連解毒湯 大金花丸	三焦火
大金花丸	黃連 黃栢 黃芩 大黃 各等分	黃連解毒湯 去 梔子 加 大黃	三焦火
三補丸	黃芩 黃連 黃栢 各等分	黃連解毒湯 去 梔子	三焦火
黃芩湯	澤瀉 梔子 黃芩 麥門冬 木通 生地黃 黃連 甘 草 各等分	導赤散 黃連解毒湯 去 黃栢	上焦熱
黃連解毒湯(2)	黃連 黃芩 黃栢 梔子 各一錢二分半 連翹 柴胡 赤芍藥 各一錢	黃連解毒湯 加 連翹 柴胡 赤 芍藥	火熱

丑(7-3) 眼科疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
洗肝明目湯	當歸尾 川芎 赤芍藥 生地黃 黃連 黃芩 梔子 石膏 連翹 防風 荊芥 薄荷 羌活 蔓荊子 甘菊 白蒺藜 草決明 桔梗 甘草 各五分	決明散 散熱飲子 回春涼膈散 生料四物湯	外障
五黃膏	黃栢 一兩 黃連 黃芩 黃丹 大黃 各五錢	大金花丸	外障
速效散	黃連 黃芩 黃栢 梔子 連翹 薄荷 荊芥 柴胡 當歸 生地黃 地骨皮 天花粉 蔓荊子 甘 菊 惡實 白蒺藜 草決明 石決明 枳殼 甘草 各五分	黃連解毒湯 回春涼膈散類 清涼散類	外障

丑(7-3) 계속

處方名	處方構成	處方分析	病症
大明復光散	當歸尾酒洗 生乾地黃酒浸 黃栢酒炒 黃連酒炒 黃芩酒炒 柴胡 白朮 枳殼 羌活 防風 荊芥 石膏 甘菊 蟬退 車前子炒 密蒙花 白藜炒 木賊 青箱子炒 石決明 羚羊角 屑甘草 各五分	局方密蒙花散類 二宜丸 散熱飲子 菊花散(2) 密蒙花散類	通治眼病藥
連栢益陰丸	條芩 黃連酒炒 黃栢 知母並鹽酒炒 各一兩 羌活 獨活 五味子 當歸 防風 甘草 各五錢 石決明煨 三錢	益本滋腎丸 防風湯 黃連解毒湯 去 梔子	腎膜

丑(7-4) 傷寒病에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
柴胡連翹湯	柴胡 黃芩 枳殼 赤芍藥 桔梗 瓜蒌仁 梔子仁 連翹 黃連 黃栢 甘草各八分 薑三片	小柴胡湯類 黃連解毒湯 桔梗枳殼湯	傷寒 譫語鄭聲
黃連解毒湯	黃連 黃芩 黃栢 梔子 各一錢二分半	黃連解毒湯	傷寒 譫語鄭聲
陶氏導赤各半湯	黃芩 黃連 梔子 知母 麥門冬 茯神 犀角 人參 滑石 各一錢 甘草 五分 薑 一片 棗 二枚 燈心 一握	黃連解毒湯 去 黃栢 六一散	差後昏沈
三黃熟艾湯	黃芩 黃連 黃栢 熟艾 各一錢半	三補丸	少陰病熱痢

丑(7-5) 出血性疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
陶氏生地芩連湯	生地黃 黃芩 黃連 梔子 川芎 赤芍藥 柴胡 桔梗 犀角鎊 甘草 各一錢 大棗一枚	解毒四物湯類 小柴胡湯類	衄血
清衄湯	當歸 赤芍藥 生地黃 香附子 黃芩 梔子 側柏葉 各一錢 黃連七分 赤茯苓 桔梗 各五分 生甘草 三分 藕節 五箇	四物湯類 黃連解毒湯 去 黃栢 交感丹	衄血
清腸湯	當歸 生地黃 梔子炒 黃連 赤芍藥 黃栢 瞿麥 赤茯苓 木通 篇蓄 知母 麥門冬 各七分 甘草 五分 燈心 一團 烏梅 一箇	五淋散 導赤散 黃連解毒湯 去 黃芩	尿血

丑(7-6) 婦人科疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
解毒四物湯	黃芩 黃連 黃栢 梔子 生乾地黃 當歸 白芍藥 川芎 各一錢	黃連解毒湯 四物湯	崩漏
芩連半夏湯	黃芩 一錢二分半 白朮 半夏 各一錢 赤茯苓 七分半 黃連 陳皮 當歸 梔子 枳殼 香附 人參 蒼朮 縮砂 甘草 各五分 薑 七片	保安白朮散 六君子湯 越鞠丸類	惡阻
芩朮樗皮丸	黃芩 白朮 各三錢 樗根白皮 白芍藥 山茱萸 各二錢半 白芷 黃連 各二錢 黃栢 一錢	黃連解毒湯 去 梔子	帶下

표(7-7) 大便病에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
地榆散	地榆 犀角 黃連炒 葛根 黃芩 各一錢 梔子 五分 薤白 五莖	黃連解毒湯 去 黃栢	膿血痢
解毒金花散	黃連 黃栢 各二錢 白朮 黃芩 赤茯苓 赤芍藥 各一錢	黃連解毒湯 去 梔子	膿血痢
黃連阿膠湯	黃連 阿膠珠 黃栢 梔子 各一錢二分半	黃連解毒湯 去 黃芩	膿血痢

표(7-8) 口舌病에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
三黃湯	黃連 黃芩 梔子 石膏 芍藥 桔梗 陳皮 茯苓 各八分 白朮 甘草 各三分 烏梅 一箇	黃連解毒湯 去 黃栢 異功散類 芍藥甘草湯	口甘
赴宴散	黃連 黃栢 黃芩 梔子 細辛 乾薑各等分	黃連解毒湯 加 細辛 乾薑	口舌瘡 糝付藥

표(7-9) 黃疸에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
茵陳大黃湯	茵陳 梔子 柴胡 黃栢 黃芩 升麻 大黃 各一錢 草龍膽 五分	茵陳蒿湯 黃連解毒湯 去 黃連	黃疸通治藥
退黃散	柴胡 升麻 草龍膽 茵陳 黃連 黃芩 梔子 黃栢 木通 滑石 各一錢 甘草 五分 燈心 一握	黃連解毒湯 六一散	黃疸通治藥

표(7-10) 其他疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
加味四物湯	當歸 川芎 生乾地黃酒炒 黃栢酒炒 知母酒炒 黃芩酒炒 黃連酒炒 蔓荊子 梔子炒 各七分	知栢四物湯 黃連解毒湯	氣厥頭痛
化痰清火湯	南星 半夏 陳皮 蒼朮 白朮 白芍藥 黃連 黃芩 梔子 知母 石膏 各七分 甘草 三分	平陳湯類 黃連解毒湯 去 黃栢 白虎湯 芍藥甘草湯	嘈雜
解毒丸	大黃 黃芩 黃連 梔子 滑石 黑丑頭末 各五錢	黃連解毒湯 去 黃栢 三黃元 大黃牽牛散	下藥
連翹散	連翹 川芎 白芷 片芩 黃連 沙參 荊芥 桑白皮 梔子 貝母 甘草 各七分	黃連解毒湯 去 黃栢 芷貝散	面上雜病
龍膽湯	黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮 牛膽南星 各一錢 草龍膽 香附子 各八分 玄參 七分 青黛 木香 各五分 乾薑炒黑 三分 薑三片	黃連解毒湯 去 黃栢 正氣天香湯類	耳聾
保精湯	當歸 川芎 白芍藥 生地黃 薑汁炒 麥門冬 黃栢酒炒 知母蜜炒 黃連薑汁炒 梔子童便炒 乾薑炒黑 牡蠣煨 山茱萸肉 各五分	知栢四物湯 解毒四物湯類	夢泄

丑(7-10) 其他疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
瀉陽補陰湯	黃栢 鹽水炒 一錢半 天門冬 貝母 黃連薑汁炒 各一錢 杏仁 七分半 知母 生地黃 各七分 紫菀 赤芍藥 各六分 天花粉 桔梗 片苓 當歸 白茯苓 各五分 白朮 二分半 五味子 九枚 梅一箇 燈心 一撮	黃連解毒湯 去 梔子 知栢四物湯類	陰虛用藥
解毒湯	黃連 黃芩 黃栢 梔子 連翹 槐花炒 各一錢 細辛 甘草 各五分	黃連解毒湯	臟毒

丑(8-1) 外科疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
散腫潰堅湯	草龍膽酒洗 六錢 黃芩酒洗半生半炒 一錢 瓜蒌根酒洗 黃栢酒炒 知母酒炒 桔梗 昆布 海藻 各七分 柴胡 六分 灸甘草 三稜酒洗 蓬朮酒炒 連翹 各五分 葛根 白芍藥 當歸梢 各四分 黃連酒洗 升麻 各三分	黃連解毒湯 去 梔子	癰癤
三黃敗毒散	土茯苓 一斤半 防風 荊芥 連翹 白芷 當歸 赤芍藥 黃芩 黃連 梔子 地骨皮 五加皮 白鮮皮 木瓜 苦參 蟬退 金銀花 薏苡仁 白殭蠶 皂角刺 黃栢 白痰藜 川芎(上部倍用) 木通(下部倍用) 甘草 各一兩	黃連解毒湯	天疱瘡
內疎黃連湯	大黃 二錢 連翹 赤芍藥 各一錢半 黃連 黃芩 當歸 梔子 檳榔 各一錢 木香 薄荷 桔梗 各五分	四順清涼飲類 黃連解毒湯 去 黃栢 三黃元	治癰疽大法
打膿散	大黃 五錢 芒硝 一錢半 金銀花 黃芩 黃連 黃栢 當歸尾 各五分 甘草節 穿山甲焦 各三分半 木鱉子 虛者三箇 實者五箇	大金花丸 調胃承氣湯 金銀花散	癰疽五發證
瀉心湯	大黃 一錢半 黃連 黃芩 山梔子 漏蘆 澤蘭 連翹 蘇木 各七分	黃連解毒湯 去 黃栢	心癰
升陽益胃散	連翹 二錢 羌活 藁本 黃芪 灸甘草 各一錢半 知母 生地黃 黃芩 桔梗 生甘草 各一錢 澤瀉 七分 獨活 防風 黃連 黃栢 人參 陳皮 當歸梢 蘇木 酒防己 各五分	防風湯 保元湯 當歸補血湯 坎離丸 三補丸	癰疽內托法
神奇散	黃蠟 三兩 牡蠣 大黃 各三錢 黃連 黃芩 黃栢 金銀花 連翹 各一錢半 穿山甲 三片 土炒木鱉子 三箇去殼	大金花丸	便癰

丑(8-2) 火熱病에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
清火湯	大黃酒蒸 一錢半 桔梗 玄參 各一錢二分 連翹 梔子炒 芒硝 片苓酒炒 黃連酒炒 貝母 天花粉 獨活 前胡 柴胡 赤茯苓 枳殼 各一錢 薄荷 羌活 川芎 各八分 防風 六分 甘草 四分	調胃承氣湯 黃連解毒湯 去 黃栢	三焦火
清心湯	甘草 一錢七分 連翹 梔子 大黃酒蒸 薄荷 黃芩 黃連 各七分 朴硝 五分 竹葉 七片	調胃承氣湯 黃連解毒湯 去 黃栢	上焦熱

표(8-3) 眼科疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
救苦湯	蒼朮 草龍膽 各一錢四分 當歸 甘草 各一錢 川芎 六分 生地黃 黃柏 黃芩 知母 各五分 羌活 升麻 柴胡 防風 藁本 黃連 各三分 桔梗 連翹 細辛 紅花 各二分	知柏四物湯 散熱飲子	眼疼
涼膽元	防風 蘆薈 各一兩 黃連 黃芩 荊芥穗 草龍膽 各五錢 地膚子 黃柏 各二錢半	散熱飲子類 黃連解毒湯 去 梔子	內障

표(8-4) 出血性疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
生地芩連湯	防風 二錢 生地黃 川芎 當歸 各一錢半 赤芍藥 山梔子 黃芩 黃連 各七分	四物湯 黃連解毒湯 去 黃柏	失血眩暈
清熱解毒湯	升麻 二錢 生地黃 一錢半 黃柏 赤芍藥 牡丹皮 各七分 乾葛 黃連 黃芩 桔梗 梔子 連翹 甘草 各五分 薑三片	黃連解毒湯	嘔血吐血
清臟湯	生地黃 一錢 當歸酒洗 地榆 各八分 黃芩 梔子炒黑 黃柏炒 各七分 白芍藥 黃連 側柏葉 阿膠珠 各六分 川芎 槐角炒 各五分	四物湯 黃連解毒湯	便血

표(8-5) 婦人科疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
涼血地黃湯	羌活 防風 柴胡 各一錢 生地黃 當歸 各五分 知母 黃柏 荊芥 細辛 蔓荊子 黃芩 川芎 藁本 黃連 升麻 甘草 各三分 紅花 一分	知柏四物湯類 黃連解毒湯 去 梔子 防風湯 柴胡四物湯	崩漏
清經四物湯	當歸 一錢半 生乾地黃 條芩 香附子 各一錢 白芍藥 黃連 薑汁炒 各八分 川芎 阿膠珠 黃柏 知母 各五分 艾葉 甘草 各三分	知柏四物湯 黃連解毒湯 去 黃芩	調血治法

표(8-6) 口舌病에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
龍膽瀉肝湯	柴胡 一錢 黃芩 七分 生甘草 人參 天門冬 黃連 草龍膽 山梔仁 麥門冬 知母 各五分 五味子 七粒	小柴胡湯類 生脈散 黃連解毒湯 去 黃柏	口苦
回春涼膈散	連翹 一錢二分 黃芩 梔子 桔梗 黃連 薄荷 當歸 生地黃 枳殼 赤芍藥 甘草 各七分	涼膈散類 黃連解毒湯 去 黃柏 桔梗枳殼湯 生料四物湯類	口糜

표(8-7) 咽喉部疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
清涼散	桔梗 一錢半 梔子 連翹 黃芩 防風 枳殼 黃連 當歸 生地黃 甘草 各七分 薄荷 白芷 各三分 燈心 一團 細茶 一撮	甘桔湯 回春涼膈散	單乳蛾雙乳蛾 喉痺
清咽利膈散	桔梗 連翹 各一錢 大黃 芒硝 惡實 荊芥 各七分 片苓 梔子 薄荷 防風 玄參 黃連 金銀花 甘草 各五分	必用方甘桔湯 調胃承氣湯 金銀花散 黃連解毒湯	咽喉閉通治

표(8-8) 痰飲病에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
清火化痰湯	半夏製 陳皮 赤茯苓 各一錢 桔梗 枳殼 瓜蒌仁 各七分 黃連 黃芩 梔子 貝母 蘇子 桑白皮 杏仁 芒硝 各五分 木香 甘草 各三分 薑三片 竹瀝薑汁	黃連解毒湯 去 黃栢 瓜蒌實丸 二陳湯 桔梗枳殼湯	痰厥
清火豁痰丸	大黃酒拌 九蒸九晒 二兩半 白朮炒 枳實麩炒 陳皮鹽水炒 各二兩 黃芩酒炒 黃連酒炒 梔子炒 南星 半夏 二味以白礬 皂角 生薑 各一兩 浸七日 各一兩半 貝母炒 一兩三錢 連翹 天花粉 白茯苓 神麩炒 白芥子炒 各一兩 玄明粉 七錢 青礞石 以焰硝一兩 同煨如金色 青黛 甘草 各五錢 沉香 二錢	調胃承氣湯類 黃連解毒湯 去 黃栢 導痰湯 麩藥枳朮丸類	鬱痰

표(8-9) 其他疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
三黃石膏湯	石膏 三錢 黃芩 黃連 黃栢 山梔仁 各一錢半 麻黃 一錢 香豉 半合 薑三片 細茶一撮	黃連解毒湯	傷寒陽毒
茯苓滲濕湯	茵陳 二錢 赤茯苓 澤瀉 豬苓 各一錢 黃連 黃芩 梔子 防己 白朮 蒼朮 陳皮 青皮 枳實 各五分	茵陳四苓散類 黃連解毒湯 去 黃栢 枳朮丸	黃疸通治藥
清上瀉火湯	柴胡 一錢 羌活 八分 酒黃芩 酒知母 各七分 酒黃栢 炙甘草 黃芪 各五分 生地黃 酒黃連 藁本 各四分 升麻 防風 各三分半 蔓荊子 當歸身 蒼朮 細辛 各三分 荊芥穗 川芎 生甘草 各二分 酒紅花 一分	九味羌活湯類 當歸補血湯 黃連解毒湯 去 梔子	熱厥頭痛
三補枳朮丸	白朮 二兩 陳皮去白 枳實 各一兩 貝母 八錢 黃連 黃芩 並酒炒 黃栢鹽水炒 白茯苓 神麩 山楂肉 各五錢 麥芽 香附子醋炒 各三錢 縮砂 一錢	枳朮丸 黃連解毒湯 去 梔子	內傷病始爲熱中
三黃解毒丸	黑丑頭末 四兩 滑石 三兩 大黃 黃芩 黃連 梔子 各二兩	黃連解毒湯 去 黃栢	下藥
清上防風湯	防風 一錢 連翹 白芷 桔梗 各八分酒炒 片苓 川芎 各七分 荊芥 梔子 黃連酒炒 枳殼 薄荷 各五分 甘草 三分	黃連解毒湯 去 黃栢	面上雜病
通明利氣湯	貝母 一錢二分 陳皮 一錢 黃連 黃芩並酒浸 豬膽汁拌炒 黃栢酒炒 梔子炒 玄參酒洗 各七分 蒼朮鹽水炒 白朮 香附子便炒 生乾地黃薑汁炒 檳榔 各五分 川芎 四分 木香 二分半 甘草 二分 薑三片 竹瀝 五匙	黃連解毒湯 越鞠丸類	耳鳴

표(8-9) 其他疾患에 활용된 處方分析

處方名	處方構成	處方分析	病症
祛風至寶丹	滑石 一兩半 川芎 當歸 各一兩二錢半 甘草 一兩 防風 白芍藥 各七錢半 白朮 六錢半 石膏 黃芩 桔梗 熟地黃 天麻 人參 羌活 獨活 各五錢 梔子 三錢 連翹 荊芥 薄荷 麻黃 芒硝 黃連 大黃 黃柏 細辛 全蝎 各二錢半	防風通聖散 黃連解毒湯 防風湯 兩儀膏	中風精神蒙昧
當歸六黃湯	黃芪 二錢 生地黃 熟地黃 當歸 各一錢 黃芩 黃連 黃柏 各七分	三補丸 四物湯類	盜汗
木香檳榔丸	大黃 四兩 黑丑頭末 黃芩 各二兩 木香 檳榔 黃連 當歸 枳殼 青皮 陳皮 香附子 蓬朮 黃柏 各一兩	大黃牽牛散 三補丸 荊蓬煎元類	氣痛
保中湯	白朮土炒 二錢 黃芩 黃連並土炒 藿香 梔子薑汁炒 各一錢 半夏 陳皮 赤茯苓 各八分 縮砂 三分 甘草 二分 薑 三片	二陳湯 黃連解毒湯 去 黃柏	嘔吐治法
莎芎散	香附子 川芎 各五錢 黃連 梔子 各二錢半 木香 乾薑 各一錢半 檳榔 酒黃芩 芒硝 各一錢	越鞠丸類 黃連解毒湯 去 黃柏	熱心痛
瀉白湯	生地黃 二錢 赤茯苓 芒硝 各一錢 陳皮 竹茹 黃芩 梔子 黃柏 各五分 薑三片 棗二枚	黃連解毒湯 去 黃連	大腸熱
五瘟丹	大黃 三兩 黃連 黃柏 黃芩 甘草 香附子 紫蘇葉 各一兩 朱砂 雄黃末 爲衣	黃連解毒湯 去 梔子	瘟疫
龍虎湯	石膏 二錢半 柴胡 黃連 各一錢半 黃芩 知母 黃柏 各一錢 梔子 八分 半夏 七分 粳米 百粒 薑三 棗二	白虎湯類 小柴胡湯類 黃連解毒湯	痲瘧
清胃湯	石膏末 二匙 梔子炒 連翹 牡丹皮 條芩 各一錢 生地黃酒洗 黃連炒 各八分 升麻 白芍藥煨 桔梗 各七分 藿香 五分 甘草 三分	升麻葛根湯類 黃連解毒湯 去 黃柏	牙齒動搖
黃連通聖散	防風通聖散(滑石 一錢七分 甘草 一錢二分 石膏 黃芩 桔梗 各七分 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒硝 各四分半 荊芥 白朮 梔子 各三分半 薑五片) 加 酒炒黃連 薄荷葉	防風通聖散 加 黃連 薄荷	鼻淵

Ⅲ. 考 察

黃連解毒湯은 黃連, 黃芩, 黃柏, 梔子 등 네 가지 약물로 구성된 處方으로 外臺秘要의 崔氏方에 처음 수록되었다. 다만 肘後備急方에 藥物構成 및 主治, 用量, 服用法이 外臺秘要의 기록과 대체로 비슷하게 수록된 處方이 있으나 處方名은 나타나지 않는다. 外臺秘要에서의 黃連解毒湯의 藥物構成과 用量은 黃連 3兩, 黃芩·黃柏 各2兩, 梔子 14枚로 수록되어있는데, 東醫寶鑑에서는 黃連·黃芩·

黃柏·梔子가 各 1.25錢으로 外臺秘要和 藥物用量이 다르게 수록되어 있다^{5,27,37)}.

黃連解毒湯은 熱毒을 解除한다는 뜻이 있어 一切의 實熱火毒이 三焦에 가득 차서 나타나는 大熱煩燥, 口燥咽乾, 言語錯亂, 不眠 등 증상과 혹은 熱病으로 인한 吐血, 衄血, 심한 熱로 인한 發斑, 또는 身熱下痢, 濕熱黃疸, 癰疽疔毒 등 疾患에서 小便이 黃赤하고, 舌紅苔黃하며, 脈數有力 등의 증상을 치료한다고 하였다. 그리고 飲酒로 인해 熱病이 再發한 것과 一切熱毒을 풀어주므로 清熱瀉火解毒의 基本方으로 널리 활용되어 왔다^{2,24)}. 또한

黃連解毒湯은 苦寒으로 抑陽扶陰하고 瀉火解毒 清化濕熱하는 효능이 있어 一切의 火熱뿐만 아니라 熱로 인한 煩渴·口燥咽乾·大熱乾口·錯語·吐血·衄血·發狂·下痢·濕熱黃疸·癰疽疔毒·瘡瘍·熱甚發斑·婦人血崩 등을 치료한다^{4,6,8,10,22}고 하였다.

黃連解毒湯의 구성약물 중 黃連은 解毒殺蟲藥으로 消炎과 抗菌作用이 있으며, 黃芩도 消炎 抗菌作用이 있으므로 黃芩은 體上部에 많이 쓰이고 黃連은 體中間部 특히 胃와 腸內에 많이 쓰인다. 黃柏도 消炎作用이 있으며 體下部에 많이 쓰이고 利尿 효과가 있으며 梔子是 心火를 치료하여 解鬱鎮靜하고 止血利尿 효과가 있다. 그러므로 黃連解毒湯은 강력한 消炎 抗菌 利尿 清熱藥이다. 하지만 모두 苦味이고 寒性이 강한 약물로 이루어져 있어 瀉火解毒의 대표적 方劑이지만 쉽게 陰液을 손상시킬 수 있으므로 長服은 하지 못한다^{20,41}고 하였다.

方 중에 黃連을 君藥으로 하여 心火를 瀉하고 兼하여 中焦의 火를 瀉하며, 黃芩은 肺熱을 瀉하고 上焦의 火를 瀉하여 黃連의 作用을 협조하고, 黃柏은 下焦의 火를 瀉하여 君藥인 黃連의 效能을 도와 臣藥이 되며, 佐藥인 梔子是 三焦의 火를 通瀉하고 導熱下行케 한다. 이와 같이 네 가지의 藥味를 合用하면 苦寒으로 火邪를 直切하여 去하게 하고 熱毒을 解毒하므로 諸證을 治愈한다^{2,4-8,13,26,27,30}고 하였다. 그리고 構成藥物의 藥理作用을 조사해보면 항바이러스, 항Spirochete, 항아메바원충, 주혈흡충살상, 免疫機能 增強, 항아나필락시, 利膽, 트랜스아미나제 활성저하, 간기능보호, 혈소관보호, 모세관 투과성 억제제를 통한 止血作用, 利尿作用 등이 보고되어 있다^{30,42}.

또한 黃連解毒湯은 抗菌作用이 있어 *Staphylococcus*, *Shigella dysenteriae*, *Neisseria gonorrhoeae* 등의 균주에 抗菌 효과가 있는데 黃連解毒湯의 抗菌 효과는 單味 黃連보다 강하고 내성이 쉽게 생기지 않는다고 하였다. 또한 黃連解毒湯은 細菌毒을 解毒

시키는 작용이 있어 內毒素에 의한 병리적인 손상에도 좋은 효과가 있으며 온화한 중추신경계 억제 작용이 있어 抗痙攣作用이 있고 수면시간을 연장시키며 解熱 효과도 있다. 그리고 抗炎症作用, 食食機能 促進作用, 血壓降下 효과도 있으며 腦血流量을 증가시켜 癡呆와 中風後遺症에 효과가 있다. 그리고 胃潰瘍의 발생을 방지하고 술에 의한 위상을 보호하는 효과가 있으며 止血作用과 動脈硬化 防止作用도 있다고 하였다²⁸).

한편, 黃連解毒湯은 여러 가지 病證에 따라 藥物을 加味하거나 合方을 통하여 活用되고 있는데, 本方에 金銀花·連翹 등을 配伍하여 清熱解毒作用을 강화하며, 黃疸에는 茵陳을 加하고, 大便不利와 便秘에는 大黃을 加하고, 瘡瘍疔毒에는 蒲公英·紫花地丁을 加하며, 吐血 衄血에는 生乾地黃·牡丹皮·赤芍藥을 加하고, 下痢膿血과 裏急後重에는 木香·檳榔을 加하며, 腸風에는 四物湯(熟地黃·當歸·川芎·白芍藥)을 合方하고, 出血로 인한 貧血과 皮膚病에도 또한 四物湯을 合方하며(溫清飲), 實熱로 胃腸이 燥結하여 大便이 不通함에는 本方 煎液에 益元散(滑石·甘草)을 兼服하고, 飲酒過度로 인한 急性胃腸障碍와 惡心, 嘔吐, 上衝이 있으면 五苓散(澤瀉·赤茯苓·白朮·豬苓·肉桂)을 合方하며, 또한 黃連解毒湯에 石膏·淡豆豉·麻黃을 加하면 發表清裏 함으로써 傷寒과 溫毒이 表裏俱熱하여 狂叫欲走, 煩燥大渴, 面赤鼻乾, 兩目如火, 身形拘急, 臆狂鼻衄, 身面俱黃한 證과 陽毒發斑證을 다스리는데 活用하였다^{4,6,24}.

臨床적으로는 吐血, 咯血, 衄血, 下血, 血尿 등의 出血性 疾患과, 麻疹, 痘瘡, 蕁麻疹 등의 熱性 皮膚病 疾患, 그리고 高血壓, 腦血管疾患 등에 黃連解毒湯을 단독으로 또는 加減하거나 合方하여 活用하였다^{26-28,30-33,36}.

한편 東醫寶鑑에서는 癩癧, 天疱瘡, 癰疽 등의 外科疾患과 衄血, 嘔血, 吐血, 便血 등의 出血性 疾患 및 火熱病, 眼病, 婦人病, 傷寒病, 口舌病, 黃

疸, 膿血痢, 內傷, 頭痛 등에 총 81종의 黃連解毒湯 連繫方이 사용되고 있는 것으로 조사되었다.

먼저 東醫寶鑑에 나온 81종의 黃連解毒湯 連繫方을 각각 黃連解毒湯이 主方으로 活用된 處方들과 補助方으로 活用된 處方들을 분류하면 다음 표(1)(2)와 같다. 먼저 黃連解毒湯이 主方으로 活用된 處方은 42개 處方이 있는데, 黃連·黃芩·黃柏·梔子 등 4가지 藥物을 모두 포함한 경우는 加味金花丸 외 10개 處方이 있고, 黃連이 빠진 경우는 茵陳大黃湯이 있으며, 黃芩이 빠진 경우는 葵花散의 3개 處方이, 黃柏이 빠진 경우는 芩連半夏湯의 11개 處方이, 梔子が 빠진 경우는 芩朮樗皮丸 외 13개 處方이 있다.

또한 黃連解毒湯이 補助方으로 쓰인 處方은 39개 處方이 있는데, 4가지 藥物이 모두 포함된 處方은 祛風至寶丹 외 6개 處方이 있고, 黃連이 빠진 경우는 瀉白湯이 있으며, 黃柏이 빠진 경우는 內疎黃連湯 외 17개 處方이, 梔子が 빠진 경우는 救苦湯의 12개 處方이 있다.

黃連解毒湯이 主方으로 活用된 黃連解毒湯 連繫方의 治療領域區分은 표(3)에서와 같다. 즉 外科疾患(諸瘡門, 諸傷門, 癰疽門)에서는 葵花散·綠雲膏·消風敗毒散·四黃散·五黃散·黃連消毒散·當歸羌活湯 등 7개 處方이 사용되고 있고, 火熱病(火門)에서는 加味金花丸·大金花丸·三補丸·黃芩湯·黃連解毒湯(2) 등 5개 處方이 사용되고 있으며, 眼科疾患(眼門)에서는 洗肝明目湯·五黃膏·速效散·大明復光散·連栢益陰丸 등 5개 處方이 사용되고 있다.

傷寒病(寒門)에서는 柴胡連翹湯·黃連解毒湯·陶氏導赤各半湯·三黃熟艾湯 등 4개 處方이 사용되고 있으며, 出血性疾患(血門)에서는 陶氏生地芩連湯·清衄湯·清腸湯 등 3개 處方이 사용되고 있고, 婦人科疾患(胞門, 婦人門)에서는 解毒四物湯·芩連半夏湯·芩朮樗皮丸 등 3개 處方이 사용되고 있으며, 大便病(大便門)에서는 地榆散·解毒金花散·黃連阿膠湯 등 3개 處方이 사용되고 있고, 口舌病(口

舌門)에서는 三黃湯과 赴宴散 등 2개 處方이 사용되고 있으며, 黃疸(黃疸門)에서는 茵陳大黃湯과 退黃散 등 2개 處方이 사용되고 있다. 또한 頭痛(頭門)에서는 加味四物湯, 內傷病에서는 化痰清火湯, 下藥(下門)에서는 解毒丸, 面部疾患(面門)에서는 連翹散, 耳部疾患(耳門)에서는 龍膽湯, 精(精門)에서는 保精湯, 虛勞(虛勞門)에서는 瀉陽補陰湯, 後陰(後陰門)에서는 解毒湯이 각각 사용되고 있다.

黃連解毒湯 連繫方은 外科疾患, 火熱病, 眼科疾患, 傷寒病, 出血病, 婦人科疾患 등의 순서로 사용빈도수를 나타내고 있으므로 火熱, 傷寒, 瘡傷, 眼科疾患, 出血性疾患에 가장 많이 活用하여 왔음을 알 수 있다. 또한 東醫寶鑑의 90개의 門중에서 20개의 門에서 사용되고 있어서 그 活用도가 높다고 볼 수 있다.

黃連解毒湯이 主方으로 活用된 黃連解毒湯 連繫方이 活用된 病症과 處方은 표(4)에서와 같다. 즉 外科疾患에 의한 경우 有名無名諸惡瘡에는 葵花散을, 癩癧에는 綠雲膏를, 天疱瘡에는 消風敗毒散을, 湯火瘡에는 四黃散을, 杖傷에는 五黃散을, 治癰疽大法에는 黃連消毒散을, 癰疽五發證에는 當歸羌活湯을 活用하고 있으며, 火熱病에 의한 경우 三焦火에는 加味金花丸·大金花丸·三補丸을, 上焦熱에는 黃芩湯을, 火熱에는 黃連解毒湯(2) 등을 活用하고 있고, 眼科疾患에 경우 外障에는 洗肝明目湯·五黃膏·速效散을, 通治眼病藥에는 大明復光散을, 瞽膜에는 連栢益陰丸을, 傷寒病에 의한 경우 傷寒譫語鄭聲에는 柴胡連翹湯·黃連解毒湯을, 差後昏沈에는 陶氏導赤各半湯을, 少陰病熱痢에는 三黃熟艾湯을, 出血性疾患에 경우 衄血에는 陶氏生地芩連湯·清衄湯을, 尿血에는 清腸湯을 사용하고 있다.

婦人科疾患에 경우 崩漏에는 解毒四物湯을, 惡阻에는 芩連半夏湯을, 帶下에는 芩朮樗皮丸을, 大便病의 경우 膿血痢에 地榆散·解毒金花散·黃連阿膠湯을, 口舌病에 경우 口甘에는 三黃湯을, 口舌瘡瘳付藥에는 赴宴散을, 黃疸에 의한 경우 黃疸通治藥

으로 茵陳大黃湯·退黃散을 사용하고 있다.

그밖에 氣厥頭痛에 加味四物湯을, 內傷嘈雜에 化痰清火湯을, 下劑로는 解毒丸을, 面上雜病에 連翹散을, 耳聾에 龍膽湯을, 夢泄에 保精湯을, 陰虛에는 瀉陽補陰湯을, 腸風腸毒에는 解毒湯을 사용하고 있다.

그러므로 黃連解毒湯 連繫方이 각 病症에 활용된 사용빈도수로 보아 三焦火, 外障, 膿血痢, 傷寒 譫語鄭聲, 衄血, 黃疸의 病症에 많이 사용되었음을 알 수 있다.

黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 主治症狀은 표(5)에서와 같다. 여기에서는 病症에 대해 病的인 상황이나 病症狀態를 구체화시켜서 설명하고 있는데, 먼저 外科疾患에서는 一切熱瘡·癩癧·天疱瘡楊梅瘡初期·湯火熱油·杖瘡·癰疽發腦發背腫毒·癰疽五發에, 火熱病에서는 三焦火熱·五臟火·口瘡咽痛·小便淋濁·大熱煩燥·三焦實火에, 또한 眼科疾患에서는 目赤腫痛·努肉紅綠·紅白翳障·上瞼胞腫如桃·一切眼疾內外障·清白翳 등에, 傷寒病에서는 傷寒發熱·譫語呻吟·不得眠·飲酒復劇·差後昏沈·傷寒大下熱痢不止에 黃連解毒湯을 사용하고 있다.

出血病에서는 鼻衄成流不止·尿血에, 婦人病에서는 崩漏面黃腹痛·惡阻病胸背滿痛·孕婦白帶에, 大便病에서는 熱毒下痢膿血, 口舌病에서는 脾熱口甘·口瘡糜痛, 黃疸病에서는 傷寒大熱發黃疸·身面如金·小便如黃栢汁에 사용하고 있다.

그리고 頭痛에서는 血虛陰火·上衝頭痛, 內傷病에서는 嘈雜, 下劑에서는 一切熱毒·癰腫瘡瘍咬牙驚悸, 面部疾患에서는 粉刺, 耳部疾患에서는 左耳聾, 精病에서는 夜夢遺精, 虛勞에서는 陰虛火動, 後陰에서는 腸毒에 黃連解毒湯을 사용하고 있다.

黃連解毒湯이 主方으로 활용된 黃連解毒湯 連繫方의 病因·病機를 類型別로 조사⁴³⁾하여 정리해보면 표(6)와 같다.

즉, 臟腑에 관련된 것으로는 肝臟積熱·心熱·膀胱肝腎經鬱遏 不通於目·心移熱於小腸·妊娠之初

經脈內閉 育養胎息 腸胃沮洳 散入焦膈·脾熱 등 臟腑의 熱毒이 主要 病因·病機이며, 그 외 臟腑經脈의 沮滯로 인한 것도 있었다. 六淫에 관련된 것으로는 濕熱下迫·脾受濕熱 鬱而不行·濕毒甚盛·蘊積熱毒·肝脾腎風濕熱之毒 등 濕熱毒과 濕毒, 熱毒이 공통적인 病因이었고, 傷寒에 관련된 것으로는 陽明熱鬱·陽明病胃實則譫語·發汗不盡 餘毒在心胞間所致·傷寒大熱 등 熱이 공통적인 病因·病機로 작용하고 있었으며, 치료가 미진하여 남은 餘毒이 病因으로 작용하는 경우도 있었다. 氣血에 관련된 것으로는 鼻通於腦 血上溢於腦 所以從鼻而出과 氣血虛而邪氣逆上, 瘀血 病因·病機가, 痰飲에 관련된 것으로는 帶漏滯 俱是胃中痰積 流下滲入膀胱 出於大小腸과 痰火가 조사되었고, 陰虛火動과 酒色過度 妄泄眞陰, 膏粱熱鬱, 忿怒動痰火 등의 病因·病機도 조사되었다. 즉, 가장 많이 조사된 病因·病機는 火熱인데, 肝脾腎風濕熱之毒·高粱熱毒·肝臟積熱·心熱·陽明熱鬱·心移熱於小腸·濕熱下迫·陽明病胃實·脾熱·傷寒大熱·脾受濕熱·痰火·忿怒動膽火·蘊積熱毒 등 五臟의 熱毒 및 濕熱, 傷寒病으로 인한 熱毒이 病因이 되어 각종 火熱症狀을 일으킨 경우가 主流를 이루고 있음을 알 수 있었다. 그러므로 黃連解毒湯의 連繫方들은 火熱, 濕熱, 傷寒熱毒등이 五臟에 관련된 病因病機에 주로 사용되고 있음을 알 수 있다.

黃連解毒湯은 黃連, 黃芩, 黃栢, 梔子로 構成된 處方이므로 連繫方의 處方構成內容을 조사하면 加味된 藥物과 合方된 處方을 분석할 수 있고, 이와 같은 내용을 病因·病機, 病症, 主治 등과 연관시켜 고찰해보면 連繫方의 方解를 보다 정확하게 할 수 있으며 處方 활용의 객관적인 이론적 근거를 제시할 수 있다.

따라서 東醫寶鑑에서 사용하고 있는 黃連解毒湯이 主方으로 활용되는 黃連解毒湯 連繫方 42종에 대한 處方內容을 분석해 보면 표(7-1)에서 표(7-10)과 같다.

外科疾患에 활용된 處方を 분석해보면 葵花散은 黃連解毒湯에서 黃芩을 빼고 利氣行滯하는 鬱金과 祛毒하는 효능이 있는 葵花的 配伍한 것으로 黃連解毒湯의 清熱解毒作用을 보강하여 有名無名諸惡瘡을 치료할 수 있는 方劑이며, 綠雲膏는 黃連解毒湯에서 梔子를 빼고 大黃을 配伍하여 清熱解毒作用을 강화한 大金花丸의 連繫方으로서 除虛火하는 玄蓼과 消腫癰瘡하는 木鼈子を 配伍한 처방으로 清熱三焦火熱作用을 강화하고 皮膚의 病症을 治療할 수 있게 香油·松脂·猪膽汁등을 같이 配伍하여 癩癬의 病症에 外用劑로 쓸 수 있게 한 것으로 볼 수 있다. 消風敗毒散은 清熱解毒하는 黃連解毒湯에 理血作用을 하는 四物湯을 습한 解毒四物湯과 發表透疹하는 升麻葛根湯, 祛風하는 防風湯, 癰疽를 치료하는 金銀花散, 功下作用을 하는 調胃承氣湯을 습하여 天泡瘡에 사용할 수 있고, 四黃散은 黃連解毒湯에서 梔子를 빼고 大黃을 配伍한 大金花丸에 收斂作用을 하는 白芨을 配伍한 處方으로 皮膚의 清熱瀉火作用을 보강하여 湯火瘡를 치료할 수 있는 方劑로 볼 수 있다. 五黃散은 大金花丸에 黃丹乳香을 配伍한 것으로 清熱解毒作用과 함께 止痛收斂作用을 겸한 處方으로 杖傷을 치료하는 方劑이고, 黃連消毒散은 梔子를 뺀 黃連解毒湯에 清熱解毒하는 連翹·生地黃·知母가 이를 돕고 祛風하는 防風湯·藁本·獨活과 消腫하는 防己·澤瀉에 補氣生肌하는 保元湯과 當歸·桔梗·陳皮를 配伍하여 癰疽를 치료하는 方劑이고, 當歸羌活湯은 清熱解毒하는 黃連解毒湯과 連翹에 祛風하는 防風湯·獨活·藁本과 利水하는 澤瀉 및 瀉火하는 甘草를 配伍하여 여러 가지 癰疽에 활용할 수 있는 方劑로 볼 수 있다 (표(7-1)).

火熱病에 활용된 處方を 분석해보면 三補丸은 黃連解毒湯에서 梔子를 뺀 것으로 三焦積熱과 五臟火를 다스리는 효능으로 三焦火를 치료할 수 있는 方劑이고, 大金花丸은 黃連解毒湯에서 梔子 대신 大黃을 配伍하여 黃連解毒湯의 清熱解毒作用을

強化한 基本方으로 三焦火를 치료할 수 있는 處方이며, 加味金花丸은 黃連解毒湯에 大金花丸을 습하고 大黃·人蔘·半夏·桔梗을 配伍한 方劑로 黃連解毒湯과 大金花丸을 습한 강력한 瀉火作用과 人蔘과 半夏는 溫性으로 너무 강한 瀉火作用을 완화시키며, 桔梗은 약효를 上焦로 引經시키며 祛風止咳作用을 하므로 瀉三焦火하며 止嗽化痰과 清頭目的 효능이 있는 方劑이며, 黃芩湯은 黃栢을 뺀 黃連解毒湯에 心熱을 내러주는 導赤散을 합하고 潤肺하는 麥門冬과 利水하는 木通과 澤瀉를 配伍하여 上焦熱을 치료할 수 있는 方劑이고, 黃連解毒湯(2)은 黃連解毒湯 本方에 清熱作用이 있는 連翹와 柴胡, 赤芍藥을 配伍하여 清熱解毒作用을 더욱 強化한 處方으로 火熱을 치료할 수 있는 方劑로 볼 수 있다 (표(7-2)).

眼科疾患에 활용된 處方を 분석해보면 洗肝明目湯은 血熱이나 肝經의 風熱을 내러주는 生料四物湯·散熱飲子와 上焦實熱을 풀어주는 回春涼膈散, 風熱毒이 上功하여 생긴 眼病을 치료하는 決明散에 白蒺藜를 합한 處方으로 外障의 病症에서 急性 充血性 傳染性 眼科疾患에 활용할 수 있는 方劑로 볼 수 있다. 五黃膏는 大金花丸에 黃丹을 配伍하여 三焦의 火熱을 瀉하여 外障에서의 目赤腫痛에 활용할 수 있는 方劑로 볼 수 있으며, 速效散은 清熱作用이 있는 黃連解毒湯·回春涼膈散類·柴胡·地骨皮·惡實에다 腎膜을 치료하는 清涼散類와 眼部로 引經하는 甘菊·白蒺藜·草決明 등을 配伍한 方劑로 白內障이나 綠內障, 眼瞼結膜炎 등을 치료하며, 大明復光散은 清熱解毒하는 黃連解毒湯類에 治風眼疾 하는 局方密蒙花散類와 補腎益陰하는 二宜丸, 治赤腫疼痛하는 散熱飲子, 治眼目赤腫多淚하는 菊花散, 治腎膜하는 密蒙花散類를 습한 方劑로 眼部의 熱毒으로 인한 諸眼病을 通治하는데 활용할 수 있으며, 連栢益陰丸은 黃連解毒湯類에 補陰瀉火하는 益本滋腎丸과 祛風하는 防風湯과 獨活 및 眼疾에 쓰이는 草決明과 石決明을 配合하고,

收斂하는 五味子和 和血하는 當歸를 配伍하여 綠內障, 白內障에 活用한 方劑로 볼 수 있다(표(7-3)).

傷寒病에 活用된 處方을 분석해보면 柴胡連翹湯은 傷寒心煩不得臥를 치료하는 小柴胡湯類와 傷寒發熱譫語를 치료하는 黃連解毒湯·連翹·瓜蒌仁和 胸痛을 치료하는 桔梗枳殼湯을 合方하여 傷寒發熱譫語呻吟 睡臥不得이 있을때 活用하였고, 黃連解毒湯은 清熱解毒의 基本方으로 傷寒의 熱毒을 풀어주는 方劑이며, 陶氏導赤各半湯은 熱邪를 없애주는 黃連解毒湯類·六一散·知母·犀角과 安神하는 人蔘·茯神 및 滋潤하는 麥門冬을 配伍한 方劑로 傷寒後 病이 호전되고도 정신이 맑지 못할 때 사용하였으며, 三黃熟艾湯은 清熱하는 三補丸에 收斂하는 熟艾를 配伍한 것으로 熱性痢疾이나 泄瀉에 活用하였다 (표(7-4)).

出血性疾患에 活用된 處方을 분석해보면 陶氏生地芩連湯은 清血熱解毒하는 解毒四物湯類와 解少陽熱하는 小柴胡湯類를 合方하고 上焦로 引經하는 桔梗과 清血熱하는 犀角을 配伍하여 衄血을 치료할 수 있는 方劑로 볼 수 있으며, 清衄湯은 解毒하는 黃連解毒湯類에 理血하는 四物湯類와 氣鬱滯를 치료하는 交感丹을 合하고 止血하는 側柏葉과 藕節을 配伍하고 上焦로 引經하는 桔梗을 더하여 衄血을 治療할 수 있는 方劑로 볼 수 있다. 清腸湯은 清熱解毒하는 黃連解毒湯類에 五淋을 치료하는 五淋散과 利水清心하는 導赤散을 合하고 利水하는 瞿麥·篇蓄과 清熱하는 知母와 滋潤하는 麥門冬을 配伍하여 尿道炎, 膀胱炎 등에서의 尿血症狀에 活用한 方劑로 볼 수 있다 (표(7-5)).

婦人科疾患에 活用된 處方을 분석해보면 解毒四物湯은 黃連解毒湯에 和血하는 四物湯을 合한 것으로 清熱和血涼血하여 崩漏를 다스리는 方劑이고, 芩連半夏湯은 黃連解毒湯類에 安胎하는 保安白朮散, 氣虛痰盛을 다스리는 六君子湯, 六鬱을 다스리는 越鞠丸類를 合하고 補血하는 當歸로 理氣하는 砂仁을 配伍하여 妊娠惡阻로 가슴과 등이 답답하

고 등에 痛症이 있을 때 쓸 수 있는 方劑이며, 芩朮栲皮丸은 黃連解毒湯類에 燥濕하는 白朮, 止帶하는 栲根白皮와 白芷, 收斂하는 白芍藥과 山茱萸를 合한 處方으로 帶下에 사용하는 方劑로 볼 수 있다 (표(7-6)).

大便病에 活用된 處方을 분석해보면 地榆散은 黃連解毒湯類에 止血하는 地榆, 清熱하는 犀角, 升陽發散하는 葛根, 萐白을 配伍하여 熱毒으로 인한 膿血痢에 活用할 수 있는 方劑이고, 解毒金花散은 黃連解毒湯類와 燥濕滲泄하는 白朮과 赤茯苓, 補陰하는 赤芍藥을 配伍한 處方으로 濕熱로 인한 膿血痢에 活用할 수 있으며, 黃連阿膠湯은 黃連解毒湯類에 止血하는 阿膠를 配伍하여 역시 熱毒으로 인한 膿血性痢疾에 사용하는 方劑로 볼 수 있다 (표(7-7)).

口舌病에 活用된 處方을 분석해보면 三黃湯은 黃連解毒湯類에 補脾하는 異功散類와 緩和하는 芍藥甘草湯을 合하고 清胃熱하는 石膏와 引經하는 桔梗을 配伍한 方劑로 脾熱로 인해 입이 단 것을 다스리며, 赴宴散은 黃連解毒湯에 細辛, 乾薑을 配伍하여 口舌瘡에 붙이는 약으로 活用할 수 있는 方劑로 볼 수 있다 (표 (7-8)).

黃疸에 活用된 處方을 분석해보면 茵陳大黃湯은 清熱毒하는 黃連解毒湯類·柴胡·草龍膽에 黃疸을 치료하는 茵陳蒿湯과 升陽하는 升麻를 合한 方劑로 볼 수 있고, 退黃散은 黃連解毒湯에 六一散을 合하고 升麻·柴胡·草龍膽·木通을 配伍한 方劑로서 茵陳·草龍膽·黃連解毒湯은 肝經의 濕熱을 풀어주고, 柴胡·升麻는 少陽經으로 引經하며, 六一散과 木通으로 濕熱을 小便으로 통하게 하여 排出케 하므로 黃疸을 다스리는 것으로 볼 수 있다 (표(7-9)).

其他疾患에 活用된 處方을 분석해보면 加味四物湯은 黃連解毒湯에 血虛陰火가 上衝하는 것을 다스리는 知柏四物湯과 頭部로 藥力을 引經하는 蔓荊子를 合하여 血虛로 陰火가 上衝하여 생기는 頭

痛에 活用하는 方劑로 볼 수 있고, 化痰清火湯은 平陳湯類·黃連解毒湯類·白虎湯·芍藥甘草湯을 合하고 白朮과 南星을 配伍한 方劑로 볼 수 있는데, 平陳湯으로 和胃祛痰하고, 黃連解毒湯類와 白虎湯으로 胃熱을 내려주고, 芍藥甘草湯으로 緩和시켜 實證의 嘈雜에 活用한다. 解毒丸은 黃連解毒湯類에 三黃元, 大黃牽牛散을 合하여 大便의 排泄을 도와 泄下시키는 方劑이며, 連翹散은 黃連解毒湯類에 芷貝散을 合하여 面上雜病에 活用한 方劑로 볼 수 있다. 龍膽湯은 瀉三焦熱하는 黃連解毒湯類에 瀉肝之劑인 草龍膽·玄蔘·靑黛와 理氣之劑인 正氣天香湯類와 木香, 滋潤하는 當歸, 溫中하는 乾薑을 配伍하여 耳聾과 肝火耳鳴에 活用하는 方劑로 볼 수 있다. 保精湯은 清熱解毒하는 解毒四物湯類와 陰虛火動을 다스리는 知栢四物湯을 合하고 滋潤하는 麥門冬과 補陰精하는 山茱萸와 命門을 補하는 乾薑 및 苦澁하는 牡蠣을 配伍한 處方으로 陰虛로 인한 精滑, 遺精 등에 活用할 수 있는 方劑로 볼 수 있다. 瀉陽補陰湯은 黃連解毒湯類에 陰虛火動을 다스리는 知栢四物湯類와 天門冬·貝母·杏仁·紫菀·天花粉·桔梗·白茯苓·白朮·五味子·烏梅·燈心을 配伍하여 陰虛火動을 치료하는 方劑이며, 解毒湯은 黃連解毒湯에 清熱解毒을 도와주는 連翹와 止血하는 槐花, 溫經利竅하는 細辛 및 緩和하는 甘草를 配伍한 方劑로 腸毒을 풀어주는 基本方으로 볼 수 있다 (표(7-10)).

또한 黃連解毒湯이 輔助方으로 活用된 黃連解毒湯 連繫方 39종의 處方內容을 분석해보면 표(8-1)에서 표(8-9)와 같다.

外科疾患에 活用된 處方을 분석해보면 散腫潰堅湯은 黃連解毒湯類와 草龍膽·瓜蒌根·知母·桔梗·昆布·海藻·柴胡·炙甘草·三稜·蓬朮·連翹·葛根·白芍藥·當歸·升麻 등을 配伍하여 癰癤에서 堅而不潰 或潰出膿水 한 것을 치료할 수 있는 方劑로 볼 수 있고, 三黃敗毒散은 滲濕하는 土茯苓이 君藥으로 되고 祛風하는 防風·荊芥·白

芷·地骨皮·五加皮·白殭蠶·白蒺藜·木瓜·苦蔘·蟬退와 清熱하는 地骨皮·連翹·金銀花와 養血하는 當歸·赤芍藥과 滲濕하는 薏苡仁과 上部로 引經하는 川芎 및 下部로 引經하는 木通, 緩和하는 甘草를 配伍하여 天庖瘡과 楊梅瘡을 치료하는 方劑로 볼 수 있다. 內疎黃連湯은 三焦의 熱毒을 瀉해주는 黃連解毒湯類 및 三黃元에 血熱에 사용하는 四順清涼飲類를 合方하고 利便하는 木香·檳榔, 清熱하는 連翹·薄荷, 皮膚의 癰疽部位로 引經하는 桔梗을 配伍한 方劑로 癰疽의 實證으로 發熱, 便秘, 煩燥 등이 있을 때 사용할 수 있고, 打膿散은 癰疽熱毒을 없애주는 大金花丸·調胃承氣湯·金銀花散을 合하고 排膿生肌하는 當歸尾·穿山甲·木鼈子를 配伍한 것으로 癰疽에 破腫되지 않고 膿이 排出되지 않을 때 活用하는 方劑로 볼 수 있다. 瀉心湯은 清熱하는 大黃을 君藥으로 하고 黃連解毒湯類에 消腫散結하는 漏蘆·澤蘭·連翹·蘇木을 配伍하여 心癰에 活用할 수 있는 方劑이고, 升陽益胃散은 連翹를 君藥으로 하고 黃連解毒湯類·防風湯·保元湯·當歸補血湯·坎離丸·藁本·甘草·澤瀉·生地黃·蘇木·防己를 配合한 것으로, 連翹·防風湯·黃連解毒湯類·坎離丸·甘草 등으로 清熱解毒祛風하고, 保元湯·當歸補血湯으로 補氣血하고 托瘡生肌하며, 蘇木·當歸로 活血하며, 防己·澤瀉로 消腫祛毒하여 腦疽, 背癰, 一切惡瘡을 치료하는 方劑로 볼 수 있다. 腎氣丸은 大金花丸과 牡蠣·金銀花·連翹·穿山甲·木鼈子·黃蠟을 配伍하여 清熱解毒 및 消腫散結生肌作用으로 便毒으로 潰破된 것을 치료하는 方劑로 볼 수 있다 (표(8-1)).

火熱病에 活用된 處方을 분석해보면 清火湯은 調胃承氣湯에 黃連解毒湯類를 合하고 桔梗·玄蔘·連翹·貝母·天花粉·獨活·前胡·柴胡·赤茯苓·枳殼·薄荷·羌活·川芎·防風 등 清熱解毒하고 解表 하는 藥物을 配伍하여 三焦熱을 다스린 方劑이고, 清心湯은 甘草를 君藥으로 한 調胃承氣湯에 黃連解毒湯類를 合하고 連翹·薄荷·竹葉을 配伍하여

瀉上焦熱하는 處方으로 볼 수 있다 (표(8-2)).

眼科疾患에 활용된 處方을 분석해보면 救苦湯은 祛濕하는 蒼朮과 瀉肝하는 草龍膽에 陰虛火動을 치료하는 知柏四物湯과 眼赤疼痛을 다스리는 散熱飲子를 합하고 甘草·升麻·柴胡·蘘本·桔梗·連翹·細辛·紅花 등 瀉肝 清熱 祛瘀하는 약물을 配伍하여 眼疼과 充血性 眼疾에 활용한 處方이고, 涼膈元은 祛風熱하는 散熱飲子類에 黃連解毒湯類를 합하고 清熱하는 蘆薈·草龍膽과 熱毒을 小便을 통해 排泄하는 地膚子를 配伍하여 內障에 사용하는 方劑로 볼 수 있다 (표(8-3)).

出血性疾患에 활용된 處方을 분석해보면 生地芩連湯은 祛風하는 防風을 君藥으로 하고 四物湯과 黃連解毒湯類를 합하여 和血作用과 清熱解毒作用을 겸하도록 하여 失血過多로 의식이 흐릴 때 사용하는 方劑로 볼 수 있으며, 清熱解毒湯은 升麻를 君藥으로 하고 黃連解毒湯에 生地黃·赤芍藥·牡丹皮·乾葛·桔梗·連翹·生薑을 配伍하여 吐血과 衄血을 치료하는 方劑로 볼 수 있다. 清臟湯은 四物湯에 黃連解毒湯을 합하고 地榆·側柏葉·阿膠珠·槐角 등 止血藥類를 配伍한 處方으로, 解毒四物湯으로 臟毒을 다스리고 나머지 약으로 止血시켜 便血을 치료하는 方劑로 볼 수 있다 (표(8-4)).

婦人科疾患에 활용된 處方을 분석해보면 涼血地黃湯은 陰虛火動을 다스리는 知柏四物湯類와 紅花에 涼血하는 黃連解毒湯類, 柴胡四物湯類 및 祛風하는 防風湯·荊芥·蘘本·細辛을 합하고 升擧하는 柴胡를 配伍한 處方으로 崩漏를 치료하는 方劑로 볼 수 있으며, 清經四物湯은 陰虛火動을 다스리는 知柏四物湯에 清熱解毒하는 黃連解毒湯類를 합하고 香附子·阿膠珠·艾葉·甘草 등 調經하는 藥物을 配伍하여 月經不調나 血虛有熱에 활용하는 處方으로 볼 수 있다 (표(8-5)).

口舌病에 활용된 處方을 분석해보면 龍膽瀉肝湯은 小柴胡湯類에 生脈散·黃連解毒湯類를 합하고 天門冬·草龍膽·知母를 配伍하여 口苦에 활용할

수 있는 處方으로 볼 수 있고, 回春涼膈散은 涼膈散類에 黃連解毒湯類·桔梗枳殼湯·生料四物湯類를 합하여 清熱解毒作用과 散風熱作用을 보장하여 口糜를 치료하는 方劑로 볼 수 있다 (표(8-6)).

咽喉部疾患에 활용된 處方을 분석해보면 清涼散은 甘桔湯과 回春涼膈散을 合方하고 防風·白芷를 配伍한 方劑로 볼 수 있는데, 甘桔湯은 咽痛에 활용하는 基本方이고 回春涼膈散은 上焦에 實熱이 있을 때 사용하는 處方으로, 따라서 本方을 單乳蛾 雙乳蛾 喉痺 등 急性 咽喉炎에 활용할 수 있다. 清咽利膈散은 必用方甘桔湯에 調胃承氣湯·金銀花散·黃連解毒湯을 합하고 連翹·牛蒡子·惡實·玄蔘을 配伍한 方劑로, 必用方甘桔湯은 咽喉炎에 사용하는 基本方이고, 調胃承氣湯·黃連解毒湯類·玄蔘·牛蒡子·惡實은 清熱瀉火하며, 金銀花散은 癰疽에 사용하므로 本方은 實證의 扁桃腺炎이나 咽喉炎에 활용하는 方劑로 볼 수 있다 (표(8-7)).

痰飲病에 활용된 處方을 분석해보면 清火化痰湯은 胸中の 痰氣가 鬱滯된 것을 다스리는 瓜蒌實丸·二陳湯에 이를 돕는 杏仁·貝母·蘇子·桑白皮를 配伍하고 理氣開胸하는 桔梗枳殼湯과 木香 및 清熱하는 黃連解毒湯類와 芒硝를 합하여 痰이 胸中에 結하여 痛症을 일으키는 症狀에 활용하는 方劑로 볼 수 있다. 清火豁痰丸은 三焦의 鬱火를 풀어주는 調胃承氣湯類와 黃連解毒湯類에 祛痰하는 導痰湯類 및 消痞하는 麴蘖枳朮丸類를 합하고 祛痰하는 貝母·天花粉·白芥子와 清熱하는 連翹·玄明粉·青礞石·青皮 및 行氣하는 沈香을 配伍하여 實證의 神經性 胸悶證, 梅核氣에 활용하는 方劑로 볼 수 있다(표(8-8)).

其他疾患에 활용된 處方을 분석해보면 三黃石膏湯은 清熱하는 石膏를 君藥으로 하고 清熱解毒하는 黃連解毒湯에 麻黃·淡豆豉·生薑을 配伍한 것으로 陽毒發斑에 활용하는 方劑로 볼 수 있으며, 茯苓滲濕湯은 黃疸에 활용하는 茵陳四苓散類에 清熱解毒하는 黃連解毒湯類와 消痞하는 枳朮丸을 합

하고 防己·蒼朮·陳皮·靑皮를 配伍한 方劑로 볼 수 있는데, 모두 清濕熱 利水 理氣藥으로 구성되어 있어 濕熱로 인한 黃疸를 치료하도록 한 方劑이다. 淸上瀉火湯은 淸熱하는 柴胡를 君藥으로 하고 祛風寒하는 九味羌活湯類에 頭部로 引經하는 한편 鎮靜作用이 있는 荊芥·蔓荊子·藁本 및 補氣養血하는 紅花와 當歸補血湯을 합하며, 淸熱瀉火하는 黃連解毒湯類·知母·升麻를 配伍하여 熱로 인한 實證의 頭痛을 치료하도록 한 處方으로 볼 수 있다.

三補枳朮丸은 健脾하는 白朮을 君藥으로 한 枳朮丸에 黃連解毒湯을 合하고 陳皮·貝母·白茯苓·神麩·山查·麥芽·香附子·砂仁등의 消導藥物을 配伍하여 補脾胃하고 化痰淸熱하고 消食順氣하여 內傷病의 初期에 활용하도록 한 方劑이며, 三黃解毒丸은 通便作用을 하는 黑丑를 君藥으로 하고 淸熱解毒하는 黃連解毒湯類·滑石·大黃을 配伍하여 諸熱毒·癰腫·瘡瘍 等證에 解熱通便함으로써 症狀를 개선시키는 方劑로 볼 수 있다.

淸上防風湯은 祛風하는 防風을 君藥으로 하고 淸熱解毒하는 黃連解毒湯類·連翹와 發表透疹하는 荊芥·薄荷, 消腫하는 白芷, 理氣하는 桔梗·枳殼, 活血하는 川芎, 緩和하는 甘草를 配伍하여 上焦火로 面部에 발생하는 瘡癩와 風熱毒을 치료하는 方劑이며, 通明利氣湯은 貝母를 君藥으로 하고, 黃連解毒湯과 越鞠丸類가 合하여지고 陳皮·白朮·生乾地黃·檳榔·木香·甘草·竹瀝을 配伍하여 祛痰淸熱 및 理氣開鬱作用을 통하여 耳鳴과 耳聾 등을 치료하는 方劑로 볼 수 있다. 祛風至寶丹은 風熱에 사용하는 防風通聖散에 淸熱解毒하는 黃連解毒湯, 補氣血하는 兩儀膏와 祛風鎮靜하는 防風湯·天麻·獨活·細辛·全蟲을 配伍하여 淸熱解毒 祛風鎮靜 補益作用으로 實證의 中樞神經系 疾患에 활용하는 方劑이며, 當歸六黃湯은 固表止汗하는 黃芪를 君藥으로 하고 補血作用을 하는 生地黃·熟地黃·當歸와 淸熱作用을 하는 黃連解毒湯類를 配伍하여 血虛로 인한 盜汗을 치료하는 方劑로 볼 수 있다.

氣痛에 사용한 木香檳榔丸은 積熱瀉下하는 大黃 牽牛散과 三補丸과 氣滯를 破하여 通行하게 하는 荊蓬煎元類와 香附子를 配伍하여 痞痛을 다스리는 方劑이며, 保中湯은 健脾燥濕하는 白朮을 君藥으로 하고 黃連解毒湯類에 祛痰하는 二陳湯과 理氣消導하는 藿香과 砂仁을 配伍하여 痰火로 因한 嘔吐를 멈추게 하는 方劑로 볼 수 있다.

熱心痛에 사용한 莎芎散은 除鬱滯하는 越鞠丸類에 黃連解毒湯類를 合하고 理氣하는 木香·檳榔과 溫中하는 乾薑 및 瀉下하는 芒硝를 配伍하여 熱物 刺戟에 의한 胃脘痛에 활용하는 方劑이며, 瀉白湯은 淸熱하는 生地黃을 君藥으로 하여 淸熱하는 黃連解毒湯類와 竹茹에 滲濕하는 赤茯苓, 理氣하는 陳皮 및 瀉下하는 芒硝를 配伍하여 大腸實熱로 인한 腹痛과 腹脹에 활용한 方劑로 볼 수 있다. 五癰丹은 大黃을 君藥으로 하고 黃連解毒湯類에 甘草·香附子·紫蘇葉을 配伍하여 癰疽와 傷寒熱病熱瘡를 치료하는 方劑이며, 龍虎湯은 白虎湯類와 小柴胡湯類에서 補益作用이 있는 甘草나 人蔘 대신 黃連解毒湯이 合하여져 陽明經과 少陽經의 熱과 瘡疾을 치료하는 處方으로 볼 수 있다.

淸胃湯은 陽明經의 熱을 내리는 石膏를 君藥으로 하고 升陽發散하는 升麻葛根湯類와 淸熱涼血하는 黃連解毒湯類·牡丹皮·連翹·生地黃과 理氣하는 桔梗, 發散하는 藿香을 配伍하여 實證의 齒齦炎을 치료하는 方劑이며, 黃連通聖散은 風熱을 치료하는 防風通聖散에 淸熱하는 黃連과 薄荷를 配伍하여 風熱에 의한 鼻淵證을 치료하는 方劑로 볼 수 있다 (표(8-9)).

이와 같이 黃連解毒湯 連繫方의 構成藥物 調査를 통하여 각 方劑의 主治症狀, 病症, 활용된 基本方 및 配伍된 藥物을 파악할 수 있었다.

총괄하여 정리해보면 東醫寶鑑에 수록된 黃連解毒湯이 主方으로 사용된 黃連解毒湯 連繫方 42종과 補助方으로 사용된 黃連解毒湯 連繫方 39종, 총 81종 處方の 文獻的 資料를 통하여 黃連解毒湯의

治療領域, 活用病症, 病因·病機, 藥物配伍, 變方 및 合方 內容을 소상히 파악할 수 있었으며, 즉 黃連解毒湯은 火, 濕, 熱毒에 대한 病因病理에 관계되는 각종 諸瘡, 諸傷, 癰疽 등 外科질환이나 三焦火, 上焦火 등 火熱病이나 外障, 內障, 瞽膜 등 眼科질환, 傷寒病, 각종 실증성 出血病, 痢疾, 口舌病, 黃疸, 腸毒증 등에 다양한 임상질환에 활용할 수 있음을 시사하고 있다. 이로써 보다 객관적이고 논리적인 方劑學의 基礎를 확립하기에 좋은 자료가 될 것으로 생각한다.

IV. 結 論

東醫寶鑑에서 활용되고 있는 黃連解毒湯 및 黃連解毒湯 連繫方 81개 方劑에 대한 文獻的 調査를 통하여 다음과 같이 요약할 수 있었다.

1. 黃連解毒湯이 主方으로 사용된 黃連解毒湯 連繫方의 治療領域은 外科疾患(諸瘡, 諸傷, 癰疽門) 7개(16.6%), 火熱病(火門) 5개(12%), 眼科疾患(眼門) 5개(12%), 傷寒病(寒門) 4개(9%)등의 순으로 20개의 領域에서 활용하고 있다.
2. 黃連解毒湯이 主方으로 사용된 黃連解毒湯 連繫方은 惡瘡, 熱瘡, 瘰癧, 天疱瘡, 湯火瘡, 杖瘡, 癰疽, 三焦火, 上焦熱, 火熱, 外障, 內障, 瞽膜 등 19개 病症에 활용하고 있다.
3. 黃連解毒湯이 主方으로 사용된 黃連解毒湯 連繫方에서 多用된 病因·病機는 臟腑의 熱毒, 六淫 濕熱, 傷寒熱毒 順이며, 그 외 瘀血, 濕毒, 氣血虛, 陰虛, 痰飲, 七情, 血溢, 酒色過度 등의 病因·病機에 활용되었다.
4. 黃連解毒湯의 連繫方에 대한 임상활용의 특징은 外科疾患, 火熱病, 眼科疾患 等에서는 大金花丸을 傷寒病, 出血性疾患, 婦人科疾患에서는 四物湯과 小柴胡湯을 黃疸에서는 茵陳五苓散, 茵陳蒿湯을 公同 基本方으로 가장 많이 배합해서

활용하였다.

따라서 黃連解毒湯은 熱毒, 七情, 瘀血, 濕熱 등의 병인병리에 관련된 火熱病이나 傷寒 뿐만 아니라 外科, 眼科疾患에도 폭 넓게 응용할 수 있는 방제임을 시사하고 있다.

參 考 文 獻

1. 王燾, 外臺秘要, 人民衛生出版社, 北京, 1996: 72.
2. 金相贊, 改正增補 方劑學, 永林社, 서울, 1999: 180-1.
3. 蔡仁植, 共譯, 國譯醫方集解, 大成文化社, 서울, 1984:436-9.
4. 尹吉榮, 東醫臨床方劑學, 明寶出版社, 서울, 1985:228-9.
5. 許濟群, 中醫方劑學, 陰陽脈診出版社, 서울, 1991:171-4.
6. 康舜洙, 方劑學, 癸丑文化社, 서울, 1984:194-5.
7. 臧堃堂, 中醫臨床方劑學, 人民衛生出版社, 北京, 1996:81-2.
8. 陳偉, 方劑學, 醫聖堂, 서울, 1993:115-7.
9. 朴喜守, 臨床處方講座, 大成醫學社, 서울, 2000:167-71.
10. 李範九, 方劑學, 大成醫學社, 서울, 2000: 176-8.
11. 葛洪, 肘後備急方 第2卷, 人民衛生出版社, 北京 p.32
12. 朱甲惠譯, 國譯萬病回春, 癸丑文化社, 서울, 1977:128, 158, 159, 160, 161, 196, 197, 448.
13. 裴秉哲, 標準臨床方劑學, 成輔社, 서울, 1995: 140-3.
14. 吳崐, 醫方考, 醫聖堂, 서울, 1993:196-7.

15. 康命吉, 濟衆新編, 여강출판사, 서울, 1992:69.
16. 李旻, 編註醫學入門, 法仁文化社, 서울, 2006: 316, 368, 669, 700.
17. 周命新, 醫門寶鑑, 杏林書院, 서울, 1975:38.
18. 龔信, 古今醫鑑, 江西科學技術出版社, 南昌, 1990:87.
19. 朱肱, 增注類證活人書, 南山堂, 서울, 1987:456.
20. 康舜洙, 바른方劑學, 大成文化社, 서울, 1996: 144-5.
21. 彭懷仁, 中醫方劑大辭典 第9卷, 人民衛生出版社, 北京, 1996:312-3.
22. 彭懷仁, 中華名醫方劑大典, 金盾出版社, 北京, 1994:602.
23. 尹用甲, 圖解增補 東醫方劑와 處方解說, 醫聖堂, 서울, 2007:730-46.
24. 申載鏞, 方藥合編解說, 成輔社, 서울, 2000: 215-6.
25. 方劑學, 여강출판사, 서울, 1994:231.
26. 謝鳴, 中醫方劑現代研究 上卷, 學苑出版社, 北京, 1997:277-86.
27. 李飛, 方劑學 上卷, 人民衛生出版社, 北京, 2002:523-9.
28. 韓宗현, 한방약리학, 醫聖堂, 서울, 2004: 187-190.
29. 金一赫, 共譯, 韓方醫藥學, 東南出版社, 서울, 1985:59, 198, 199.
30. 李尙仁, 天真處方解說, 成輔社, 서울, 1995: 285-8.
31. 朴榮順, 한방의 약리해설, 아카데미서적, 서울, 2002:1336-9.
32. 李載熙, 圖說 韓方診療要方, 醫方出版社, 원주, 2004:743-4.
33. 이종대, 새로보는 方藥合編, 도서출판 단샘, 안양, 2006:128-37.
34. 李益行, 湯證, 大星文化社, 서울, 1994:447-9.
35. 변성희, 共譯, 韓方藥의 藥能과 藥理, 전파과학사, 서울, 1999:36, 61, 84, 86, 143, 172, 179, 206, 211, 234, 283.
36. 朴鐘甲譯, 臨床應用韓方處方解說, 東洋綜合通信教育院出版部, 大邱, 1986:74-8.
37. 許浚, 對譯 東醫寶鑑, 法仁文化社, 서울, 1999:66, 146, 147, 168, 170, 173, 214, 215, 216, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 263, 280, 281, 286, 347, 354, 360, 367, 368, 371, 373, 374, 449, 450, 451, 454, 459, 462, 499, 500, 501, 515, 516, 531, 533, 535, 540, 545, 548, 549, 550, 554, 565, 566, 575, 576, 577, 578, 579, 590, 591, 602, 603, 604, 610, 621, 634, 636, 645, 646, 665, 729, 836, 838, 924, 940, 942, 950, 959, 960, 1011, 1014, 1028, 1029, 1039, 1040, 1048, 1053, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1116, 1120, 1121, 1148, 1152, 1153, 1171, 1173, 1211, 1216, 1283, 1353, 1354, 1365, 1366, 1368, 1383, 1386, 1407, 1413, 1414, 1417, 1420, 1423, 1424, 1426, 1435, 1441, 1442, 1453, 1469, 1470, 1475, 1478, 1480, 1504, 1508, 1509, 1526, 1527, 1544, 1595, 1597, 1627.
38. 이성준, 湯證으로 보는 東醫寶鑑, 초락당, 서울, 2005:8, 45, 98, 101, 149, 188, 236, 253, 282, 311, 317, 359, 365, 384, 429, 516, 669, 694, 695, 696, 704, 705, 710, 763, 766, 797, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 842, 847, 853, 855, 857, 859, 860, 864, 890, 893, 900, 903, 905, 910, 927, 929, 930, 932, 940, 942, 945, 946, 952, 954, 960, 961, 980, 1018, 1019, 1021, 1022, 1024, 1035, 1040, 1041, 1049, 1057, 1064.
39. 이성준, 湯證으로 보는 東醫寶鑑 50方, 초락당, 서울, 2005:240-4.

40. 尹用甲, 新東醫方劑 2223, 鼎談, 서울, 2006:55, 65, 176, 177, 281, 348, 357, 400, 416, 430, 471, 475, 476, 510, 512, 606, 753, 779, 845, 894, 928, 982, 983, 986, 1066, 1067, 1131, 1132, 1147, 1148, 1182, 1183, 1206, 1299, 1316, 1335, 1349, 1427, 1428, 1483, 1489, 1501, 1701, 1934, 2041, 2047, 2052, 2053, 2084, 2085, 2086, 2087, 2108, 2109, 2111, 2112, 2189, 2232, 2233, 2250, 2302, 2304, 2306, 2307, 2382, 2427, 2442, 2443, 2447, 2456, 2470.
41. 辛民教, 臨床本草學, 永林社, 서울, 1994:279, 308, 310, 312.
42. 金護哲, 韓藥藥理學, 집문당, 서울, 2001: 125-7, 129-40.
43. 鄭遇悅, 韓方臨床病理學, 永林社, 서울, 1998: 475.